PICOXYSTROBIN + PROTHIOCONAZOLE

Marcas comerciales: VIATUDE - VIOVAN

Nomenclatura Química:
picoxystrobin: metil (E)-3-metoxi-2-{2-[6-(trifluorometil)-2-piridiloximetil]fenil}acrilato
prothioconazole: (RS)-2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro-1,2,4-triazol-3-tiona
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: estrobilurina + triazol
Acción: sistémica

Uso: fungicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Roya anaranjada *(Puccinia recondita)* Roya amarilla *(Puccinia striiformis)* Mancha amarilla *(Drechslera tritici)*	750 cm3/ha	35	El desarrollo de enfermedades normalmente ocurre desde principio de encañazón hasta hoja bandera completamente desplegada (última hoja que se despliega). Aplicar durante este período cuando aparezcan los primeros síntomas o tan pronto como las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de enfermedades.
Cebada	Mancha en red *(Pyrenophora teres)*			

Información General:
Fungicida de uso agrícola con propiedades sistémicas, acción preventiva, y curativa post infectiva (en las primeras fases luego de la infección) y efecto residual, para el control de las enfermedades detalladas en esta etiqueta en los cultivos de trigo y cebada. Actúa como un inhibidor de la respiración mitocondrial de las células de los hongos, interfiriendo su ciclo de vida, principalmente en los procesos de germinación de las esporas, infección y crecimiento de las hifas. Además, interrumpe la biosíntesis del ergosterol, el cual es un componente esencial de la pared celular de los hongos.

Período de carencia: Trigo, Cebada: 35 días.
Tiempo de reingreso al área tratada: dejar transcurrir 24 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.

-Aplicaciones terrestres:
Se debe utilizar un caudal no menor a 200 litros de agua por hectárea, trabajando con una presión de 50-80 libras/pulgada2 (5,5 - 7 bar) para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo.
Es recomendable una aplicación que logre una distribución uniforme de gotas en la superficie foliar y cuyo tamaño sea lo más homogéneo posible. Los picos más aptos para tal fin son los de cono hueco y doble abanico plano, que producen gotas de entre 100 y 250 micrones. No deben superponerse franjas de aplicación. Número de gotas: aplicar 20 - 30 gotas/cm2.
-Aplicaciones aéreas:
Se debe utilizar un caudal no menor a 30-40 L/ha, calibrando el equipo para asperjar entre 20 - 30 gotas/cm2. No aplicar utilizando gas oil. No exceder nunca el ancho efectivo de trabajo de la aeronave.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h. No deben superponerse franjas de aplicación. Número de gotas: aplicar 20 - 30 gotas/cm2.

Derrames:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar indumentaria protectora adecuada: antiparras, barbijo, guantes impermeables, pantalón, camisa de manga larga y botas de goma. Evite el contacto con la boca, piel y ojos. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. No destapar picos ni boquillas con la boca. Para su seguridad después del tratamiento: Higienizarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Quitarse la ropa de trabajo y lavarla separadamente de la ropa de uso diario, antes de volverla a usar. Lavar los utensilios empleados en la preparación del producto. Guardar el sobrante de producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:
Toxicidad Inhalatoria, Categoría III (CUIDADO).
Leve irritante dermal, Categoría IV (CUIDADO). Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Moderado irritante ocular, Categoría III (CUIDADO). Causa irritación moderada a los ojos.
No sensibilizante dermal.

Riegos ambientales:
- Toxicidad para peces: Muy tóxico. Dejar una franja mínima de 5 metros entre la zona tratada y cuerpos de agua. Deben extremarse los cuidados para evitar la contaminación directa de los cuerpos de agua ya sea durante la aplicación y uso del producto, o durante las operaciones de carga y limpieza del equipo, enjuague de envases vacíos, etc. Evitar la deriva de la pulverización.
- Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
- Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
VIATUDE	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	41907	EC	10% + 11,7%	III
VIOVAN	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	41892	EC	10% + 11,7%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.