PYRIDALIL

Marcas comerciales: PLEO TOP - SUMIPLEO.

Nomenclatura Química:
pyridalil: (2,6-dicloro -4-(3,3-dicloroaliloxi)fenil 3-[5-(triflurometil)-2-piridiloxi]propil-eter
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: Derivados de Dihalopreno
Acción: de contacto e ingestión en insectos, de contacto y traslaminar en la planta.

Uso: insecticida

Cultivo	Adveridad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz (***)	Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*)	150 – 200 ml/ha (*)	60	Aplicar en los primeros síntomas (10 a 20 % de incidencia) con daños de Davis 1,2 y 3 (daño ventana). Se recomienda aplicar cuando las larvas estén expuestas, usar la dosis mayor en la incidencia mayor indicada. (**)
Tomate	Polilla del tomate (*Tuta absoluta*)	40 – 50 ml/hl	3	Aplicar al detectar los primeros daños en hoja o con 2% de hojas con daño visible. Usar una dosis superior en casos de alta presión de plaga.
	Trips (*Frankliniella occidentalis*)			Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la plaga. Usar una dosis superior en casos de alta presión de plaga.

(*) Se recomienda el uso de aceite metilado de soja 0,5 % v/v u otro aceite a dosis según recomendación del fabricante.
(**) Se recomienda el uso de umbrales de daño económicos debido a que estos se ajustan considerando condiciones de crecimiento del cultivo, variedades, tecnologías, especies, tamaños, nivel de infestación, defoliación etc. Realizar monitoreos y ante nuevas infecciones realizar aplicación según recomendación. Realizar como máximo una aplicación por ciclo del cultivo. El agregado de coadyuvantes/tensioactivos según dosis de marbete es recomendado para lograr una mayor eficacia en la aplicación. Consultar a un Ingeniero Agrónomo.
(***) Recomendación válida solo para PC de Sumitomo.

Información General:

PC DE SUMITOMO:

Insecticida que actúa por contacto e ingestión de los insectos, con acción de contacto y translaminar en la planta. Formulado como una emulsión concentrada a base de su ingrediente activo Pyridalil para aplicar en post emergencia del maíz, y en tomate.

Modo de acción único y aun no clasificado (UN) según el Comité de Acción para la Resistencia a Insecticidas (IRAC, 2024), pertenece al grupo químico de Derivados de Dihalopreno, siendo esto una excelente herramienta de rotación de modos de acción para la prevención de resistencia de insectos dentro de un programa de manejo integrado de plagas (MIP); a su vez es seguro para insectos benéficos y polinizadores.

Presenta una alta citotoxicidad a las células de insectos lepidópteros, su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la síntesis de proteínas. Este modo de acción, diferencial a los demás insecticidas, disminuye y retrasa el desarrollo de insectos resistentes. Actúa por contacto e ingestión con una rápida acción, la actividad de las plagas disminuye a partir de 3-4 horas de la exposición al producto. Además, resulta seguro para un amplio rango de artrópodos benéficos, operando en forma selectiva resguardando ciertos enemigos naturales y abejas. Presenta un mayor efecto residual y tolerancia a lluvias, por lo tanto, resulta más eficiente al disminuir la necesidad de aplicaciones frecuentes.

PC de SUMMIT AGRO:

Presenta una alta citotoxicidad a las células de insectos lepidópteros, su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la síntesis de proteínas. Este modo de acción, diferencial a los demás insecticidas, disminuye y retrasa el desarrollo de insectos resistentes. Actúa por contacto e ingestión con una rápida acción, la actividad de las plagas disminuye a partir de 3-4 horas de la exposición al producto. Además, resulta seguro para un amplio rango de artrópodos benéficos, operando en forma selectiva resguardando ciertos enemigos naturales y abejas. Presenta un mayor efecto residual y tolerancia a lluvias, por lo tanto, resulta más eficiente al disminuir la necesidad de aplicaciones frecuentes.

Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30º C, Humedad relativa menor a 40 %, Viento mayor a 15 km/h.

Preparación: Agitar el envase antes de usar. Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad con agua limpia. Luego agregar la cantidad necesaria del producto y completar el faltante del tanque con agua. Mantener siempre en funcionamiento el sistema de agitación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Puede aplicarse con equipos terrestres considerando los siguientes parámetros en cuanto a calidad de aplicación: Cobertura: 30-40 gotas/cm2. Tamaño de gota: 200-400 micrones. Uniformidad: 30% coeficiente de variación.

Compatibilidad: Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un Ingeniero Agrónomo.

Fitotoxicidad: No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

Derrames:

La carga del equipo debe realizarse sobre una plataforma de carga impermeable que contenga los posibles derrames y deriven a un tanque, o sobre una Cama Biológica. En caso de suceder un derrame, no fumar en las inmediaciones. Contener y absorber el derrame con un material inerte (Arena o tierra) y recoger con pala, juntamente con la capa superficial de suelo afectado. Colocar el material impregnado en un recipiente. Disponer de acuerdo con la normativa legal vigente. Dar aviso al personal técnico de la empresa para determinar su destino. Proceder a lavar con abundante agua el área contaminada. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación: Preparar la cantidad de producto a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar el ambiente. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado que no se utilicen NO deben ser asperjados en áreas no cultivas o del tránsito habitual de personas y animales y, a su vez, NO deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.). Recolectar el caldo remanente en un tanque, verterlo sobre una Cama Biológica o gestionar su disposición final como residuo peligroso. En su defecto, diluirlo cinco veces y aplicarlo en el cultivo, respetando todos los cuidados que hay que tener al momento de la pulverización.

Clasificación (modo o sitio de acción): UN (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Este producto es nocivo cuando es ingerido o absorbido por la piel. Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. No pulverizar contra el viento. Durante su preparación y aplicación utilizar ropa protectora adecuada, máscaras con filtros especiales para solventes, botas de goma, protección facial y guantes impermeables. Idénticas precauciones deberán tomar los banderilleros. No comer, beber o fumar durante su aplicación. No destapar picos ni boquillas con la boca. Concluida la tarea, lavarse prolijamente con agua abundante las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lave los elementos empleados en la preparación y aplicación del producto.

Información Toxicológica:

PC DE SUMITOMO:

Toxicidad oral aguda: DL50: > 2000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 2000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: > 2,7 mg/l.

Irritación dermal: Moderado irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente para peces

PC DE SUMMIT AGRO:

Inhalación: No Inhalar.
Ojos: Moderado Irritante ocular (Categoría III)
Piel: Moderado Irritante dermal (Categoría III)
Ingestión: No Ingerir.
Toxicidad aguda:
Oral DL 50: CLASE III > 2000 mg/Kg-Producto ligeramente peligroso.
Dermal DL 50: CLASE III > 2000 mg/Kg-Producto ligeramente peligroso.
Inhalación CL 50: > 5.25 mg/l Categoría III - CUIDADO
Irritación de la piel: Moderado Irritante dermal (Categoría III)
Sensibilización de la piel: NO SENSIBILIZANTE
Irritación para los ojos: Moderado Irritante ocular (Categoría III)
Toxicidad subaguda: ND
Toxicidad crónica: ND
Mutagénesis: NO MUTAGÉNICO

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico (LD50 >2012 mg/kg)
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico (CL 50: 7,44 ppm). aplicar en fuentes de agua natural ni artificial. Dejar una zona de seguridad sin aplicar (zona buffer) de 5 metros de ancho de cualquier curso de agua. No contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos o al eliminar los envases o restos de producto.
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico (DL 50 > 62.4 µg/abeja)
No asperjar sobre colmenas en actividad. Dar aviso a los apicultores vecinos para el cierre de las colmenas en el momento de la aplicación. Retirar las colmenas cercanas, a 4 km del área, por un tiempo mínimo de 30 días; de no ser posible tapar la piquera con arpillera húmeda o espuma. Asperjar fuera del horario de pecoreo o actividad de las abejas.
Persistencia en suelo: Lenta degradación.

Efecto de control: Insecticida que actúa por contacto e ingestión con una rápida acción. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la síntesis de proteínas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PLEO TOP	SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.	41526	EC	50%	III
SUMIPLEO	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A.	41473	EC	50%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.