CLOROTALONIL + PYDIFLUMETOFEN

Marcas comerciales: MIRAVIS OPTI CON TECNOLOGÍA ADEPIDYN

Nomenclatura Química:
clorotalonil: tetracloroisoftalonitrilo
pydiflumetofen: 3-(difluorometil)-N-metoxi-1-metil-N-[(RS)-1-metil-2-(2,4,6-triclorofenil)etil]-1H-pirazol-4-carboxamida
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: cloronitrilo + pirazol-carboxamida
Acción: De contacto, sistemática gradual

Uso: Fungicida

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Escaldadura *(Rynchosporium secalis)* Mancha borrosa *(Cochliobolus sativus)* Mancha borrosa *(Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red *(Drechslera teres)* Mancha en red *(Pyrenophora teres)* Ramularia *(Ramularia collo-cygni)*	1500 -2000 cc/ha	30	Aplicar a partir de encañazón, ante condiciones predisponentes o bien cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas de estas enfermedades. Realizar una aplicación por ciclo de cultivo.
Maní	Viruela tardía *(Cercosporidium personatum)* Viruela temprana *(Cercospora arachidicola)*		25	Realizar la primera aplicación en forma preventiva ante situaciones ambientales predisponentes o a la aparición de primeros síntomas. Repetir en caso de ser necesario con un intervalo mínimo de 15 días. Realizar un máximo de dos aplicaciones del producto por ciclo de cultivo.

Información General:
Es un fungicida que actúa por contacto y en forma sistemática gradual por xilema, lo que le otorga un prolongado efecto residual para el control de enfermedades foliares, principalmente necrotróficas, en el cultivo de cebada y maní. Su ingrediente activo, pidiflumetofen, perteneciente al Grupo 7 (subgrupo N-Methoxy) – Inhibidores de la succinato deshidrogenasa o SDHI (FRAC), inhibe el Complejo II de la respiración donde actúa la SDH. Posee prolongada residualidad, asegurando la protección de las hojas, permitiendo al cultivo terminar su ciclo en forma óptima, con hojas verdes por más tiempo, logrando expresar el máximo potencial del cultivo. Clorotalonil, perteneciente al Grupo M05 (cloronitrilos) proporciona protección complementaria y de amplio espectro, desde el exterior de la planta (inhibe la germinación de esporas).
Se recomienda que la aplicación del producto se realice en forma preventiva ante situaciones ambientales predisponentes o a la aparición de primeros síntomas de enfermedad, para evitar que el progreso del patógeno cause daños importantes sobre el rendimiento.

Preparación: Es una suspensión concentrada que debe diluirse en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agitar el producto antes de usarlo. Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y poner el sistema de agitación en funcionamiento.
- Añadir la cantidad necesaria del slurry de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Con el sistema de agitación en movimiento, verificar que el producto se disperse completamente.
- En caso de mezcla con otros productos, agregar siempre el producto al tanque en primer lugar.
- Continuar agitando mientras se termina de completar el tanque con la cantidad de agua necesaria.
- Usar el producto dentro de las seis horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicaciones debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una buena cobertura sobre las hojas del cultivo a proteger. Puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de abanico plano o doble abanico plano, etc., para fungicidas con el objetivo de lograr una cobertura óptima del cultivo y evitar la evaporación o deriva. Utilizar un volumen mínimo de agua de 100 litros/ha y presión superior a 2.0 bar (29.2 lb/pg2), para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.
También puede aplicarse en forma aérea, empleando un volumen mínimo de agua de 15 litros/ha. No deben realizarse aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso: Período de carencia: Dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: cebada: 30 días; maní: 25 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Rotación: Se degrada rápidamente en el ambiente, asegurando que no existan efectos negativos sobre la germinación y el establecimiento de cultivos sucesivos en la rotación.

Prevención y manejo de resistencia: Este producto pertenece al Grupo M05 y 7 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Advertencia: La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Dado que Syngenta Agro S.A. no puede prever el desarrollo de una resistencia, la empresa no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante de la falta de actividad contra estas posibles cepas resistentes.

Compatibilidad: Puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los productos fitosanitarios de reacción neutra. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): M5 (FRAC) y 7 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos o boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda: DL50 > 2000 mg/kg. III - Producto ligeramente peligroso.
Toxicidad dermal aguda: DL50 > 2000 mg/kg. III - Producto ligeramente peligroso.
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: 0.25 mg/L. CATEGORÍA II (NOCIVO).
Irritación dermal: Leve irritante dermal
Irritación ocular: Leve irritante ocular.
Sensibilización dermal: Sensibilizante dermal.

El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Virtualmente no tóxico para abejas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
No contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.
Prácticamente no tóxico para aves. Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
Tóxico para peces y para organismos acuáticos. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas o diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MIRAVIS OPTI CON TECNOLOGÍA ADEPIDYN	SYNGENTA AGRO	41648	DC	50% + 2,5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.