ISOCYCLOSERAM + LAMBDACIALOTRINA

Marcas comerciales: FENSORAX CON TECNOLOGÍA PLINAZOLIN – SEPONAM CON TECNOLOGÍA PLINAZOLIN – VERDAVIS CON TECNOLOGÍA PLINAZOLIN

Nomenclatura Química:
isocycloseram: 4-[(5RS)-5-(3,5-dichloro-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-N-[(4RS)-2-ethyl-3-oxo-1,2-oxazolidin-4-yl]-2-methylbenzamide
lambdacialotrina: mezcla de isómeros (ZR cis S y ZS cis R) del α-ciano-3 fenoxibencil-cis-3(Z-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: methylbenzamide + piretroide
Acción: contacto e ingestión

Uso: Acaricida, Insecticida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Picudo negro de la vaina (*Rhyssomatus subtilis*)	100 – 200 cm3/ha	30	Aplicar al inicio de la infestación.
	Alquiche chico (*Edessa meditabunda*) Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche de los cuernos *(Dichelops furcatus)* Chinche verde (*Nezara viridula*)	150 – 200 cm3/ha		Aplicar, de acuerdo a los umbrales establecidos por INTA, a partir de 0,4 chinches por metro lineal, desde que la soja se encuentre en estado de formación de vainas (a partir de R3). Lograr buena penetración de gotas dentro del canopeo (al menos 50-70 gotas/cm2 en la parte media de la planta) para lograr una buena eficacia del producto. Asegurarse que la plaga esté expuesta a la hora de aplicar para lograr mayor % de control.
	Oruga de las leguminosas *(Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora *(Rachiplusia nu)*			Aplicar cuando se encuentren 10 larvas pequeñas por metro lineal. Recurrir a la dosis mayor con alta presión de orugas y cuando existe riesgo de reinfestación
	Oruga del Yuyo Colorado *(Spodoptera cosmioides)*			5 orugas > 1,5 cm por metro de surco y más de 10% de daño al follaje.
	Trips *(Caliothrips phaseoli)*			Aplicar al detectar un promedio de 5 ninfas por folíolo en el estrato medio/inferior. En caso de ser necesario agregar aceite mineral a dosis de 250 cc/ha.
	Arañuela *(Tetranychus urticae)*			Aplicar al inicio de infestación, cuando se encuentren 5 arañuelas por foliolo en al menos el 30 % de las hojas. En caso de ser necesario agregar aceite mineral a dosis de 250 cm3/ha.
Maíz	Chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)		50	Aplicación foliar cuando se observen los primeros adultos en el lote. Aplicar el producto en híbridos de maíz recomendados por empresas semilleras con comportamiento tolerante a las enfermedades transmitidas por *Dalbulus maidis*. Realizar aplicaciones sucesivas con intervalos de 5 a 7 días a partir de estado fenológico V2, respetando el número máximo de aplicaciones. El producto debe ser parte de un manejo integrado y programa de aplicaciones, una vez realizadas las aplicaciones con el mismo y en caso de ser necesario continuar aplicando productos registrados y con modo de acción diferentes al del producto.
Maíz dulce				
Ajo	Trips (*Thrips tabaci*)		3	Aplicar al detectar un promedio de 5 ninfas por folíolo en el estrato medio/inferior. En caso de ser necesario agregar aceite mineral a dosis de 250 cm3/ha.

Información General:
Es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, causando la muerte de los insectos objetivo.
Se une al canal clórico del receptor de ácido gamma-aminobutírico (GABA) en las neuronas del insecto, provocando el cierre de los canales de cloro. El cloro no puede entrar en los nervios de los músculos, lo que causa los síntomas de hiper-excitación, posterior parálisis y muerte de los insectos.

Este ingrediente activo, isocycloseram pertenece a una familia nueva de insecticidas (grupo N°30 de la clasificación de IRAC: isoxasolinas y metadiamidas), con características muy favorables en cuanto a eficacia y control prolongado de un amplio espectro de plagas.

Controla ácaros e insectos en estados adultos e inmaduros. Los insectos afectados cesan inmediatamente de alimentarse de las plantas y mueren entre 3 y 7 días luego de la aplicación. De este modo, isocycloseram inhibe rápidamente el daño producido por los insectos y otorga acción protectora residual.

Preparación: Es una formulación mezcla de suspensión de encapsulado y suspensión concentrada que debe ser diluida en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria del producto de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Corroborar la correcta dilución del producto.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.

- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: El producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar.
El volumen de aplicación recomendado para el cultivo de soja, maíz y maíz dulce es de 80 a 120 L/ha. Emplear pastillas en buen estado para lograr un tamaño de gota adecuado y una buena cobertura en ambas caras de las hojas, evitando el escurrimiento excesivo. Mantener en constante agitación.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Aditivos: En caso de ser necesario agregar aceite mineral según las recomendaciones de uso. Para la adición del aceite, se recomienda verter la dosis necesaria del producto en el agua limpia del tanque, agitar y luego agregar el aceite considerando las recomendaciones específicas para cada cultivo.

Restricciones de uso: Período de carencia: Entre la última aplicación del producto y la cosecha deben transcurrir los siguientes días, según el cultivo, soja: 30 días, maíz y maíz dulce: 50 días, ajo: 3 días.

El número máximo de aplicaciones por ciclo de cultivo es dos (2).
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Prevención y manejo de resistencia: Contiene ingredientes activos que pertenecen al grupo 30 y 3 respectivamente de los insecticidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a insecticidas deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar una población resistente a un insecticida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Para prevenir o retrasar la selección de poblaciones naturalmente resistentes a insecticidas, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete y utilizar los insecticidas como parte de una estrategia de manejo de resistencia a insectos (IRM, por sus siglas en inglés) que considere lo siguiente:
- Para tratar sucesivas generaciones de una plaga no se debe utilizar insecticidas pertenecientes a un mismo grupo.
- No aplicar productos con PLINAZOLIN® más de dos veces por ciclo de cultivo.
- Cuando sea posible incorporar métodos alternativos de control para el control de plagas como parte de un programa de manejo integrado de plagas (MIP).
- Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
- Para controlar una población resistente a un insecticida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: No se han observado casos de fitotoxicidad atribuibles específicamente a este producto

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 30 (IRAC) y 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada (mameluco o camisa manga larga y pantalón largo, casco o gorro) guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. No ingresar al área tratada sin ropa protectora hasta que los depósitos de la aspersión se hayan secado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda: Moderadamente peligroso
Toxicidad dermal aguda: Moderadamente peligroso
Toxicidad inhalatoria aguda: Nocivo
Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante dermal

El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico para abejas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de la etiqueta en forma estricta. Dar aviso a los apicultores. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días. Tomar la precaución de no contaminar posibles fuentes de agua de abejas.
No aplicar en horario donde las abejas están forrajeando activamente (solamente aplicar en la mañana temprano o por la tarde)
NO permitir que durante la aplicación haya deriva hacia borduras con malezas en floración, ni cultivos vecinos a la zona de aplicación que se encuentren en floración.
NO aplicar bajo condiciones ambientales que puedan favorecer la deriva a zonas cercanas con plantas, pasturas o cultivos susceptibles.

Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico para aves. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Toxicidad para peces y organismos invertebrados acuáticos: Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. NO aplicar bajo condiciones ambientales que puedan favorecer la deriva del producto a zonas adyacentes, especialmente a fuentes de agua.
No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas o diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Para aplicaciones terrestres y/o áreas respetar una zona buffer de 30 metros (para aplicaciones terrestres) a 250 metros (para aplicaciones aéreas) a fuentes de agua, rutas o zonas pobladas con animales o humanas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FENSORAX CON TECNOLOGÍA PLINAZOLIN	SYNGENTA AGRO	41482	ZC	10% + 15%	II
SEPONAM CON TECNOLOGÍA PLINAZOLIN	SYNGENTA AGRO	41398	ZC	10% + 15%	II
VERDAVIS CON TECNOLOGÍA PLINAZOLIN	SYNGENTA AGRO	41245	ZC	10% + 15%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.