MEFENTRIFLUCONAZOLE

Marcas comerciales: CEVYA.

Nomenclatura Química:
(2RS)-2-(4-(4-clorofenoxy)-2-(trifluorometil) fenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) propan-2-ol
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: triazol
Acción: sistémica.

Uso: Fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Limón Mandarina	Sarna de los cítricos *(Elsinoe fawcetti)*	22,5-25 cm3/hl de agua (*)	7	Prefloración
Limón Naranjo Pomelo	Mancha negra de los cítricos (Guignardia citricarpa/ Phyllostica citricarpa) Melanosis (Diaporthe citri)			Aplicación: en noviembre hasta diciembre (según condiciones predisponentes) (**)

(*) Se recomienda la dosis más alta ante situaciones de alta presión de la enfermedad, condiciones ambientales predisponentes y/o antecedentes de alta presión de la enfermedad en el lote. Antes, durante y después de la aplicación se recomienda aplicaciones de: Oxicloruro de Cu (85%) 300 gr, óxido cuproso (60%) 300 gr, oxido cuproso (92.2%) 82 cm3, hidróxido de Cu (76,8%) 210 gr. Dosis expresadas cada 100 litros de agua. En todas las aplicaciones agregar aceite al 0,2 %.
En caso de ser necesario, aplicar a los 30 o 60 días con productos de diferente mecanismo de acción.
No realizar más de 1 aplicación por ciclo del cultivo.
(**) Condiciones predisponentes para Mancha negra de los cítricos: humedad sobre los frutos durante más de 15 horas y T° superiores a 18°C

Información General:

El producto es un fungicida recomendado para aplicarlo de manera preventiva y está compuesto por el siguiente ingrediente activo: mefentrifluconazole, fungicida con propiedades sistémicas y de amplio espectro de control.
Mefentrifluconazole pertenece al grupo de los inhibidores de la biosíntesis del ergosterol (DMI). Posee en su estructura Isopropanol, que le confiere propiedades de alta acción biológica sobre el sitio de acción diferenciándose de los Triazoles convencionales. Por lo tanto, es una excelente herramienta para un manejo anti- resistencia alternado durante el ciclo del cultivo con otros ingredientes activos de diferente mecanismo de acción.
Posee acción sistémica por lo cual presenta excelente persistencia de acción y eficacia sobre un amplio espectro de fitopatógenos.

Está recomendado para el control de Sarna de los cítricos, Elsinoe fawcetti en plantaciones de Mandarina, y Limón; para el control de mancha negra, Guignardia citricarpa en plantaciones de Limón y Naranjo, Diaporthe citri en Pomelo.
Confiere alta contundencia sobre el control de enfermedades porque suprime todo el desarrollo y crecimiento del patógeno.

Derrames:
Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o depósitos abiertos de agua o cursos de agua. En caso de emergencia (Argentina), llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar máscara, guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extralargo durante la preparación y aplicación.

Información Toxicológica:

Clase toxicológica III. Producto ligeramente peligroso. CUIDADO.
Toxicidad inhalatoria: Categoría III. CUIDADO.
No irritante dermal. No irritante ocular. No sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.	C.T.
CEVYA	BASF	41752	SC	40%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.