PROTHIOCONAZOLE + AZOXISTROBINA

Marcas comerciales: ADAMA MAXENTIS – ATANOR PROTIOCONAZOLE+AZOXISTROBINA 17,5 + 16 SC.

Nomenclatura Química:
protioconazole: (RS)-2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro]-2,4-triazol-3-tiona
azoxistrobina: metil (E)-2-(2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil)-3-metoxiacrilato
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: triazol y estrobilurina
Acción: sistémica y mesostémica

Uso: fungicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Viruela Tardía (Cercosporidium personatum Deighton) Viruela Temprana (*Cercospora arachidicola Hori*)	PC 17,5% + 16%: 600-700 cm3/ha	15	Tratamiento foliar, aplicar al momento de las primeras manchas, repetir entre los 21 y 28 días. En años con condiciones predisponentes y alta presión de la enfermedad, puede reducirse el intervalo entre aplicaciones. No se recomienda aplicar en mezclas con aceites y/o herbicidas que necesiten aceite en su aplicación.
Soja	Mancha marrón (*Septoria glycines*) Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii*) Roya asiática de la soja (Phakopsora pachyrhizi)	PC 17,5% + 16%: 300-400 cm3/ha	30	Aplicar desde R3 (inicio de formación de vainas) y hasta R5.1 (inicio de formación de granos, perceptibles al tacto, hasta 10% de llenado de granos), cuando se observen los primeros síntomas, en función de los umbrales existentes para cada enfermedad y con condiciones ambientales favorables para el desarrollo de estas
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis*) Roya anaranjada (*Puccinia recondita*) Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici*)	PC 17,5% + 16%: 500-700 cm3/ha		Utilizar la dosis de 500 cc/ ha ante menor presión de las enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares más tolerantes y condiciones climáticas no tan favorables para el desarrollo de las enfermedades. Utilizar la dosis de 600 cc/ ha ante presiones intermedias de las enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares moderadamente susceptibles y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades. Utilizar la dosis de 700 cc/ha en aquellos casos que presenten condiciones de presión alta de las enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas con condiciones de alto potencial de rendimiento, cultivares altamente susceptibles y condiciones climáticas muy favorables para el desarrollo de las enfermedades. En trigo: Se recomienda aplicar con 10% de incidencia en roya de la hoja y 30% de incidencia para manchas foliares. En cebada: Se aconseja utilizar el 30% de incidencia foliar a partir de fin de macollaje-encañazón como umbral.
Cebada	Escaldadura (*Rhynchosporium secalis*) Mancha borrosa (Bipolaris sorokiniana) Mancha en red (*Drechslera teres*) Ramularia o salpicado necrótico de la cebada (*Ramularia collo-cygnis*) Roya de la hoja (*Puccinia hordei*)			

En Trigo, Cebada y Soja: Aplicar con agregado de coadyuvante a dosis de marbete

Información General:

Es un fungicida foliar de acción prolongada con efecto preventivo y curativo. Debido al mecanismo complementario de sus ingredientes activos, posee acción sistémica y mesostémica. Protioconazole tiene acción sistémica y de contacto, actúa en forma preventiva, curativa y erradicante. Azoxistrobin posee actividad mesostémica caracterizada por una mayor afinidad con la superficie de la planta, una distribución por movimiento de vapor superficial y reubicación en la superficie vegetal, y una penetración del tejido con movimiento translaminar. Es particularmente activo sobre la germinación de esporas y el crecimiento del micelio en la superficie de la planta. Inhibe también el desarrollo de patógenos, como la formación de haustorios en la epidermis del tejido vegetal. El producto otorga una prolongada persistencia de acción y reduce el riesgo de resistencia. De todas formas, como práctica general de manejo de resistencia siempre es recomendable rotar el uso de este producto con otros fungicidas inscriptos que presenten un modo diferente de acción.

PREPARACIÓN: Agitar el envase antes de usar y respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación. Antes de abrir el envase invertirlo lentamente varias veces, para obtener una suspensión homogénea.
- Añadir la cantidad necesaria de acuerdo con la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el volumen remanente de agua.
- Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Utilizar siempre agua limpia.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: puede ser aplicado con equipos pulverizadores convencionales de arrastre o autopropulsados siempre que estén provistos de un agitador mecánico. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo; para ello, se debe logra aplicar entre 50 y 70 gotas /cm2; empleando un volumen de agua mínimo de 100 litros por hectárea en aplicaciones terrestres y 20 litros de agua por hectárea en aplicaciones aéreas. Se recomienda verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/hora. Tampoco se debe aplicar el producto en cultivos bajo situaciones de estrés (sequía prolongada, baja fertilidad, heladas o bajas temperaturas, humedad relativa ambiente por debajo de 60%, temperaturas mayores a 25ºC) para evitar efectos negativos sobre el cultivo.

COMPATIBILIDAD es compatible con un amplio rango de productos usados en agricultura, incluyendo insecticidas, fungicidas y fertilizantes. Sin embargo, como no existe información de compatibilidad biológica o química para cada mezcla en particular, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa en pequeña escala, antes de utilizar cualquier tipo de mezcla a campo.

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico en los cultivos que se recomienda, si se utiliza de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta. En el cultivo de maní, bajo determinadas condiciones climáticas, y en mezclas de tanque con graminicidas y aceites, se pueden observar síntomas de fitotoxicidad, por lo que no se recomienda su mezcla. Separar las aplicaciones de fungicidas y herbicidas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Vacíe completamente los envases en el equipo de aplicación, efectuando un triple lavado con agua de estos. Los restos del caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.), deben ser aplicados en caminos de tierra alejados de centros poblados y del tránsito habitual de personas y animales.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional Nº 27.279, Decreto Reglamentario Nº 134/18 y normativas provinciales específicas."

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugares seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. No almacenar en lugares habitados por personas o animales. No apilar o estibar más de tres envases.

Derrames:

Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final. Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 11 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del formulado PC 17,5% + 16%:
Toxicidad oral aguda: DL50: > 5.000 mg/kg (ratas)
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 5.000 mg/kg (ratas)
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: > 1,91 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del formulado PC 15% + 20%:
PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. CLASE II.
Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA MAXENTIS	ADAMA ARGENTINA SA	41702	SC	15% + 20%	II
ATANOR PROTIOCONAZOLE + AZOXISTROBINA 17,5+16 SC	ATANOR SCA	41278	SC	17,5% + 16%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.