ACETAMIPRID + BIFENTRIN

Marcas comerciales: TSUKI

Nomenclatura Química:
acetamiprid: (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina
bifentrin:2-metilbifenil-3-ilmetil(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
Tipo de produto: químico
Clasificación Química: neonicotinoide y piretroide
Acción: contacto e ingestión

Uso: insecticida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Falsa medidora (*Pseudoplusia includens*) Isoca medidora (*Rachiplusia nu*) Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga negra (*Spodoptera cosmioides*)	100 cm3/ha (*)	30	Aplicar cuando se alcancen los umbrales establecidos para estas plagas: Etapa vegetativa, hasta R3: Cuando se contabilicen 10-15 orugas grandes (>1.5 cm) y una defoliación de 20%. Desde R3 hasta R7: cuando se contabilicen 10 orugas grandes (> 1,5 cm) y una defoliación del 10 %.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde *(Nezara viridula)*	150 cm3/ha (*)		Aplicar según los umbrales establecidos por INTA. A partir de 0.4 chinches /m2, cuando el cultivo esté en estado de formación de vainas.

(*) Aplicar con aceite vegetal metilado 500 cm^3/ha o KEIGO 200 cm3/ha.

Información General:

Insecticida foliar que combina la acción de dos principios activos para lograr un eficaz control y residual sobre orugas y chinches fitófagas en el cultivo de Soja. Bifentrin, es un piretroide que posee eficacia por contacto e ingestión sobre lepidópteros y hemípteros de importancia para el cultivo de soja. Acetamiprid, un neonicotinoide sistémico que controla insectos succionadores. Ambos activos se complementan en el control del principal complejo de plagas que afecta al cultivo de soja.

Preparación: Agítese bien el envase antes de dosificar. Luego de realizado esto, proceder a efectuar una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea, indicada en el cuadro de recomendaciones. Agregar agua al tanque del equipo de aplicación aproximadamente hasta la mitad de su capacidad. Posteriormente, y con agitadores en movimiento, agregar al tanque del equipo de aplicación la pre-dilución previamente realizada para completar luego con el agua restante.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Puede ser aplicado tanto con equipos terrestres como aéreos. En equipos terrestres se recomienda la utilización de pastillas tipo abanico plano preferentemente con ángulo de 80 o 110 grados, una presión de entre 40 y 60 lb/pulg2 y un volumen de 80-120 L/ha para lograr una cobertura completa y uniforme.
En aplicaciones aéreas se recomienda una presión máxima de 40 lb/pulg2 y un volumen no inferior a 20 L/ha.
No aplicar con vientos superiores a los 10 Km/h, ni con temperaturas mayores a 28°C y/o humedad relativa menor al 60%.
No aplicar ante la inminencia de una lluvia. No obstante, si la precipitación ocurriera 4 horas después de la aplicación, no interferirá con la eficacia del producto.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 3 (IRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Este producto es nocivo cuando es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Para su seguridad durante la aplicación y preparación: Utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de TSUKI en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

DL 50 oral: 550 mg/kg (ratones)
DL 50 dermal > 5000 mg/kg (ratas)
Inhalación CL50 >2,00 mg/l
Irritación de la piel: No irritante dermal.

Riegos ambientales:

Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: la CL50 de 96 hs para Peces (*Danio rerio*) es de 0,062 mg/Litro. El producto se clasifica como Extremadamente tóxico para peces.
Toxicidad para aves: La DL50 resultó de 132,71 mg/kg peso corporal para las codornices (*Coturnix coturnix japonica*). El producto se puede clasificar como Moderadamente tóxico para aves.
Toxicidad para abejas: Se obtuvo un valor de DL50 ORAL de 0,53 µg/abeja. El producto se clasifica como Altamente tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TSUKI	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41481	EC	15% + 13,5%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.