OXICLORURO DE COBRE + HIDROXIDO DE COBRE

Marcas comerciales: GRIFFON

Nomenclatura Química:
oxicloruro de cobre + Hidróxido de cobre. Equivalente en cobre metálico: 28 g / 100 g
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: contacto y preventivo.

Uso: fungicida, bactericida

Cultivo	Enfermedades	Dosis	Momento de aplicación
Apio	Septoriosis (*Septoria apii-graveolentis*)	340 g/hl	Aplicar en el almácigo, con las primeras hojas. Continuar después del trasplante cada 15 a 20 días hasta antes fe floración.
Arveja	Antracnosis de la arveja (*Ascochyta pisi*)	450-700 g/ha	Aplicar de forma preventiva: 1ra aplicación en brotación. 2da en plantas de 20-30 cm de altura. 3ra repetir cada 20 días.
Cítricos (naranja, limón, mandarina)	Antracnosis de los citrus (*Colletotrichum gloeosporioides*)	200 g/hl	1ra aplicación antes de la floración. 2da después de floración 3ra 20 días después.
	Mancha negra (*Guignardia citricarpa*)		1ra aplicación: con frutos de 2 a 3 mm. de diámetro. 2da a los 30 días (frutos de 3 a 4 cm) 3ra a los 30 días de la segunda (frutos de 4 a 5 cm.) Para mejorar las aplicaciones, agregar aceite coadyuvante.
	Cancrosis de los Citrus (*Xanthomonas campestris pv. citri*)	150-200 g/hl	1ra aplicación: antes de la floración. 2da aplicación: a la caída de los pétalos 3ra aplicación: cuando fruto tiene 1 a 2 cm diámetro. 4ta y 5ta Después de los 40-50 días Mezclar con 200 g. de Mancozeb 80% en zonas donde exista resistencia a los cobres.
	Fumagina de los citrus (Capnodium citri)	200 g/hl	Cuando se observe el hongo, repitiendo cada 20 días
	Melanosis *(Diaporthe citri)*		1ra aplicación, cuando se forma el fruto. 2da 20 a 30 días después.
	Sarna o verrugosis (*Elsinoe fawcettii)*	250 g/hl	Iniciar cuando aparezcan los primeros botones (antes de la floración). 2º Aplicación: Después de la floración y 3º cuando cayeron las ¾ partes de los pétalos.
Cucurbitaceas (pepino, melón, zapallo)	Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis*)	700 g/ha	Aplicaciones cada 15 a 20 días. Suspender durante la floración
	Oidio (*Oidium spp*)		Con la aparición de los primeros síntomas.
Frutales de carozo (durazno, ciruelo, cerezo, damasco)	Mal de la munición *(Coryneum carpophilum)*	510 g/hl	Realizar 2 aplicaciones: en otoño, poco antes de la caída de las hojas y en primavera cuando las yemas se hinchan.
	Torque (*Taphrina deformans*)	200-400 g/hl	En otoño, a la caída de las hojas, Al hincharse las yemas (primavera). No aplicar en plena floración.
Maní	Viruela tardia (*Cercosporidium personatum*)	1,5-2 kg/ha	Comenzar las aplicaciones preventivamente, cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Repetir a intervalos de 10-14 días, conforme sea necesario para mantener el control. En caso de ataques severos, utilizar la dosis más alta. Hasta 3 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Papa	Tizón tardío (*Phytophtora infestans*)	550-750 g/ha	Aplicar preventivamente: 1ra Antes de la floración. 2da después de la floración. 3ra A los 15 y a los 25-30 días. En zonas con condiciones climáticas favorables a la aparición de la enfermedad, recorrer el cultivo diariamente. Pulverizar con altos volúmenes de agua, para cubrir adecuadamente el follaje; repetir las curas después de cada lluvia.
Pimiento	Viruela del Pimiento (*Cercospora capsici*)	340 g/hl	Cada 15 a 20 días desde que se forman las hojas hasta cerca de la cosecha.
Poroto	Antracnosis del poroto (*Colletotrichum lindemuthianum*)	550-750 g/ha	Aplicar de forma preventiva: 1ra aplicación en plantas de 15 - 20 días. Siguientes cada 15 - 20 días hasta antes de floración y después sobre el fruto verde.

Tomate	Viruela del tomate (*Septoria lycopersici*)	340 g/hl	Comenzar aplicando en el almácigo cuando aparecen las primeras hojas. Aplicar después de 10 días de efectuado el trasplante y seguir repitiendo cada 15 a 20 días según condiciones ambientales y sobre fruto verde.
Vid	Antracnosis de la vid (*Sphaceloma ampelinum*) Mildiu o Peronospora *(Plasmopara viticola)*	250 g/hl	Desde que los brotes tienen 8 a 10 cm de largo, cada 15 o 20 días, suspender durante la floración. Continuar después de ésta y hasta que los frutos se pongan "pintones".

Información General
Es un fungicida de acción preventiva y curativa, que combina dos fuentes de cobre como el oxicloruro de cobre e hidróxido de cobre. Los iones cúpricos reaccionan con las enzimas de las células de los patógenos, provocando la desnaturalización de las proteínas. Además, la presencia del ión cobre contribuye a suplir deficiencias de este elemento en el vegetal.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación
puede aplicarse con máquinas pulverizadoras de alto o bajo volumen, manuales o a motor, o con nebulizadoras para frutales. Se debe lograr un correcto mojado de toda la planta a tratar, utilizando la cantidad de agua necesaria hasta punto de goteo.
Para una mejor aplicación y cobertura, se recomienda 50/70 gotas/cm2 de superficie foliar. Se recomienda no superar el volumen de aplicación de 2000 L de agua por hectárea para aquellos cultivos en los que se aplica hasta saturación o punto de goteo de las hojas.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Compatibilidad
El producto resulta compatible con la mayoría de los plaguicidas de reacción neutra. De todas maneras, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

Periodo de carencia
Entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir no menos de 7 días para los cultivos de arveja, papa y poroto. Apio, citrus, cucurbitáceas, frutales de carozo, maní, pimiento, tomate, vid: 14 días.

Tiempo de reingreso al área tratada
48 horas después de aplicado el producto.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Derrames
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Contener el derrame evitando la contaminación de canales y superficies de agua. Absorber el producto derramado con un material inerte no combustible (como tierra, arena o arcilla) y transferirlo a contenedores adecuados para su disposición final. Lavar las áreas contaminadas con agua y detergente. No contaminar el medio ambiente.

Clasificación (modo o sitio de acción): M1(FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la boca. Evitar su inhalación. Durante la preparación y aplicación usar guantes y botas de goma, ropa protectora adecuada, máscara, anteojos y protector respiratorio. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lavar cuidadosamente con jabón y agua abundantes, las partes del cuerpo expuestas al producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca

Información Toxicológica:
Toxicidad aguda:
Oral: DL50 > 2000 mg/kg en ratas.
Producto ligeramente peligroso (CLASE III).
Dermal: DL50 > 2000 mg/kg en ratas.
Inhalación: CL50 > 1,21 mg/l. Categoría inhalatoria II (NOCIVO).
Irritación de la piel: No irritante.
Sensibilización de la piel: No sensibilizante.
Irritación para los ojos: Moderado irritante.
.
Riesgos ambientales:
Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: Moderadamente tóxico.
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico.
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GRIFFON	GOWAN ARGENTINA SRL	41998	WG	23,5% + 21,5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.