TETRACONAZOLE + AZOXISTROBINA

Marcas comerciales: CUSTODIA T – DOMARK EXCELL.

Nomenclatura Química:
tetraconazole: (RS)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il) propil 1,1,2,2 tetrafluoretil eter
azoxistrobina: éster metílico del ácido (E)-2-{2-[(6-(2-cianofenoxi)-pirimidin-4-il)oxi]-fenil}-3- metoxiacrilico
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: triazol + estrobilurina
Acción: sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante.

Uso: fungicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de aplicación
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium Personatum*) Viruela temprana (*Cercospora rachidicola*)	700 - 800 ml/ha (*)	Realizar la primera aplicación con la aparición de primeros síntomas y repetir en caso de ser necesario a los 15 o 21 días.
Soja	Mancha Marrón (*Septoria glycines*) Mancha ojo rana *(Cercospora sojina)*	500 ml/ha (**)	Aplicar en inicio de formación de vainas (R3) hasta R6 (máximo tamaño de semilla), cuando se observen los primeros síntomas en la planta
	Roya de la Soja *(Phakopsora pachyrhizi)* Tizón de la Hoja (*Cercospora kikuchii*)		Aplicar en forma preventiva, antes de la aparición de la enfermedad, cuando se detecten condiciones ambientales predisponentes. Luego de la primera aplicación, si las condiciones predisponentes persisten se deberá repetir la aplicación a partir de los 14 días.
Trigo	Roya de la hoja (*Puccinia tritici*) Roya Estriada (*Puccinia striiformis*)	600 - 800 ml/ha (**)	Aplicar al estadio fisiológico de producción de nudos hasta que la hoja bandera esté totalmente emergida (Z3.1 - Z3.9) en forma preventiva, o cuando se observen los primeros síntomas en la planta. Utilizar la menor dosis en condiciones de baja presión de la enfermedad y la mayor dosis en caso de condiciones altamente favorables para ocurrencia de la enfermedad.
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis*) Roya Negra o del tallo (*Puccinai graminis*)	800 - 1000 ml/ha (**)	

(*) Se debe emplear coadyuvante a base de Esteres metílicos de ácidos grasos de aceite de soja, a una dosis de 500 ml/ha.
(**) Usar coadyuvante a base de Aceite mineral parafínico o Esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal, a una dosis de 500 ml/ha, según las condiciones climáticas en el momento de la aplicación.

Información General
Es un fungicida que combina la acción de dos principios activos: el Azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobirulinas y el Tetraconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. La mezcla de ambos ingredientes activos determina una acción combinada, generando un efecto preventivo, curativo y erradicante. Azoxistrobina es un fungicida de acción sistémica que actúa interfiriendo la respiración celular a nivel de las mitocondrias, tiene acción preventiva y antiesporulante. El Tetraconazole actúa inhibiendo la producción de ergosterol, componente de la membrana celular del hongo, es eficaz tanto en aplicaciones preventivas, curativas y erradicantes. Posee un amplio período de protección.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación
Puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco o abanico plano para fungicidas. Utilizar un volumen mínimo de agua de 120 L/ha, para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Se recomienda lograr una cobertura de al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. Verificar el correcto funcionamiento del equipo y su calibración, antes de comenzar la aplicación. También puede aplicarse en forma aérea, empleando un volumen mínimo de 30 L/ha.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Compatibilidad
El producto resulta compatible con la mayoría de los plaguicidas de reacción neutra. De todas maneras, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

Periodo de carencia
Entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir 30 días para los cultivos de soja y trigo. Para el cultivo de maní deberán transcurrir no me nos de 35 días.

Tiempo de reingreso al área tratada
48 horas después de aplicado el producto.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Derrames
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Contener el derrame evitando la contaminación de canales y superficies de agua. Absorber el producto derramado con un material inerte no combustible (como tierra, arena o arcilla) y transferirlo a contenedores adecuados para su disposición final. Lavar las áreas contaminadas con agua y detergente. No contaminar el medio ambiente.

Clasificación (modo o sitio de acción):
G1:3 (FRAC) + C3: 11 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la boca. Evitar su inhalación. Durante la preparación y aplicación usar guantes y botas de goma, ropa protectora adecuada, máscara, anteojos y protector respiratorio. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lavar cuidadosamente con jabón y agua abundantes, las partes del cuerpo expuestas al producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Información Toxicológica:

Toxicidad aguda:
Oral: DL50: 2000 mg/kg de peso corporal.
Dermal: DL50 > 4000 mg/kg de peso corporal.
Inhalación: CL50 > 2.26mg/litro de aire.
Irritación de la piel: No irritante.
Sensibilización de la piel: No sensibilizante.
Irritación para los ojos: No irritante.

Riesgos ambientales:
Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: CL 50 = 6.70 mg/Litro para Danio rerio.
Toxicidad para aves: DL50: 2089 mg/Kg de peso vivo de Coturnix coturnix japonica.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CUSTODIA T	ADAMA ARGENTINA SA	40230	SC	8% + 10%	II
DOMARK EXCELL	GOWAN ARGENTINA SRL	37812	SC	8% + 10%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.