TRICHODERMA AFROHARZIANUM + BRADYRHIZOBIUM DIAZOEFFICIENS

Marcas comerciales: SIGNUM PACK 306

Nomenclatura Química:
Trichoderma afroharzianum cepa Th2. 3,24 % (2 x 10 exp8 conidios / cm3)
Bradyrhizobium diazoefficiens
Tipo de producto: biológico.
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: promotor de crecimiento, barrera de protección e inoculante microbiano.

Uso: Fertilizante biológico - Fungicida - Terápico para tratamiento de semillas.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	Fusariosis *(Fusarium* spp.) Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja *(Cercospora kikuchii)* Podredumbre carbonosa *(Macrophomina phaseolina)* Podredumbre húmeda del tallo *(Sclerotinia sclerotiorum)* Pudrición de raíz y tallo *(Rhizoctonia solani)* Tizón de la vaina y del tallo *(Phomopsis* spp.)	Cada 100 kg de semillas: 200 mL SIGNUM III + 100 mL RIZODERMA (*)	Ver información general.

(*) Agregue colorante (50 ml/100 Kg semilla) y/o polímero de tratamiento de semilla para darle tinción a la misma.

Información General:

RIZODERMA es un fungicida biológico selectivo formulado en base al hongo antagonista Trichoderma harzianum. Sus unidades infectivas inactivan, inhiben y mico parasitan patógenos causantes de enfermedades en los cultivos de Trigo, Soja, Arroz, Cebada y Maíz. RIZODERMA además actúa promoviendo el crecimiento vegetal (efecto PGPR) estimulando el incremento de la longitud, el volumen y/o el peso seco de las raíces y partes aéreas de las plántulas. La aplicación de RIZODERMA mejora el stand de plantas logradas a campo.

SIGNUM III es un fertilizante biológico que actúa como un generador de señales moleculares que activan de manera temprana procesos metabólicos en las bacterias y las plantas, lo que permite maximizar el desarrollo de las leguminosas. SIGNUM III ha sido elaborado con Tecnología Osmo Protectora (TOP) permitiendo ampliar el tiempo de siembra de las semillas posteriores a su tratamiento. Contiene a la elaboración 2x10 exp10 y a su vencimiento 2x10 exp9 bacterias por mL, cuando el producto se almacena en las condiciones recomendadas.

Esta tecnología ofrece una mayor concentración de bacterias, altos niveles de supervivencia bacteriana sobre la semilla, mejorando así el manejo de la semilla tratada.

INDICACIONES DE USO:
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
Procedimiento para tratar 3000 kg de semilla de soja hasta 20 días antes de la siembra:
Previo a su apertura agite brevemente los bags in box para homogeneizar el contenido. Para una correcta aplicación verifique el estado del equipo previo a su utilización, realizando una correcta limpieza y calibración de este.
Mezclar los contenidos y aplicar sobre la semilla. No requiere agregado de agua.
Realizar una mezcla homogénea de 200 ml SIGNUM III + 100 ml de RIZODERMA + 50 ml de colorante para tratar 100 kg semilla.

Importante:
- El tratamiento de semillas deberá llevarse a cabo en lugares donde no incida la radiación solar directa.
- Para aplicaciones combinadas con productos compatibles seguir el método secuencial seco:
Aplicar primero los terápicos de base química para el tratamiento de semillas, dejar orear y secar,
Y por último aplicar los fertilizantes biológicos en conjunto con RIZODERMA.
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): BM 02 (FRAC) + no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. El tratamiento debe realizarse en áreas bien ventiladas. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel.

Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar el contacto con la semilla tratada durante su manipuleo (movimiento de bolsas, apertura de bolsas y llenado de cajón sembrador).

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2,3 mg /l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces:	Prácticamente no tóxico

Persistencia en suelo: altamente degradable.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SIGNUM PACK 306	RIZOBACTER ARGENTINA S.A.	PACK (38004 +21612)	LÍQUIDO	2 x 10 exp8 conidios / cm3 + 2 x1 exp8 UFC/mL	IV

Pack conformado por Rizoderma (N° 38.004) y Signum III (N° 21.612)

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.