# TRICHODERMA AFROHARZIANUM + SEDAXANE

**Marcas comerciales**: RIZODERMA SX PACK

**Nomenclatura Química:**
*Trichoderma afroharzianum* cepa Th2. 3,24 % (2 x 10 exp8 conidios / cm3).
sedaxane: mezcla de 2 cis-isómeros 2´-[(1RS,2RS)-1,1´-bicicloprop-2-yl]-3-(difluorometil)-1-metilpyrazole-4-carboxanilida y 2 trans isómeros 2´-[(1RS,2SR)-1,1´-bicicloprop-2-yl]-3-(difluorometil)-1-metilpyrazol-4-carboxanilida
**Tipo de producto:** Químico + Biológico.
**Clasificación Química:** biológico (no corresponde c.q.) + pirazol y carboxamida
**Acción:** promotor de crecimiento, barrera de protección y sistémica.

**Uso:** Biofungicida - Fungicida - Terápico para tratamiento de semillas

| Cultivo | Adversidad | Dosis | Momento de aplicación |
|---|---|---|---|
| Cebada | Alternaria *(Alternaria* spp.) Fusariosis (*Fusarium* spp.) Hongos del suelo, Damping off *(Rhizotocnia solani)* Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha borrosa *(Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red *(Drechslera teres)* | 400 mL* de RIZODERMA + 20 mL VIBRANCE SEMILLERO cada 100 kg de semillas. (*) | Ver información general. |

(*) Agregue Colorante (50 mL/100 kg) y/o polímero de tratamiento de semilla para darle tinción a la misma. Utilizar la dosis recomendada para cada semilla y cultivo.

**Información General:**
RIZODERMA es un fungicida biológico selectivo formulado en base al hongo antagonista *Trichoderma harzianum*. Sus unidades infectivas inactivan, inhiben y mico parasitan patógenos causantes de enfermedades en los cultivos de Trigo, Soja, Arroz, Cebada y Maíz. Además actúa promoviendo el crecimiento vegetal (efecto PGPR) estimulando el incremento de la longitud, el volumen y/o el peso seco de las raíces y partes aéreas de las plántulas. La aplicación de RIZODERMA mejora el stand de plantas logradas a campo. VIBRANCE SEMILLERO es un fungicida terápico para el tratamiento de semillas de maíz, soja y cebada. Está especialmente diseñado para el control de *Rhizotocnia solani*, enfermedad que afecta al cultivo durante su implantación.
Periodo de carencia: RIZODERMA y VIBRANCE SEMILLERO se hallan exentos de período de carencia para el uso como terápico para tratamiento de semillas. En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. Atención: La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados. El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

INDICACIONES DE USO:
Procedimiento para tratar 1500 kg de semilla de cebada: Previo a su apertura agite brevemente los bags in box para homogeneizar los contenidos. Para una correcta aplicación verifique el estado del equipo previo a su utilización, realizando una correcta limpieza y calibración de éste. Mezclar los contenidos y aplicar sobre la semilla.
No requiere agregado de agua. Realizar una mezcla homogénea de 400 mL de RIZODERMA + 20 mL de VIBRANCE SEMILLERO + 50 mL de colorante para tratar 100 kg de semilla.

Importante:
- El tratamiento de semillas deberá llevarse a cabo en lugares donde no incida la radiación solar directa.
- Para aplicaciones combinadas con productos compatibles seguir el método secuencial seco: aplicar primero los terápicos de base química para el tratamiento de semillas, dejar orear y secar, y por último aplicar los fertilizantes biológicos en conjunto con RIZODERMA.
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

**Derrames:**
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** BM 02 (FRAC) + 7 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. El tratamiento debe realizarse en

áreas bien ventiladas. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar el contacto con la semilla tratada durante su manipuleo (movimiento de bolsas, apertura de bolsas y llenado de cajón sembrador).

**Información Toxicológica:**

DL 50 oral: 2975 mg/kg (ratas)
DL 50 dermal: >5050 mg/kg (ratas)
CL50 inhalación aguda: >2,56 mg/litro (ratas)
Leve irritante dermal y ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
Síntomas de intoxicación aguda: no se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Riesgos ambientales:
Es moderadamente tóxico para peces y crustáceos.
No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Es prácticamente no tóxico para aves. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.
Es virtualmente no tóxico para abejas.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZODERMA SX PACK | RIZOBACTER ARGENTINA S.A. | Pack (38004 + 37662) | FS | 2 x 10 exp8 conidios / cm3 + 50% | III |

Pack conformado por Rizoderma (N° 38.004) y Vibrance semillero (N° 37.662)

**Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.**
**Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.**