PROTHIOCONAZOLE + TRIFLOXISTROBIN + ISOFLUCYPRAM

Marcas comerciales: IBLON PRO.

Nomenclatura Química:
2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4- triazole-3-thione methyl (2E)-(methoxyimino)(2-{[({(1E)-1-[3-(trifluoromethyl) phenyl]ethylidene} amino) oxy]methyl}phenyl)acetate N-[(5-chloro-2-propan-2-ylphenyl) methyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methylpyrazole-4-carboxamide.
Tipo de producto: químico**.**
Clasificación Química: triazol + estrobilurina + pirazol - carboxamida - SDHIs.
Acción: sistémica, mesostémica, inhibidoras del succinato deshidrogenasa (SDHI)

Uso: fungicida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Mancha en red *(Drechslera teres)*	600-700 ml/ha	35	Aplicar considerando el uso de umbrales de aplicación vigentes. Intensificar el monitoreo a partir de fin de macollaje - encañazón. Utilizar la dosis mayor en cultivos de alto potencial de rendimiento, cultivares susceptibles y/o condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades.
Mani	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum*)	700-800 ml/ha	20	Aplicar ante condiciones ambientales predisponentes o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir en caso de ser necesario con un intervalo mínimo de 14 días. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo del cultivo. Rotar con otros fungicidas de diferente modo de acción. No se recomienda aplicar en mezclas con aceites y/o herbicidas que necesiten aceite en su aplicación.
Soja	Mancha anillada *(Corynespora cassiicola)* Mancha marrón (*Septoria glycines)*	350-400 ml/ha	35	Aplicar desde R1 (inicio de floración) y hasta R5.1 (inicio de formación de granos, perceptibles al tacto, hasta 10% de llenado de granos), cuando se observen los primeros síntomas y/o en función a los umbrales existentes para cada enfermedad con condiciones ambientales favorables para el desarrollo de las mismas. Utilizar la dosis mayor en cultivos de alto potencial de rendimiento, cultivares susceptibles y/o condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis*) Roya amarilla o estriada (*Puccinia striiformis f.sp.tritici*) Roya de la hoja o roya anaranjada (*Puccinia recondita*) Roya de la hoja o roya anaranjada (*Puccinia triticina*) Roya negra o del tallo (*Puccinia graminis f. sp. tritici*)	600-700 ml/ha		Aplicar considerando el uso de umbrales de aplicación vigentes. Intensificar el monitoreo a partir de fin de encañazón. Utilizar la dosis mayor en cultivos de alto potencial de rendimiento, cultivares susceptibles y/o condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades

Notas al cuadro de uso: Para soja, cebada y trigo, aplicar con coadyuvante Optimizer (Esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal): 0,5 L/ha en aplicaciones aéreas de caudales de 20 litros/ ha, y 0,3 L/ha en aplicaciones terrestres de caudales entre 100 y 150 litros/ha. No aplicar IBLON PRO cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés tales como sequía prolongada, baja fertilidad, bajas temperaturas (menores a 10°C), heladas, humedad relativa baja (debajo de 55%), altas temperaturas (mayores a 30 °C), ya que, bajo dichos factores, el cultivo podría verse afectado negativamente.

Información General:

El producto formulado es un fungicida a base de Isoflucypram, Prothioconazole y Trifloxystrobin

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede ser aplicado con las pulverizadoras con cabina (o bien empleando equipos de protección personal), convencionales ya sean de arrastre o autopropulsadas siempre que estén provistas de un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo tal, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Los equipos de aplicación deben ubicar a los aspersores en la parte trasera del tractor y el asiento del operador debe estar ubicado sobre la altura del botalón o línea de aspersión.
Es importante provocar un buen mojado de las plantas; para ello, se deben lograr aplicar entre 50 y 70 gotas /cm2; utilizando un volumen de agua orientativo entre 100 y 150 litros de agua por hectárea en aplicaciones terrestres y 20 litros de agua por hectárea en aplicaciones aéreas.
Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 10 km/h. No aplicar si la temperatura es mayor a 30°C y la humedad relativa es menor a 55% y evitar la deriva hacia áreas no objeto de control.
No aplicar con equipos de aspersión manual.

Compatibilidad:
En caso de aplicar este producto junto con otros plaguicidas indicados en el marbete, realizar previamente una prueba de compatibilidad para determinar la calidad de la emulsión del caldo conformado por cada componente en pequeña escala.

Fitotoxicidad: No se detectan casos de fitotoxicidad atribuido al fungicida ANURIS IBLON siguiendo las recomendaciones de este marbete, bajo las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) con pala e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción de acuerdo con la normativa legal vigente. Para esta actividad, utilizar los equipos de protección personal detallados anteriormente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 7 (FRAC) + 3 (FRAC) + 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación use guantes resistentes a productos químicos, calzado resistente, anteojos de protección, y ropa protectora adecuada (pantalón largo y remera manga larga). No fume, no coma ni beba durante la preparación.
Durante la aplicación use guantes resistentes a productos químicos, botas, anteojos de protección y ropa protectora adecuada (pantalón largo y remera manga larga especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda(rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 2,04 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Muy tóxico

No contaminar cursos ni espejos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
IBLON PRO	AGRO BAYER SRL	42075	SC	20.4% + 15.9% + 6.8%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.