



FICHE BONNE CONDUITE N°33 - ALIMENTATION ET REPAS DE L'ENFANT

CATEGORIE GARDE D'ENFANTS A DOMICILE

Dans le cadre de mes missions, je peux être amené à préparer et faire prendre les repas à des enfants que j'accompagne. Donner le biberon, préparer les repas et aider à leur prise sont des actes essentiels de la vie quotidienne.

En fonction de l'âge des enfants que j'accompagne, j'adapte ce moment pour favoriser leur bien-être, développer leur autonomie et lutter contre la dénutrition et la déshydratation.

REGLES D'OR

- ✓ **J'échange avec la famille** et m'adapte à ses habitudes pour définir avec elle le menu et tenir compte des préférences, habitudes alimentaires, ingrédients à éviter (ex : sel, miel, certains fromages etc.) et régimes spécifiques (ex : allergies).
- ✓ Je vérifie à l'avance l'existence ou non d'un **Protocole d'Accueil Individualisé (PAI)**.
- ✓ Pour le biberon, je vérifie avec la famille les conditions d'utilisation (ex : sens de la tétine) et les quantités de lait.
- ✓ Je me **lave les mains** avant la préparation du repas/l'aide à la prise alimentaire et **j'invite l'enfant de plus de 1 an à le faire également**.
- ✓ Je suis **attentif aux dates limites de consommation** et aux **règles de conservation** (ex : plats déjà ouverts, plats décongelés) pour éviter les intoxications. Pour le biberon, je vérifie qu'il ait été nettoyé.
- ✓ Pour la préparation des plats, je respecte les **différentes méthodes de préparation ou de réchauffage** (petit pot, plat surgelé...).
- ✓ Je prépare en amont le nécessaire pour le **bon déroulement** du repas (ex : bavoir etc.) et je mets en place les **conditions propices** (lieu ou espace dédié etc.) en veillant à la **sécurité** de l'enfant (ex : attacher la sangle de la chaise haute)
- ✓ Je sers de **petites portions** à l'enfant.
- ✓ **J'encourage** l'enfant de plus de 1 an à **manger seul**.

POINTS DE VIGILANCE

- ✓ Je ne **décide pas à la place des parents**. **J'échange en amont avec eux** pour connaître la conduite à tenir (ex : l'enfant doit-il finir son repas ?).
- ✓ Je pense à **sortir les plats froids** quelques minutes avant le repas.
- ✓ **Lorsque je donne un biberon ou un plat**, je vérifie qu'il ne soit pas trop chaud, en versant quelques gouttes de lait sur l'intérieur de mon poignet ou en goutant le plat.
- ✓ Je suis attentif aux risques de **fausse route/étouffement**, en découpant des morceaux de taille adaptée (ex : couper une saucisse en biais et non en rondelles) et en évitant les aliments durs qui pourraient être gobés.
- ✓ Je reste **présent** et me **consacre** à l'enfant, en évitant de faire une autre tâche en même temps, car cela peut perturber son appétit.
- ✓ Si l'enfant ou le bébé ne **mange pas, j'essaie de comprendre pourquoi** (ex : inconfort, maladie etc.). Je ne le force pas à manger ou je ne le punis pas, je lui propose autre chose à la place.
- ✓ Si j'ai un doute par rapport aux demandes des parents concernant l'alimentation de l'enfant, je me rapproche de mon association.
- ✓ Je **signale dans le cahier de liaison tout changement de comportement** lors du repas (ex : perte d'appétit, refus, tristesse, endormissement inhabituel...).
- ✓ En cas de doute sur la pratique, ou en cas de questionnement par rapport à la sécurité de l'enfant, **j'en échange avec la famille**, que j'essaie de sensibiliser aux risques. Si la famille insiste, je me réfère à l'association avant de d'agir.



Comment préparer le biberon ?

1.



Je vérifie la propreté des biberons, tétines et ustensiles employés. Je nettoie le biberon s'il n'est pas propre (cf. encadré ci-contre). La cuillère-mesure (ou "dosette") fournie avec la boîte de lait doit toujours rester sèche.

2. Je mets la **quantité d'eau nécessaire** dans le biberon, selon les recommandations du parent.

Le nettoyage du biberon

1. Je démonte le biberon en séparant la tétine, la bague et le capuchon du biberon
2. Je le lave à l'eau chaude et au savon ou liquide vaisselle en petite proportion, si possible à l'aide de goupillons (un grand pour le contenant, un petit pour la tétine). Je n'oublie pas de retourner la tétine pour la nettoyer et de bien frotter la bague.
3. Je rince soigneusement. Je n'utilise pas de torchon qui pourrait apporter des microbes. Pour le faire sécher, je retourne le biberon, tête en bas, à l'air libre, sur un égouttoir.

3.



Je dose la quantité de lait en fonction des instructions précisées sur la boîte, ou en fonction des recommandations des parents. Pour un dosage correct, je ne tasse pas la poudre et ne fais pas de doses bombées. Je retire le rebord de la boîte de lait pour arraser la dosette, afin d'enlever le surplus de lait. Pour éviter toute contamination par des bactéries, je ne réalise pas ce geste avec le doigt.

4. Lorsque toute la poudre est dans le biberon, **j'agite celui-ci fortement** en le roulant entre les paumes de mes mains, afin de reconstituer le lait liquide. Je vérifie qu'il ne reste ni grumeaux, ni poudre non diluée dans le fond ou dans la tétine.

5. Le lait peut être **bu à température ambiante ou peut être tiédi** (max 37°C), selon les habitudes de l'enfant. Il est déconseillé de réchauffer un biberon en plastique au micro-ondes, en raison des molécules de plastique qui peuvent se diffuser dans le lait sous l'effet de la chaleur. Un bain-marie ou un chauffe-biberon est préférable.



6.



Après avoir chauffé le biberon, **je le referme puis je l'agite fortement** pour obtenir une température homogène dans tout le liquide. Je teste la température ne mettant une goutte sur ma main.

Le lait maternel

Si le lait à donner est un lait maternel tiré par la maman, seules les étapes 1, 5 et 6 s'appliquent. Les règles de conservation ci-dessous doivent avoir été respectées, il convient de les vérifier avec les parents :

- Le lait est conservé au réfrigérateur, idéalement à une température de 4°C.
- Il a été tiré dans les 48h maximum précédant la consommation.
- En cas de stockage au congélateur : il doit avoir été stocké à -18°C minimum (attention : le freezer ou bac à glaçons n'atteignent pas les -18°C), dans les 4 mois maximum précédant la consommation. Il doit ensuite avoir été placé dans le réfrigérateur au moins 6h avant l'heure prévue pour la consommation. Il doit être consommé dans les 24h maximum après la mise au réfrigérateur. Il ne faut surtout pas recongeler du lait décongelé, ni ajouter du lait fraîchement recueilli à du lait congelé.

A la sortie du réfrigérateur, si le lait est séparé en une couche de lait et une couche de crème, cela est normal. Je l'agite doucement pour qu'il soit à nouveau homogène.



Comment faire pour donner le biberon ?

- Je m'installe confortablement, et je m'assure que l'enfant est également à l'aise dans mes bras
- Lorsque je donne le biberon, je place le bébé en **position semi-allongée** (ses fesses doivent être plus basses que sa tête). Je le laisse prendre la tétine naturellement.
- **J'incline le biberon** pour que la tétine soit pleine et qu'il avale le moins d'air possible. Je vérifie la présence de petites bulles remontant à la surface dans le biberon.
- **Pour éviter la régurgitation**, je fais faire des pauses au bébé pour lui permettre de faire un rot et d'évacuer l'air.
- **Je rehausse l'enfant « en douceur » à la fin**, je le garde en position verticale et le tapote avec soin au niveau des omoplates jusqu'à ce qu'il fasse un rot.



Nota bene : Les régurgitations après le biberon sont fréquentes et sans danger, mais les vomissements abondants et en jet nécessitent d'alerter les parents.

Comment réagir si l'enfant s'étouffe ?

1. Je ne donne **pas de nourriture ou d'eau** dès que je m'aperçois de la situation.
2. Je m'assure de **l'absence de corps étranger** dans la bouche.
3. Si l'étouffement est partiel (l'enfant tousse ou crie) **je l'invite à tousser** (s'il est en âge de le faire) jusqu'à ce que le corps étranger ressorte.
4. Si l'étouffement est total (aucun son ne sort de la bouche, l'enfant devient bleu...), **je réalise une manœuvre de désobstruction** : 5 claques dans le dos suivies de 5 compressions (manœuvre de Heimlich). Je continue le cycle jusqu'à ce que le corps étranger ressorte.
5. **J'appelle les secours** dès que possible (15 ou 18).
6. J'informe mon association et les parents de la situation.

Comment réagir en cas de réaction allergique ?

1. Si l'allergie est connue et s'il existe un **Protocole d'Accueil Individualisé (PAI)**, je respecte strictement les consignes, ainsi que celles délivrées par les parents à l'avance. Je ne donne de traitement que si les parents m'ont donné une autorisation écrite, l'ordonnance médicale et m'ont expliqué au préalable comment donner le médicament.
2. Dès l'apparition de signes, même bénins, ressemblant à ceux d'une allergie non connue (ex : rougeurs, démangeaisons, gorge qui gratte, toux, modification de la voix qui devient rauque...), **j'appelle les secours dès que possible** (15 ou 18) pour prendre un avis médical.
3. J'informe tout de suite mon association et les parents de la situation.

PREVENTION DES RISQUES :

- ✓ Je m'installe confortablement pour **éviter une mauvaise posture** lors de la prise du biberon. Je mets un coussin sous mon bras (ex : coussin d'allaitement).
- ✓ Je suis vigilant au **risque de brûlure ou de coupure** pendant la préparation des repas / du biberon.
- ✓ L'étape du repas de l'enfant peut être **éprouvante émotionnellement**. Si je sens que je vais perdre mon calme, j'interromps le repas / la prise du biberon, je mets l'enfant en sécurité (ex : le descendre de sa chaise, le déposer dans son transat ou son lit...) et quitte la pièce quelques minutes le temps de reprendre mes esprits.
- ✓ Si mon moral est **affecté** par la situation, j'en parle à mon entourage personnel ou professionnel, mon médecin traitant ou à un psychologue de Pros-Consulte (0805 23 23 40 ou application mobile). Si je rencontre des **difficultés récurrentes** dans ma pratique professionnelle, j'en parle à mon association pour trouver une solution.