



FICHE BONNE CONDUITE N°35 – ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS CHEZ L'ENFANT

CATEGORIE GARDE D'ENFANTS A DOMICILE

En tant que professionnel de la garde d'enfants à domicile, je suis autorisé à administrer aux enfants dont j'ai la charge, notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux.

REGLES D'OR

- ✓ Je demande toujours aux parents ou représentants légaux de l'enfant de m'expliquer les **conditions d'administration du médicament** (heure de prise, posologie, voie d'administration, geste à réaliser, conduite à tenir en cas de refus...).
- ✓ Je m'assure d'avoir l'**ordonnance prescrivant le médicament** ou une copie de celle-ci et je me conforme exactement à ce qui y est écrit.
- ✓ **Je me lave soigneusement les mains** avant chaque administration. Je peux utiliser des gants pour certains gestes (suppositoires...).
- ✓ J'administre le traitement dans un **endroit calme et confortable**.
- ✓ Peu importe son âge, **j'explique tous mes gestes à l'enfant**.
- ✓ **Je note sur un document dédié chaque acte effectué ou médicament administré** en précisant : le nom de l'enfant (si je garde plusieurs enfants en même temps), la date et l'heure de l'acte, le nom du médicament administré et la posologie.

POINTS DE VIGILANCE

- ✓ Avant d'administrer tout traitement, je vérifie auprès de mon association que **je suis bien autorisé à le faire** (contrat de travail, autorisation écrite des parents).
- ✓ Si l'enfant n'a jamais reçu le traitement auparavant, **il est vivement recommandé que les parents procèdent à la première administration** notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'allergie ou de réaction.
- ✓ Je n'utilise que le **médicament ou le matériel nécessaire fourni par les parents** et je m'assure que celui-ci soit apte à être consommé (date de péremption...).
- ✓ Pour certains médicaments, il peut être nécessaire **d'immobiliser l'enfant** (gouttes). Je m'y prends avec douceur et lui explique mon geste.
- ✓ Je m'assure de **tenir tout médicament hors de portée** de l'enfant.

Comment administrer un médicament à un bébé de moins d'un an par voie orale ?

Les médicaments pour bébé s'administrent le plus souvent par voie orale, par une seringue orale graduée.

1. Je tiens le bébé dans le **creux de mon bras**, comme si je lui donnais à boire. S'il est capable de se tenir assis, je peux **l'asseoir dans sa chaise haute ou sur mes genoux** afin qu'il me voie bien lorsque je lui administre le médicament.
2. **Je place la seringue dans sa bouche** en l'orientant vers l'intérieur de sa joue afin d'éviter qu'il s'étouffe avec le liquide.
3. **Je pousse lentement le piston** de la seringue pour laisser le temps au bébé d'avaler le médicament. S'il est âgé de 1 à 4 mois, je peux souffler doucement sur son visage au moment de l'administration du médicament (cette technique déclenche le réflexe de déglutition, qui aide à avaler le médicament).



Comment administrer un suppositoire à un bébé ?

1. Je déshabille le bas du bébé, je retire sa couche et lui nettoie le siège. **Je l'allonge sur le dos sur une surface plane, propre et confortable.** Je replie ses jambes en l'air pour dégager son anus. Je peux également l'allonger sur le ventre et écartier ses fesses pour pouvoir insérer le suppositoire.
2. Je sors le suppositoire de son emballage avec précaution et je le laisse fondre quelques secondes à l'entrée de l'anus pour lubrifier et dilater légèrement ce dernier. Je place l'extrémité plate en premier et non pas le côté pointu pour garantir une bonne propulsion dans le rectum.
3. **J'insère délicatement le suppositoire** et le plus profondément possible pour éviter une expulsion involontaire. Si je rencontre des difficultés à l'insérer, je ne force pas, j'attends un peu et ressaye délicatement. J'attends quelques secondes et je contrôle que le suppositoire n'est pas ressorti.
4. **Je jette l'emballage** et les éventuels gants utilisés. Je me lave à nouveau soigneusement les mains et je nettoie toute surface qui aurait pu être en contact avec le suppositoire ou avec de la matière fécale.

Comment administrer des gouttes dans les yeux ?

1. Je couche l'enfant sur une **surface plane, propre et confortable.**
2. **Je reproduis le geste que le parent m'a montré** pour administrer les gouttes (ex : tête en arrière ou relevée, techniques pour immobiliser la tête...)
3. **Je prends le temps pour rassurer l'enfant** : les pleurs diluent les gouttes et empêchent leur bonne administration.
4. Si nécessaire, **je nettoie ses paupières et ses cils avec un coton imbibé d'eau tiède.**
5. **J'agite le flacon** quelques secondes. Avec le pouce de la main qui ne tient pas le flacon, **j'abaisse une paupière inférieure** jusqu'à ce qu'elle forme une petite poche.
6. **Je dépose une goutte de liquide dans cette poche** sans que l'embout ne touche l'œil lui-même. Je relâche la paupière. Si l'enfant est en âge de comprendre, je lui demande de bouger ses yeux en regardant de droite à gauche et de haut en bas.
7. **Je referme le flacon et le mets hors de portée de l'enfant.**

Comment administrer un traitement par voie nasale ?

1. Si l'enfant n'est pas en âge de le faire par lui-même, **je procède à un lavage de nez** (cf. encadré ci-contre).
2. S'il tient assis, **je l'assoie face ou contre moi.** Sinon je l'allonge.
3. Je **secoue le flacon** et fais une première pulvérisation à l'extérieur pour vérifier que le pulvérisateur fonctionne correctement.

Le lavage de nez chez le bébé :

1. Je me munis d'une **dosette de sérum physiologique.**
2. J'allonge le bébé sur le côté (ou éventuellement sur le ventre), et je **maintiens sa tête sur le côté**, afin d'éviter le passage involontaire de sérum dans les voies respiratoires.
3. J'ouvre la dosette et place doucement l'embout de la **dosette à l'entrée de la narine** située le plus haut, par rapport à la position du bébé.
4. **J'introduis le contenu de la dosette** dans la narine en la pressant. Fréquemment, du sérum ressort par l'autre narine avec les sécrétions nasales.
5. **J'attends que bébé ait dégluti** correctement et que les sécrétions du nez se soient bien écoulées.
6. **J'essuie son nez.**
7. Si le nez n'est pas suffisamment désobstrué, **je répète cette opération** pour l'autre narine.



4. **J'introduis doucement l'embout du flacon dans une narine.** Je m'assure que le flacon soit bien inséré pour éviter toute pulvérisation dans l'œil.
5. **Je fais une pulvérisation** et j'essuie son nez.
6. **Je recommence la même chose** dans l'autre narine si cela est demandé par les parents.

Que faire si l'enfant ne veut pas prendre son médicament ?

1. **J'adopte une attitude positive**, je fais preuve de patience et de douceur pour lui expliquer, avec des mots adaptés à son âge, que ce médicament l'aidera à se sentir mieux et à guérir. Je peux lui dire des phrases comme : « *Je te donne un médicament pour t'aider à aller mieux.* » ou « *Ce médicament va aider à faire partir le microbe [ou un autre mot qu'il comprend, par exemple « bobo »]* » ou « *Ce médicament va soulager ton mal de ventre* ».
2. Si ces explications ne fonctionnent pas, **je n'insiste pas et je ne punis pas l'enfant. Je lui propose de faire autre chose** pour lui changer les idées et le réconforter avant de tenter de nouveau de lui administrer son médicament.
3. Si le refus persiste, **je me réfère à la conduite à tenir donnée par les parents.**

PREVENTION DES RISQUES :

- ✓ Si l'enfant semble agité ou présente des troubles, **je fais attention aux risques de morsure.**
- ✓ Je me protège des **risques biologiques** (éternuements, crachats, matière fécale...) en me positionnant de façon à éviter le plus possible la contamination et en portant si besoin des équipements de protection individuelle (masques, gants...).
- ✓ L'administration de médicaments peut être **éprouvante émotionnellement**. Si je sens que je vais perdre mon calme, j'interromps l'acte, je mets l'enfant en sécurité et quitte la pièce quelques minutes le temps de reprendre mes esprits.
- ✓ Si mon moral est **affecté** par la situation, j'en parle à mon entourage personnel ou professionnel, mon médecin traitant ou à un psychologue de Pros-Consulte (0805 23 23 40 ou application mobile).
- ✓ Si je rencontre des difficultés récurrentes dans ma pratique professionnelle, **j'en parle à mon association pour trouver une solution.**