



FICHE BONNE CONDUITE N°37 - SOMMEIL DE L'ENFANT

CATEGORIE GARDE D'ENFANTS A DOMICILE

Avoir un bon sommeil est fondamental pour assurer un bon équilibre physique et un bon développement psychologique dès le plus jeune âge. Les enfants ont besoin de conserver un rythme précis pour être en bonne forme le lendemain. C'est pourquoi je dois pouvoir accompagner au mieux l'enfant au moment du coucher et l'accompagner psychologiquement pour faciliter l'endormissement.

REGLES D'OR

- ✓ En fonction de ce qui est demandé, j'adapte ma pratique professionnelle pour **respecter les habitudes de la famille**. Si elle a une **routine** spécifique pour le coucher de l'enfant (rythme, lieu, rituel etc.), j'en tiens compte et j'adapte mon accompagnement.
- ✓ Si l'enfant est en situation de handicap, je vérifie avec les parents s'il y a besoin d'une présence permanente dans la pièce.
- ✓ **Je repère les signes de fatigue chez l'enfant** (bâillements, yeux qui piquent, difficultés de concentration...). Pour les enfants de plus d'un an, je peux leur expliquer afin qu'ils puissent repérer eux-mêmes quand ils ont besoin de repos.
- ✓ Je m'assure que l'enfant **se brosse les dents** avant d'aller se coucher (s'il est en âge de le faire), ou je le fais pour lui (voir fiche Hygiène bucco-dentaire de l'enfant)
- ✓ **Je m'assure que l'enfant s'endorme** dans environnement rangé et apaisé. Je crée une **ambiance paisible** en utilisant des lumières tamisées, en limitant le bruit et en parlant doucement.
- ✓ Je peux **lire une petite histoire à l'enfant ou lui chanter une chanson** pour l'aider à s'endormir.
- ✓ Je m'assure qu'il ait sa **tétine** et/ou son **doudou** s'il en a un habituellement.
- ✓ Si possible je m'assure de la **bonne température** de chambre (entre 18 et 20 °C)

POINTS DE VIGILANCE

- ✓ Dans les deux heures qui précèdent le coucher, **j'évite les écrans** (télé, téléphone, jeux vidéo).
- ✓ Avant de le coucher, je vérifie que l'enfant est allé aux toilettes ou que la couche a été changée pour éviter les réveils.
- ✓ Si l'enfant a moins d'un an, **je le couche toujours sur le dos**. Il s'agit de la posture recommandée afin d'éviter le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).
- ✓ Si l'enfant a moins d'un an, je ne mets **ni oreiller, ni édredon, ni contour de lit**. J'éloigne les **peluches** de la tête de l'enfant. Pour le couvrir, j'utilise si possible une gigoteuse ou un drap léger et j'évite les couvertures lourdes.
- ✓ Si la famille a l'habitude d'**emmailloter** son enfant pour le coucher, je dois avoir été formé à cette technique par un professionnel de santé.
- ✓ Si l'enfant a moins d'un an, **je ne le laisse pas sans surveillance**. Dès que je quitte la chambre, je m'assure que la porte soit ouverte et que je puisse l'entendre ou j'utilise le babyphone.
- ✓ **Je n'envoie pas l'enfant au lit en guise de punition**, afin d'éviter qu'il associe le sommeil à celle-ci.
- ✓ En cas de doute sur la pratique, ou en cas de questionnement par rapport à la sécurité de l'enfant, **j'en échange avec la famille**, que j'essaie de sensibiliser aux risques. Si la famille insiste, je me réfère à l'association avant de d'agir.



Comment réagir si l'enfant ne dort pas (sieste et coucher) ?

- **J'analyse les causes** : l'enfant a-t-il faim ou soif ? Sa couche est-elle pleine ? Est-il fiévreux ou malade ? Est-ce dû à une terreur nocturne ou un cauchemar ? J'adapte la réponse en fonction.
- S'il n'est pas malade et si malgré la réponse donnée, l'enfant ne se rendort pas, **je le rassure**, en lui parlant à voix basse, sans allumer la lumière de sa chambre. Je lui rappelle qu'il est en sécurité dans son lit, je peux lui caresser le dos ou la tête pour qu'il se calme. Je peux le prendre dans les bras pour l'aider à s'apaiser.
 - o **S'il s'agit d'un bébé** :
 - Je marche pendant 5 minutes avec l'enfant dans les bras pour le calmer. Je peux marcher plus longtemps s'il pleure très fort.
 - Une fois que l'enfant est calmé, je m'assoie entre 5 et 8 minutes avant de le reposer dans son lit.
 - Je peux le porter et le bercer pour l'endormir si cela est nécessaire. Pour cela je peux le placer face à moi contre ma poitrine, le placer sur l'avant-bras en position dorsale avec la tête posée au creux du coude, ou le coucher sur le ventre en appui sur mon thorax, à califourchon sur mon bras (cf. fiche portage et mobilité de l'enfant).
 - o **S'il s'agit d'un enfant de plus d'1 an** :
 - J'insiste un peu pour essayer d'endormir l'enfant, en recommençant son rituel de coucher ou en proposant une activité apaisante (histoire musicale, musique douce), pour réessayer un peu plus tard de le recoucher.
- **Si l'enfant refuse malgré toute tentative d'apaisement**, je n'insiste pas même si la famille attend ou insiste pour qu'il dorme.
 - o **S'il s'agit d'un bébé** : je peux faire une promenade dehors, l'air extérieur pouvant aider à apaiser et assoupir l'enfant.
 - o **S'il s'agit d'un enfant de plus d'1 an** : je propose une autre activité. Il faut éviter de forcer l'enfant à faire une sieste, afin qu'il associe ce temps de repos à une bonne expérience.
 - o Si la situation est récurrente, je peux solliciter la famille pour savoir si je peux proposer **l'alternative du temps calme à la place** (notamment pour les enfants de plus de 3 ans).

PREVENTION DES RISQUES :

- ✓ Lorsque je porte un bébé, **je respecte les bonnes pratiques et les bons gestes pour éviter de me faire mal au dos** (cf. fiche Portage et mobilité de l'enfant)
- ✓ L'étape d'endormissement de l'enfant peut être éprouvante émotionnellement. **Je conserve mon calme et j'essaie différentes techniques**. Si je sens que je vais perdre mon calme, je dépose l'enfant en sécurité dans sa chambre ou son lit, et je quitte la pièce quelques instants de façon à éviter tout geste ou toute parole maltraitante.
- ✓ Si mon moral est **affecté** par la situation, j'en parle à mon entourage personnel ou professionnel, mon médecin traitant ou à un psychologue de Pros-Consulte (0805 23 23 40 ou application mobile).
- ✓ Si je rencontre des difficultés récurrentes dans ma pratique professionnelle, **j'en parle à mon association pour trouver une solution**.