

RADIOLOGÍA CLÍNICA

6a. avenida 3-22, zona 10
Tels.: 2319-4600 / 2279-4949 Fax: 2279-4949

ID Paciente: 2601578
FIGUEROA GARCIA JUAN ALBERTO
Tipo de Paciente: Externo(Ambulatorio)
Edad: 64Y 2M **Sexo:** Masculino **Habitacion:**
Estudio: RM de rodilla
Fecha de Nacimiento: 03/06/1956
Referente: LUIS PEDRO CARRANZA SANCHEZ

Fecha de Relización de examen: 21/08/2020
Fecha de Aprobación: 21/08/2020 04:36:14 p. m.

Contiene información médica y su interpretación requiere conocimientos médicos.

4745 - RM de rodilla
21/08/2020 04:36:14 p. m.

RMN DE RODILLA DERECHA

Estudio realizado en múltiples planos y secuencia de la rodilla derecha

Estructuras óseas adecuadamente articuladas demuestran morfología, relación articular y médula ósea con señal de intensidad normal. No se identifican zonas de edema óseo.

Se aprecia irregularidad de cartilago sugestivo de pequeño defecto condral de grado 3 en reborde articular del cóndilo femoral medial de aproximadamente 5mm.

Los ligamentos cruzados y los colaterales preservan sus características normales.

Meniscos de configuración y señal de intensidad normal sin detectar defectos capsulares.

Estructuras del mecanismo extensor preservadas.

Grasa de Hoffa de morfología y señal de intensidad normal. Se aprecia ligera alteración de la intensidad señal en en el colección grasa suprapatelar sugiere edema a considerar cambios de pinzamiento del cuádriceps correlacionar clínicamente.

Discreto edema la grasa subcutánea por delante el trayecto del tendón patelar.

No hay derrame articular.

No se observan quistes en la región poplíteo.

Hiperintensidad intersticial en la inserción femoral del tendón poplíteo sugiere tendinosis.

Discretos cambios de señal del tendón del gastrocnemio medial hacia su inserción femoral con escasa cantidad líquido que podría corresponder a formación incipiente de quiste ganglión, correlación clínicamente.

Músculos e inserciones tendino-ligamentarias regionales de aspecto normal.

No se aprecia otro hallazgo significativo.

Conclusión:

Imagen ugestiva de pequeño defecto condral de grado 3 en reborde articular del cóndilo femoral medial

Tendinosis en la insercion femoral del popliteo.


Discretos cambios de señal del tendón del gastrocnemio medial hacia su inserción femoral con escasa cantidad Líquido que podría corresponder a formación incipiente de quiste ganglión.

Se aprecian discretos cambios de señal en el colchon grasa suprapatelar sugiere cambios por pinzamiento del cuádriceps, correlacionar clínicamente.

Resto del estudio como descrito, favor de leer cuerpo reporte.

ATENTAMENTE

Dr. Pablo Susarte Hernández M.
MÉDICO RADIOLOGO
C.O.L. No. 18,229



Dr. Pablo Susarte Hernandez Morales

(f.)

Médico Especialista