

femoral medial en la rodilla derecha para lograr un sangrado del hueso sub condral.

2. Se realiza una condroplastia de abrasión tri compartamental.
3. Se realiza una sinovectomia tri compartamental.
4. Se realiza un lavado exhaustivo de la articulación con más o menos 8 litros de solución salina.
5. Se coloca monocryl 3-0 en los portales de artroscopia steri-strips, gasitas, tegaderm, kerlix, venda elástica.

Procedimiento sin complicaciones.

Además se realiza un 2do procedimiento que es básicamente una artroscopia de la rodilla izquierda.

Los hallazgos de este procedimiento fueron los siguientes:

1. Se observa una lesión condral grado III a nivel de la rotula.
2. Se observa una ruptura del borde libre del menisco externo.
3. Se observa ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior normal.
4. Sinovitis en los tres compartimientos.

Por lo anterior se proceden a realizar los siguientes procedimientos.

1. Una trepanación y desbridamiento de lesión en la rotula.
2. Se realiza una reparación de menisco externo que estaba anteriormente descrita.
3. Se realiza una sinovectomia tri compartamental.
4. Se realiza un lavado exhaustivo de la articulación con más o menos 8 litros de solución salina.
5. Se coloca monocryl 3-0 en los portales steri-strips gasitas, tegaderm, kerlix y venda elástica.

Procedimiento sin complicaciones.

Dicto. Dr. Luis Pedro Carranza
Evelyn