

misma. Se realiza una sinovectomia del pivot central.

3. Ligamento cruzado posterior, cruzado posterior normales tanto en su trayecto como al momento de palparlos.
4. A nivel del compartimiento externo, cartílago femoral y, cartílago tibial normales. Se observa el menisco externo con una pequeña degeneración del borde libre del mismo.

Por lo anterior se proceden a realizar los siguientes procedimientos.

1. Se realiza una sinovectomia tri compartamental tanto del compartimiento patelo femoral como compartimiento interno y externo.
2. Se realiza una resección de una plica supero medial utilizando shaiver artroscopico mas radio frecuencia logrando una liberación adecuada de la plica sinovial.
3. Se realiza una reparación de menisco externo utilizando un sheiver para re avivar los bordes de la ruptura parcial en la superficie inferior del menisco.
4. Se realiza una sinovectomia de la grasa de Jofa del pivot central.
5. Se realiza una menisectomia parcial externa.
6. Se realiza un lavado exhaustivo con más o menos 8 litros de solución salina estéril para dejar una articulación completamente limpia.

Después de esto se coloca monocryl 3-0 en los dos portales de las heridas, se coloca steri-strips gasitas, tegader, kerlix y venda elástica. Procedimiento sin complicaciones.

Dicto. Dr. Luis Pedro Carranza  
Evelyn