

Por lo anterior se procede a realizar los siguientes procedimientos.

1. Reparación de menisco medial de la rodilla izquierda.
2. Una sinovectomia tri compartamental o mayor resecando plica sinovial.
3. Una condroplastia de abrasión en el cóndilo femoral medial.

Después de esto se procede a realizar el segundo procedimiento a nivel de la rodilla derecha realizándose un portal antero medial y un portal antero lateral realizando una artroscopia diagnostica y obteniendo los siguientes hallazgos.

1. Una lesión muy similar en términos de tener una plica superior y medial que iba hasta la parte lateral en la rodilla derecha.
2. Compartimiento patelo femoral normal en términos de cartílago.
3. Compartimiento interno se observaba una lesión degenerativa del menisco interno con un cartílago femoral, tibial normales de lado interno. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior normales a nivel del compartimiento externo menisco normal, fémur normal pero a nivel de platillo tibial había una condromalacia II-III.

Por lo anterior se procede a realizar los siguientes procedimientos.

1. Reparación de menisco interno.
2. Una condroplastia de abrasión del platillo tibial lateral.
3. Una resección de plica sinovial supero medial la cual fue satisfactoria.

Se coloca en ambas rodillas puntos subcuticulares de monocryl 3-0, steri-strips, gasitas, tegaderm, kerlix, venda elástica. Procedimiento sin complicaciones.

Dicto. Dr. Luis Pedro Carranza