

involucra cuerpo y cuerno posterior del mismo ya hay una condromalacia grado I-II tanto en el condilo femoral externo como en el platillo tibial externo.

Por lo anterior se realizan los siguientes procedimientos.

1. Se realiza una limpieza completa del surco inter condilio quitando los remanentes tanto en la inserción tibial como en la inserción femoral del ligamento cruzado anterior, se utiliza el aparato denominado Artrocare radio frecuencia para lograr hacer la limpieza correspondiente después de verificarse que efectivamente hay una ruptura del ligamento cruzado anterior y de ambos meniscos se procede hacer una reparación de ambos meniscos tanto menisco interno como menisco externo. Posteriormente a eso se procede hacer una herida en piel de mas o menos 4cms en el borde antero medial proximal de la pierna derecha obteniéndose los injertos del tendón recto interno y semi tendinoso, se doblan sobre si mismo y se coloca dos suturas de fiber wire loops tanto en el cabo proximal como distal se doblan sobre si mismos y ese el injerto que se utilizara. Posteriormente a eso se utiliza el aparato denominado Flip cutter para realizar un túnel femoral de 8 milímetros de diámetro después se realiza un túnel tibial de 9 milímetros de ancho utilizando broca del mismo tamaño. Posteriormente a eso se coloca el injerto se pasa a través del túnel tibial del túnel femoral y se coloca el botton de fijación femoral el cual se observa claramente bien agarrado el fémur. Posteriormente a eso después de subir bien el injerto se coloca un tornillo inter ferencial de 9 milímetros y una grapa de titaneo en la tibia. Se hace una limpieza exhaustiva de la articulación para aspirar el debri que haya quedado tanto oseo como de tejido blando utilizando mas o menos 2 litros de solución salina estéril. Posteriormente a eso se cierra los tres portales antero medial, antero lateral y trans rotuliano con monocryl 3-0 un portal supero lateral externo que fue necesario para colocar el Flip cutter también con monocryl 3-0 y la herida en piel se sutura primero con monocryl 3-0 y después con dermalon 3-0, se coloca coloca steri-strips en todas las heridas, gasita, tegaderm venda de kerlix y