

dos hilos, un hilo celeste y un hilo tigre que es blanco con línea negras, se coloca un pasador de suturas se hace verdaderamente lo que llamamos un capsular shift que es básicamente traer la capsula inferior hacia arriba para hacer una verdadera capsulorrafia y se colocan los dos hilos tanto el azul como el tigre colocándose de manera correcta el labrum de nuevo en su lugar después se procede a colocar una segunda ancla más o menos a las 4 de la tarde, se vuelve a colocar el pasador de suturas a través del labrum en dos ocasiones uno para pasar el hilo celeste y el otro para pasar el hilo tigre, se hacen los dos nudos satisfactoriamente después se coloca una tercera ancla donde ya se hace la tenodesis del bíceps parcial mas la reparación del labrum glenoideo mas los dos hilos de sutura y sus nudos, se cortan todos los hilos y se observa claramente que ya se logro hacer la reparación bankart y la tenodesis de la porción larga del bíceps después de observar que todo está perfectamente bien que ya no hay inestabilidad evidente trans operatoria, se decide terminar con el procedimiento de forma satisfactoria, se coloca monocryl 3-0 en los tres puntos de abordaje, se coloca steri-strips, gasitas, tegaderm y cabestrillo.

Procedimiento sin complicaciones.

Dicto. Dr. Luís Pedro Carranza
Evelyn