

Después se observa el patrón de la ruptura el cual involucra supra espinoso, infra espinos y repito a nivel sub acromial no se observa ruptura del tendón del bíceps por lo anterior se procede a colocar un ancla bio compuesta 0.5 milímetros con dos hilos cargada con dos hilos, un celeste, y un blanco respecto a los dos blancos se colocan en la parte posterior de la ruptura y los dos azules se colocan en parte anterior. Se anuda la parte posterior después se anuda la parte anterior y se observa una reparación satisfactoria de la reparación sin embargo al momento de jalar los cuatro hilos se observa que se mejora el área de anclaje por lo tanto se decide colocar un Swivelock que es básicamente un Peek agarrando los cuatro hilos y logrando una mejor reparación del tendón. Después de esto puntos de anclaje se observa básicamente que la reparación está completamente satisfactoria el bíceps se logra hacer una tenodesis biológica del mismo mas la claveculectomia parcial que se realizo previamente en el acromioplastia, después se realiza una limpieza exhaustiva de toda la parte intra articular con más o menos 6 litros de solución salina se coloca monocryl 3-0, en las heridas en piel steri strip gasitas, tegaderm se coloca cabestrillo.

Procedimiento sin complicaciones

Dicto: Dr. Luis Pedro Carranza
Carina