

mismo. A nivel del pivot central ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior son normales.

A nivel del compartimiento externo se observa cóndilo femoral lateral y el platillo tibial interno con una condromalacia grado I-II generalizada si observo una muy pequeña lesión de cartílago en el borde lateral del platillo tibial grado III después se observa que efectivamente hay una ausencia del cuerpo del menisco externo se observa incluso el poplíteo sin su yato ya no existe menisco a ese nivel si hay un remanente del cuerno posterior con una muy pequeña lesión.

Por lo anterior se procede a realizar los siguientes procedimientos.

Primero se realiza una reparación del menisco externo sobre todo en el remanente del cuerno posterior y en el remanente del cuerno anterior. Se utiliza radio frecuencia con Arthrocare en el menisco externo después se realiza una resección de la sinovial a nivel tri compartamental y se realiza unas pequeñas trepanaciones a nivel de la rotula.

Posteriormente a eso se rasura parte del cartílago tibial dejándolo completamente libre. Es de hacer notar que no existe una lesión severa a nivel de la rodilla ni una lesión de cartílago grande que coincida con la lesión grande que amerite un reemplazo articular. Después se coloca puntos de sutura en ambos puntos de abordaje steri-trips, gasitas, tegaderm, kerlix y venda elástica. Se infiltra la articulación con Metilprednisolona más Lidocaina.

Procedimiento sin complicaciones.

Dicto. Dr. Luís Pedro Carranza
Evelyn