

A nivel del menisco interno condromalacia grado I-II y menisco interno completamente normal. Por lo anterior se procede a realizar los siguientes procedimientos:

1. Se realiza una resección de plica sinovial supero medial mas una sinovectomia tri compartamental.

Se realiza una condroplastia de abrasión en la lesión patelo femoral y en la lesión del platillo tibial resecando fragmentos de cartílago.

2. Artroscopia rodilla derecha a nivel de artroscopia de la rodilla derecha si se observa claramente los siguientes hallazgos: 1. una condromalacia grado I-II a nivel patelo femoral y el plica sinovial y supero medial también grande extensa en articulación patelo femoral. 2. A nivel del compartimiento interno si se observa una lesión grande una condromalacia probablemente grado II de más o menos 4x2cms en el cóndilo femoral interno, menisco interno completamente normal. 3. Ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior normal. 4. A nivel de compartimiento externo se observa una lesión de menisco externo en el borde libre del cuerno anterior y se observa un flap cartilaginoso del mismo que se levanta en el platillo tibial externo.

Por lo anterior se realizan los siguientes procedimientos.

1. Se realiza una reparación de menisco externo, se realiza una condroplastia de abrasión del compartimiento interno y externo una sinovectomia tri compartamental quitando plica medial supero medial de la rodilla derecha. Se infiltran en ambas rodillas Lidocaina mas Betametasona, se colocan monocryl 3-0 en los portales, steri-strips, gasitas, tegaderm, kerlix y venda elástica. Procedimiento sin complicaciones.

Dicto. Dr. Luis Pedro Carranza
Evelyn