

degenerativa de menisco externo y una condromalacia grado III.

Por lo anterior se procede a realizar primero, se realiza una reconstrucción del ligamento cruzado anterior.

Segundo: se procede a realizar una reparación meniscal de menisco interno en su cuerpo y cuerno posterior y una condroplastia a ese nivel.

Tercero: se realiza también a nivel una condroplastia a nivel del compartimiento externo y una reparación de menisco externo.

Cuarto: para hacer la reparación se realiza un abordaje antero medial sobre la pierna en los cuales se extraen el tendón semi tendinoso, recto interno se dobla sobre si mismo se coloca fiber loops alrededor del mismo obteniéndose un injerto de 8 milímetros a nivel femoral y 8 milímetros a nivel tibial de diámetro. Por lo anterior se coloca una guía en el fémur realizándose un túnel de 8 milímetros utilizando aparato especializado y se realiza otro túnel igual en el fémur después se coloca el túnel con un button el cual se pasa a través de la tibia, fémur y se pone horizontal en el fémur.

Se logra reconstruir satisfactoriamente el ligamento, se toman fotos del mismo y se coloca un tornillo inter ferencial de 8 milímetros en la tibia y una grapa en la tibia.

Se limpio bien la articulación con bastante solución salina más o menos 6,000cc quedando completamente limpio. Después se coloca monocryl 3-0 a nivel del abordaje antero medial y la tibia a nivel de los portales a nivel de lado lateral de la pierna. Procedimiento sin complicaciones.

Dicto. Dr. Carranza

Evelyn