

6. Hay una condromalacia grado I-II a nivel del compartimiento externo.
7. Se observa una sinovitis tri compartamental del compartimiento patelo femoral, compartimiento interno y compartimiento externo.

Por lo anterior se realizan los siguientes procedimientos:

1. Se realiza una reparación de ambos meniscos tanto del menisco externo como del menisco interno y hubo necesidad de hacer una resección prácticamente de una buena parte del menisco externo en su cuerno posterior.
2. Se realiza una reparación también de menisco externo utilizando radio frecuencia con Arthocare.
3. Se realiza una sinovectomia extensa tanto del compartimiento patelo femoral como del compartimiento interno y externo de la rodilla.
4. Se realiza una condroplastia de abrasión tanto en el compartimiento interno como externo y se realiza una resección de sinovial que estaba muy inflamada.
5. Se realiza lavado exhaustivo de la articulación pues había debris de cartílago y todo la rodilla lo cual se reseco.

Después de observar que todo se observa bien utilizamos un nuevo Softwar que le llama Bio óptico lo utilizamos en dos funciones en la fusión para ver donde había desgaste de cartílago que coincidía precisamente con el desgaste de cartílago ya mencionado anteriormente en el cóndilo femoral medial y la función 2 bio óptico para ver el desorden de las fibras de colágeno que también se pudo observar y corroborar hacer la corroboración de esta imagen con la apreciación clínica. Después de hacer el lavado exhaustivo de la articulación se decide dar por terminado el procedimiento. Se coloca monocryl 3-0 en ambos portales, se coloca steri-strips, gasita, tegaderm, kerlix y venda elástica.

Procedimiento sin complicaciones.

Dicto. Dr. Luis Pedro Carranza