

Wspólna praca domowa z Analizy 2

Gracjan Barski, album: 448189

23 March, 2024

Rozwiązanie:

Warunek z zadania przekształcamy do postaci:

$$\exists_{c \in \mathbb{R}} \forall_{x, y \in D} \frac{|f(x) - f(y)|}{\|x - y\|} \leq c$$

Przy założeniu $x \neq y$. Jeśli $x = y$ to mamy $0 \leq 0$ i jest OK.

Trzeba pokazać, że zbiór

$$X = \left\{ \frac{|f(x) - f(y)|}{\|x - y\|} : x, y \in D \wedge x \neq y \right\}$$

jest ograniczony z góry. Wnioskujemy, że jeśli wszystkie pochodne cząstkowe istnieją we wszystkich punktach D i są ograniczone, to f jest ciągła. Ponadto, D jest zbiorem zwartym, więc f jest również ograniczona. Więc dla każdego $x, y \in D$, $|f(x) - f(y)|$ jest wartością skończoną, tak samo jak $\|x - y\|$.

Teraz wystarczy rozważyć co się dzieje, jeśli (WLOG) $y \rightarrow x$.

Rozważmy wektor $v = y - x$. Wtedy badane wyrażenie można zapisać:

$$\frac{|f(x + v) - f(x)|}{\|v\|}$$

Interesuje nas granica

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x + hv) - f(x)|}{h\|v\|}$$

Czyli $\partial_{\vec{v}} f(x)$. Wiemy, że jeśli funkcja posiada w danym punkcie pochodne cząstkowe, to jej pochodna kierunkowa wyraża się wzorem:

$$\nabla f(x) \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Gdzie \cdot oznacza standardowy iloczyn skalarny. Jako że każda z pochodnych cząstkowych w $\nabla f(x)$ istnieje, to powyższy iloczyn skalarny ma skończoną wartość. Więc pochodne kierunkowe dla każdego $x \in D$ w dowolnym kierunku istnieją i są skończonymi wartościami. Więc istotnie X jest ograniczony, co dowodzi tezy. \square