Parcial 1 · para la casa

Raíces B · ¿Cuándo cruzará el CO_2 las 450 ppm?

Punto fijo y secante con datos de NOAA (Mauna Loa)

Entrega y sustentación: jueves 22 de octubre de 2026 · Prof. Carlos Orrego

Nombre: _____ **Documento:** _____

Parte	I	II	III	IV	**Total**
Puntos	12	14	12	12	**50**
Obtenidos					

Desde 1958, en el volcán Mauna Loa (Hawái) se mide el CO_2 del aire todos los días: es la famosa *curva de Keeling*. Hoy va por unas 427 ppm y sube cerca de 3 ppm por año, pero no sube derecho: cada año "respira" (baja en el verano del norte, cuando las plantas absorben CO_2, y sube en invierno). Vas a usar esos datos reales (NOAA GML y Scripps) para resolver una ecuación muy concreta: **¿en qué fecha llega a 450 ppm?** La respiración anual hace que la curva cruce 450 **varias veces**, y por eso escoger el método y el punto inicial importa.

Importante: la fecha que vas a calcular es la del **modelo** que ajustamos (una parábola más una onda anual). **No es una predicción climática oficial.**

El modelo (te lo da el cuaderno con `numpy.linalg.lstsq`, que escoge los 5 números para que la curva quede lo más cerca posible de los datos; no necesitas saber cómo lo hace):

$$c(t) = a_0 + a_1(t-2000) + a_2(t-2000)^2 + A\,\sin(2\pi t) + B\,\cos(2\pi t)$$

$$c'(t) = a_1 + 2a_2(t-2000) + 2\pi A\cos(2\pi t) - 2\pi B\sin(2\pi t)$$

Con datos de enero de 1990 a agosto de 2026: $a_0 \approx 369{,}037$, $a_1 \approx 1{,}8067$, $a_2 \approx 0{,}018377$, $A \approx 2{,}8128$, $B \approx -0{,}8951$ (error típico del ajuste: 0,81 ppm). t es el año decimal: $t = 2033{,}5$ es más o menos el 1 de julio de 2033.

Los dos métodos, para $f(t) = c(t) - 450$:

$$\text{Punto fijo con relajación } (K>0): \qquad t_{n+1} = g(t_n) = t_n - \frac{c(t_n)-450}{K}$$

$$\text{Secante:} \qquad t_{k+1} = t_k - f(t_k)\,\frac{t_k - t_{k-1}}{f(t_k) - f(t_{k-1})}$$

Reglas del parcial

Se entrega el **jueves 22 de octubre al empezar la clase**, escrito a mano en esta misma guía, y se sustenta ese mismo día.

- **Individual.** Puedes discutir ideas con compañeros, pero lo que entregas lo escribes tú, con tus palabras.
- **El cuaderno de Colab** de este parcial es `parcial_raices_co2.ipynb`. Ábrelo desde el repositorio del curso, **github.com/cmorregof/methods_exam**, carpeta `raices-B-co2`, con el botón «Open in Colab», y corre las celdas en orden. Antes de cada celda, escribe tu predicción en esta guía: la predicción escrita después de correr no cuenta.
- **Puedes usar IA, y te audito.** Si la usas, llena la bitácora del final: qué le preguntaste, qué te respondió y qué corregiste o comprobaste tú. Usar IA no baja la nota. Lo que la baja es entregar algo que no sabes explicar.
- **Sustentación (jueves, 10 minutos).** Se sortea un punto de tu parcial y lo explicas en el tablero, sin la guía en la mano, con una variante (otro dato, otro valor inicial, otro nodo). La nota escrita se multiplica por un factor: 1 si lo explicas y lo reproduces; 0,6 si lo explicas a medias; 0,2 si no puedes explicar lo que entregaste.
- **Puntaje.** Parte I: 12 puntos. Parte II: 14. Parte III: 12. Parte IV: 12. Total: 50. La nota es puntos ÷ 10.
- **Qué cuenta.** Una respuesta correcta sin justificación vale poco. Una justificación clara con un error de cuenta vale mucho. Si algo te parece mal planteado, dilo y explica por qué: eso también se califica.

Parte I · Completar una demostración (12 puntos)

Teorema (punto fijo). Sea g continua en [a, b], derivable en (a, b), con:

- (H1) g(t) ∈ [a, b] para todo t ∈ [a, b], y
- (H2) existe k con $0 < k < 1$ tal que $|g'(t)| \le k$ para todo t ∈ (a, b).

Entonces g tiene **un único** punto fijo p en [a, b] y, para cualquier $p_0 \in [a, b]$, la sucesión $p_n = g(p_{n-1})$ converge a p, con

$$|p_n - p| \le k^n \max\{\, p_0 - a,\; b - p_0 \,\}.$$

I.1 · Existencia (3 puntos)

Sea h(t) = g(t) − t, que es continua en [a, b].

- Por (H1), g(a) ≥ a, así que h(a) = g(a) − a ____ 0.
- Por (H1), g(b) ≤ b, así que h(b) ____ 0.
- Por el teorema de _____, existe p ∈ [a, b] con h(p) = ____, es decir, g(p) = ____.

I.2 · Unicidad (2 puntos)

Supón que p y q son dos puntos fijos distintos en [a, b]. Por el teorema de _____ existe ξ entre p y q tal que

$$|p - q| = |g(p) - g(q)| = |g'(\xi)|\,|p - q| \le ____\; |p - q| < |p - q|$$

lo cual es una _____. Por tanto p = q.

¿Dónde se usó? ¿En qué paso de la unicidad se usó que $k < 1$ y no solo que $k \le 1$? (una línea)

I.3 · Convergencia y cota (3 puntos)

Para $n \ge 1$, otra vez por el teorema del valor medio, existe ξ_n entre p_{n-1} y p con

$$|p_n - p| = |g(p_{n-1}) - g(p)| = |g'(\xi_n)|\,|p_{n-1} - p| \le k\,|_____|.$$

Aplicando esto n veces: $|p_n - p| \le k\hat{}(__) \, |p_0 - p|$. Como p_0 y p están ambos en [a, b], $|p_0 - p| \le$ máx{ _____ , _____ }. Y como $0 < k < 1$, $k^n \to$ ____, así que $p_n \to p$.

¿Dónde se usó (H1)? Para usar (H2) en ξ_n hace falta que todos los p_n estén en [a, b]. ¿Qué hipótesis lo garantiza? (una línea)

I.4 · El teorema aplicado a nuestro CO_2 (2 puntos)

Con $g(t) = t - (c(t) - 450)/K$ se tiene $g'(t) = 1 - c'(t)/K$.

(a) En el primer cruce $t^* \approx 2033{,}105$, el cuaderno da $c'(t) \approx$ *20,45 ppm/año. La versión local del teorema dice que basta* $|g'(t)| < 1$. Completa: $|1 - 20{,}45/K| < 1 \iff 0 < 20{,}45/K <$ ____ $\iff$ $K >$ ____.

(b) La celda 12 dice que con K = 20, en [a, b] = [2033,0; 2033,2], g toma valores en [2033,1046; 2033,1163] y máx $|g'| \approx 0{,}308$. ¿Se cumplen (H1) y (H2)? Con $p_0 = 2033{,}0$, usa la cota del teorema para hallar un n que garantice un error menor que **un día** ($1/365 \approx 0{,}00274$ años).

I.5 · Puente con interpolación: la secante es un Lagrange de grado 1 (2 puntos)

Sea P el polinomio de Lagrange de grado ≤ 1 que interpola a f en t_{k-1} y t_k:

$$P(t) = f(t_{k-1})\,\frac{t - t_k}{t_{k-1} - t_k} \;+\; f(t_k)\,\frac{t - ____}{t_k - t_{k-1}}.$$

(a) Verifica que $P(t_k) =$ ____ y $P(t_{k-1}) =$ ____.

(b) Iguala $P(t) = 0$ y despeja t. Muestra que obtienes exactamente la fórmula de la secante t_{k+1} de arriba. (Tres o cuatro líneas de álgebra.)

Parte II · Predecir → correr → explicar con datos reales (14 puntos)

Cuaderno: `parcial_raices_co2.ipynb`. **Fuente:** NOAA Global Monitoring Laboratory, Mauna Loa, promedios mensuales, https://gml.noaa.gov/webdata/ccgg/trends/co2/co2_mm_mlo.csv (consulta: 15 oct 2026). El cuaderno trae un respaldo congelado y corta los datos en **agosto de 2026** para que todos tengamos los mismos números. NOAA marca el último año como preliminar: si tu pantalla difiere en el último decimal, usa tus números. El cuaderno imprime con punto decimal.

Corre las celdas **en orden** (la 4 y la 5 son tus funciones y van antes de la 6). En cada ítem: **(a) PREDICE** en esta guía **antes** de correr, **(b) corre** la celda indicada, **(c) explica** la diferencia. La predicción se califica por el razonamiento, no por acertar.

II.1 · ¿En qué año cruza 450 ppm? · Celda 3 (2,5 puntos)

(a) **Predice.** En agosto de 2026 la tendencia (solo la parábola) vale 430,17 ppm y sube 2,79 ppm/año. Si siguiera en línea recta, ¿en qué año llegaría a 450? ¿El modelo completo (con la onda) cruzará antes o después? ¿Cuántas veces cruzará 450 durante 2033?

(b) Corre la celda 3 y anota: el cruce de la recta, el de la parábola sola y los cruces del modelo completo, cada uno con su $c'(t^*)$.

(c) **Explica.** ¿Por qué la parábola cruza antes que la recta? ¿Por qué el modelo completo cruza antes que la parábola? (Pista: en $t^* \approx 2033{,}105$, ¿la onda suma o resta?) ¿Por qué c' cambia de signo de un cruce al siguiente?

II.2 · ¿Converge el punto fijo? · Celda 6 (2,5 puntos)

(a) **Predice.** Con $c'(t) \approx$ *20,45, calcula* $|g'(t)| = |1 - 20{,}45/K|$ para K = 10, 20 y 40. ¿Cuáles convergen? ¿Cuál será el más rápido?

(b) Corre la celda 6. Anota las iteraciones de cada K y los últimos iterados con K = 10.

(c) **Explica.** Con K = 10, ¿qué hacen los iterados (diverge, oscila, se queda quieto)? ¿Cómo encaja con tu respuesta del ítem I.4(a)?

II.3 · Tabla de errores: punto fijo vs. secante · Celda 7 (3 puntos)

(a) **Predice.** Con K = 40, ¿por qué número se multiplica el error en cada paso? ¿Y con K = 20? Con la secante, ¿qué orden esperas leer en la columna "orden estimado"?

(b) Corre la celda 7 y copia: las razones e_{n+1}/e_n (K = 40 y K = 20) y los órdenes estimados de la secante, con su promedio.

(c) **Explica.**

1. Con K = 40, las primeras razones (0,469; 0,471; …) son menores que 0,489 y van subiendo hacia ese valor. ¿Por qué? (Piensa en $g'(\xi_n)$ con $\xi_n \to t^*$.)
2. ¿Por qué los órdenes de la secante saltan (2,48; 1,82; 1,26; 1,83) en lugar de dar exactamente 1,618?
3. Los errores se detienen alrededor de 10^{-12} y no bajan más. ¿Por qué? (Pista: ¿cuántas cifras significativas tiene un double, y cuántas usa ya el número 2033?)

II.4 · ¿Qué cruce encuentra cada método? · Celda 8 (3 puntos)

Los tres cruces de 2033 caen en febrero, julio y diciembre.

(a) **Predice.**

1. Punto fijo con K = 20 arrancando en $t_0 = 2033{,}7$ (entre julio y diciembre): ¿a qué cruce va?
2. ¿Existe algún K > 0 con el que el punto fijo converja al cruce de **julio**? (Mira el signo de c' en julio y calcula $g' = 1 - c'/K$.)
3. ¿Puede la secante encontrar el cruce de julio?

(b) Corre la celda 8. Anota a qué cruce llega cada arranque y g' en los tres cruces.

(c) **Explica.** ¿Por qué el cruce de julio **repele** al punto fijo para cualquier K > 0 y la secante sí lo encuentra desde (2026,625; 2040)? Desde el mismo $t_0 = 2026{,}625$, cambiar t_1 de 2028 a 2029 manda la secante de febrero a diciembre. Mira el primer iterado nuevo en cada caso y explica por qué.

II.5 · Precisión de "un día" · Celda 9 (1,5 puntos)

(a) **Predice.** Arrancando en $t_0 = 2033{,}0$ (error inicial 0,1047), usa $e_n \approx 0{,}1047 \cdot 0{,}489^n$ para estimar cuántas iteraciones necesita el punto fijo con K = 40 para que el error sea menor que 1/365. ¿Y la secante?

(b) Corre la celda 9.

(c) **Explica.** Si tu estimación y el resultado no coinciden, ¿por qué? (Mira otra vez las razones de II.3.) En una frase: ¿qué ganas al escoger bien K?

II.6 · ¿Cuánto depende el cruce de los datos usados? · Celda 10 (1,5 puntos)

(a) **Predice.** Si el modelo se ajusta con datos desde 1960 en vez de desde 1990, ¿el primer cruce se mueve días, meses o años?

(b) Corre la celda 10 y anota los cinco cruces.

(c) **Explica** por qué la ventana desde 1960 cambia tanto el resultado. (Pista: ¿la aceleración del CO_2 ha sido constante desde 1960?)

Reflexión (una línea, obligatoria): el número que calculaste es la raíz de $c(t) = 450$ para un modelo que escogimos nosotros. ¿Qué le falta a ese número para ser una predicción climática?

Parte III · El agente (12 puntos)

> ⚠ **Escenario inventado para el parcial.** Los agentes no existen, pero **todos los números de abajo se calcularon de verdad** con nuestro c(t). Puedes comprobarlos con la celda 11.

Agente A (como el de los laboratorios 3 y 4). Escoge K en la rejilla {1,00; 1,05; …; 100,00}. Arranca siempre en $t_0 = 2033{,}0$ y para cuando $|t_{n+1} - t_n| < 10^{-8}$ (con un tope de 500 iteraciones). **Recompensa = −(número de iteraciones).** Tras explorar toda la rejilla reporta:

K	$g'(t) = 1 - c'(t)/K$	Iteraciones	Resultado
6,82 (= $c'(t^*)/3$)	−2,000	500 (tope)	no converge
10,00	−1,045	500 (tope)	oscila: 2033,054 ↔ 2033,161
10,30	−0,985	500 (tope)	marcado como “no converge”
15,00	−0,363	18	2033,104729
20,00	−0,022	6	2033,104729
20,45 (≈ $c'(t^*)$)	**0,000**	**4**	2033,104729
25,00	0,182	11	2033,104729
40,00	0,489	23	2033,104729
100,00	0,796	65	2033,104729

El agente también escribe las afirmaciones A1 a A6:

- **A1.** “Mi mejor K (20,35 y 20,45 empatan con 4 iteraciones) es prácticamente $c'(t) = 20{,}45$. *Ahí* $g'(t) = 0$.”
- **A2.** “Con K = $c'(t^*)$, los errores fueron 0,1047; 0,00402; $1{,}62 \cdot 10^{-5}$; $2{,}6 \cdot 10^{-10}$. El cociente $e_{n+1}/e_n{}^2$ se estabiliza cerca de 0,98, así que la convergencia es cuadrática.”
- **A3.** “Con K = $c'(t^*)/3 \approx 6{,}82$ también converge al mismo cruce, solo que más despacio.”
- **A4.** “K = 10,30 diverge: lo marqué con 500 iteraciones.”
- **A5.** “Entre más grande K, más seguro y más rápido. K = 100 es la apuesta ideal.”
- **A6.** “Con K = 20 los errores $t_n - t^*$ alternan de signo (+, −, +, −, …). Con K = 40 tienen todos el mismo signo.”

III.1 · ¿Verdadera o falsa? (6 puntos)

Para cada afirmación A1 a A6, di si es **verdadera o falsa** y justifícala en una o dos líneas **con la teoría** ($g'(t^*)$, el teorema de la Parte I, Taylor). Puedes usar la celda 11 para comprobar. 1 punto cada una.

III.2 · Inferencia: ¿por qué el agente aprendió eso? (2 puntos)

(a) Explica con Taylor por qué $K = c'(t)$ *es especial: escribe* $t_{n+1} - t = g(t_n) - g(t) \approx g'(t)(t_n - t) + \tfrac{1}{2} g''(\xi)(t_n - t)^2$ y di qué término desaparece.

(b) Se volvió a entrenar al agente, ahora arrancando en el último dato, $t_0 = 2026{,}625$ (6,5 años antes del cruce). Su mejor K pasó a ser **18,65 (25 iteraciones)**, mientras que K = 20,45 necesita **26**. Alguien concluye: “entonces la teoría se equivoca”. ¿Por qué **no** se equivoca? (Pista: entre 2026 y 2033, $c'(t)$ no vale 20,45. Por la onda, oscila entre unos −16 y +22 ppm/año. ¿De qué habla $g'(t^*)$: del viaje o de la llegada?)

III.3 · Reward hacking (3 puntos)

Agente B. Escoge **K y el punto inicial t_0**: $K \in \{10; 10{,}5; \ldots; 40\}$ y t_0 entero entre 1850 y 2040. Ahora para cuando el **residuo** es pequeño, $|c(t_n) - 450| < 0{,}01$ ppm. **Recompensa = −(número de iteraciones).** Reporta, orgulloso:

> "¡Récord! Con K = 15 y $t_0 = 1868$ encuentro el cruce en **1 iteración**: t = 1868,0102, c(t) = 449,998 ppm. **El CO_2 ya había cruzado las 450 ppm en 1868.**"

Al obligarlo a usar t_0 entre 1990 y 2040, reporta: "Con K = 20 y $t_0 = 2034$, 1 iteración: t = 2033,959. **El CO_2 cruzará las 450 ppm por primera vez en diciembre de 2033**."

(a) (1 punto) Verifica a mano que $c(1868) \approx 449{,}85$. Calcula la parábola en t = 1868 con a_0, a_1, a_2 (te debe dar $\approx 450{,}75$) y usa que en un año entero $\text{sen}(2\pi t) = 0$ y $\cos(2\pi t) = 1$, así que la onda aporta $B \approx -0{,}895$. ¿Por qué la parábola "vuelve a subir" hacia atrás? (Su vértice está en $t \approx 1950{,}8$.) ¿Es real ese cruce? Los núcleos de hielo de Law Dome (Antártida) dan unas 285 a 288 ppm para los años 1860.

(b) (1 punto) La segunda afirmación también es falsa. ¿Por qué? ¿Qué parte de la recompensa permite que el agente "gane" con el cruce equivocado?

(c) (1 punto) Propón **una** modificación concreta a la recompensa o a las reglas que impida ambas trampas.

III.4 · Verificación (1 punto)

¿Basta un residuo pequeño, $|c(t_n) - 450| < 0{,}01$, para decir que encontraste **el** cruce que buscabas? Da dos condiciones que tú exigirías antes de aceptar el resultado de cualquier agente (o de cualquier IA).

Parte IV · Consulta: nuestra idea de paper aplicada a tu tema (12 puntos)

Nuestra idea de paper: agentes de aprendizaje por refuerzo que aprenden las mismas decisiones que toma un estudiante de métodos numéricos (aquí: qué K usar, desde dónde arrancar, cuándo parar, qué método escoger), con demostraciones escritas como grafo que el agente reutiliza frente a problemas nuevos.

Haz una búsqueda profunda (NotebookLM Deep Research u otra herramienta, que registras en tu bitácora) sobre tres frentes:

1. **Proyecciones de CO_2:** la curva de Keeling, cómo proyectan NOAA, Scripps y el IPCC (escenarios SSP), y por qué no ajustan una parábola.
2. **Métodos de raíces y de punto fijo modernos y robustos:** el método de Brent (bisección + secante + interpolación cuadrática inversa) y la aceleración de Anderson para iteraciones de punto fijo.
3. **ML/RL para escoger parámetros de métodos iterativos:** por ejemplo, aprender el parámetro de relajación de un método iterativo a partir del número de iteraciones.

IV.1 · Síntesis de una página (4 puntos)

Escrita **por ti, sin IA**, a mano o digitada. Debe responder: ¿qué se sabe hoy en cada frente? ¿Dónde se toca con lo que hiciste en este parcial (K como parámetro de relajación, el cruce que cambia según el arranque, la recompensa mal diseñada)?

IV.2 · Tabla de 4 fuentes auditadas (4 puntos)

Al menos una por frente. Puedes partir de estas semillas, pero **al menos dos** deben salir de tu propia búsqueda:

- C. D. Keeling (1960), *Tellus*, sobre la concentración de CO_2 atmosférico.
- R. P. Brent (1973), *Algorithms for Minimization without Derivatives*.
- H. F. Walker y P. Ni (2011), "Anderson acceleration for fixed-point iterations", *SIAM J. Numer. Anal.*
- M. Khodak, E. Chow, M.-F. Balcan y A. Talwalkar (2023), "Learning to Relax: Setting Solver Parameters Across a Sequence of Linear System Instances", arXiv:2310.02246.

#	Referencia (autores, año, título)	¿Existe? ¿Cómo lo comprobaste?	Tipo (artículo, libro, reporte, preprint)	¿Dice lo que la herramienta le atribuye? (sí/parcial/no y por qué)	Conexión con el curso
1					
2					
3					
4					

IV.3 · Preguntas guía (2 puntos)

Responde **dos** de estas tres, en 3 a 5 líneas cada una:

1. La aceleración de Anderson con memoria 1, en una dimensión, aplicada a $g(t) = t - (c(t) - 450)/K$, da **exactamente** los mismos iterados que la secante sobre $c(t) - 450$, sin importar K. Compruébalo con un cálculo corto y explica qué significa: ¿para qué "aprender K" si Anderson lo vuelve irrelevante?
2. El método de Brent nunca pierde el intervalo [a, b] con cambio de signo. ¿Habría evitado el problema de II.4 (llegar al cruce que no querías)? ¿Y la trampa del agente B?
3. Khodak et al. aprenden un parámetro de relajación usando como señal **solo el número de iteraciones**, igual que nuestro agente A. ¿Qué tendría que cambiar en nuestro problema (por ejemplo, actualizar el modelo cada mes con un dato nuevo de NOAA) para que aprender K valga la pena?

IV.4 · Cierre (2 puntos)

¿Qué tendría que ser verdad para que nuestra idea fuera nueva en tu tema? Responde en 4 a 6 líneas, citando al menos una de tus fuentes auditadas.

Bitácora de IA

Una fila por cada uso. Si no usaste IA, escribe «No usé IA» y firma.

Punto	Qué le pedí	Qué me respondió, en una línea	Qué comprobé o corregí yo, y cómo

Firma: _____

Sustentación (la llena el profesor el jueves)

Punto sorteado: _____

- ☐ Explica el punto con sus palabras, sin leer la guía
- ☐ Reproduce en el tablero la cuenta o el paso clave
- ☐ Responde una variante: otro dato, otro valor inicial, otro nodo
- ☐ Lo que dice coincide con lo que entregó y con su bitácora

Factor: 1 ☐ 0,6 ☐ 0,2 ☐ **Nota escrita:** ____ / 50 **Nota final:** ____