Parcial 1 · para la casa

Los dos Hermite

Polinomios osculantes, cuadratura de Gauss–Hermite y la molécula de HCl

Entrega y sustentación: martes 20 de octubre de 2026 · Prof. Carlos Orrego

Nombre: _____ **Documento:** _____

Parte	I	II	III	IV	**Total**
Puntos	12	14	12	12	**50**
Obtenidos					

En física, "Hermite" casi siempre quiere decir los polinomios H_n del oscilador armónico ($H_0 = 1$, $H_1 = 2x$, $H_2 = 4x^2 - 2$, …). En este curso, "Hermite" es el polinomio osculante, el que copia valores y derivadas. Tienen el mismo apellido pero son objetos distintos, y en este parcial vas a ver que se necesitan el uno al otro: **la regla de cuadratura de Gauss–Hermite, que usan químicos y físicos para calcular valores esperados en el oscilador, se demuestra con el osculante**. Después la vas a usar en una molécula real, el cloruro de hidrógeno (HCl), cuyas constantes vibracionales medidas vienen de la tabla de NIST.

Reglas del parcial

Se entrega el **martes 20 de octubre al empezar la clase**, escrito a mano en esta misma guía, y se sustenta ese mismo día.

- **Individual.** Puedes discutir ideas con compañeros, pero lo que entregas lo escribes tú, con tus palabras.
- **El cuaderno de Colab** de este parcial es `parcial_hermite_oscilador.ipynb`. Ábrelo desde el repositorio del curso, **github.com/cmorregof/methods_exam**, carpeta `hermite-hcl`, con el botón «Open in Colab», y corre las celdas en orden. Antes de cada celda, escribe tu predicción en esta guía: la predicción escrita después de correr no cuenta.
- **Puedes usar IA, y te audito.** Si la usas, llena la bitácora del final: qué le preguntaste, qué te respondió y qué corregiste o comprobaste tú. Usar IA no baja la nota. Lo que la baja es entregar algo que no sabes explicar.
- **Sustentación (martes, 10 minutos).** Se sortea un punto de tu parcial y lo explicas en el tablero, sin la guía en la mano, con una variante (otro dato, otro valor inicial, otro nodo). La nota escrita se multiplica por un factor: 1 si lo explicas y lo reproduces; 0,6 si lo explicas a medias; 0,2 si no puedes explicar lo que entregaste.
- **Puntaje.** Parte I: 12 puntos. Parte II: 14. Parte III: 12. Parte IV: 12. Total: 50. La nota es puntos ÷ 10.
- **Qué cuenta.** Una respuesta correcta sin justificación vale poco. Una justificación clara con un error de cuenta vale mucho. Si algo te parece mal planteado, dilo y explica por qué: eso también se califica.

Parte I · Completar una demostración (12 puntos)

Hechos que puedes usar sin demostrar.

- (H1) H_n tiene n raíces reales y distintas $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, y su coeficiente principal es 2^n.
- (H2) Ortogonalidad: si p es un polinomio de grado **menor que n**, entonces $\int e^{-x^2} H_n(x)\, p(x)\, dx = 0$ (las integrales van de $-\infty$ a ∞).
- (H3) Osculante (forma de Burden, vista en clase). Sean L_j los polinomios de Lagrange en los nodos $x_1, \dots, x_n$. El único polinomio de grado $\le 2n-1$ con $H(x_j) = f(x_j)$ y $H'(x_j) = f'(x_j)$ es

$$H(x) = \sum_{j=1}^{n} f(x_j)\, \underbrace{[1 - 2(x - x_j)L_j'(x_j)]L_j(x)^2}_{H_j(x)} + \sum_{j=1}^{n} f'(x_j)\, \underbrace{(x - x_j)L_j(x)^2}_{\hat{H}_j(x)}$$

$$f(x) - H(x) = \frac{f^{(2n)}(\xi(x))}{(2n)!} \prod_{k=1}^{n} (x - x_k)^2.$$

- (H4) Valor medio para integrales: si $u(x) \ge 0$ y φ es continua, entonces $\int \varphi(x)\, u(x)\, dx = \varphi(\eta) \int u(x)\, dx$ para algún η.

Teorema (Gauss–Hermite). Sean $x_1, \dots, x_n$ las raíces de H_n. Para todo polinomio f de grado $\le 2n-1$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x)\, dx = \sum_{j=1}^{n} w_j\, f(x_j)$$

$$w_j = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} L_j(x)^2\, dx > 0.$$

Y si f tiene 2n derivadas continuas, el error es

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x)\, dx - \sum_{j=1}^{n} w_j f(x_j) = \frac{f^{(2n)}(\eta)}{(2n)!} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \prod_{k=1}^{n} (x - x_k)^2\, dx.$$

I.1 · Llena los espacios (7 puntos)

Paso 1. Multiplica el osculante por e^{-x^2} e integra. Queda

$$\int e^{-x^2} H(x)\, dx = \sum_j f(x_j)\, A_j + \sum_j f'(x_j)\, B_j, \qquad A_j = \int e^{-x^2} H_j(x)\, dx, \quad B_j = \int e^{-x^2} (x - x_j) L_j(x)^2\, dx.$$

Paso 2 (la clave). Fija j. El polinomio $q(x) = (x - x_j)\, L_j(x)$ tiene grado _____ y se anula en _____. H_n tiene ese mismo grado y esas mismas raíces, así que $q(x) = c \cdot H_n(x)$ para alguna constante c. Para hallar c, deriva y evalúa en x_j:

$q'(x_j) = L_j(x_j) + (x_j - x_j)\, L_j'(x_j) =$ _____, y por tanto $c =$ _____.

Paso 3. Entonces

$$B_j = \int e^{-x^2} \left[(x - x_j)L_j(x)\right] L_j(x)\, dx = c \int e^{-x^2} H_n(x)\, _____\, dx = _____$$

por el hecho (H___), porque el grado de L_j es _____, que es menor que n.

Paso 4. Como $H_j = L_j^2 - 2L_j'(x_j)(x - x_j)L_j^2$, se tiene $A_j = \int e^{-x^2} L_j^2\, dx - 2L_j'(x_j) \cdot$ _____ $= w_j$. Además $w_j > 0$ porque _____.

Paso 5 (exactitud). Si f es un polinomio de grado $\leq 2n-1$, entonces H = f por _____ (cita H3). Por tanto $\int e^{-x^2} f\,dx = \int e^{-x^2} H\,dx = \Sigma\, w_j\, f(x_j)$. **Las derivadas $f'(x_j)$ desaparecieron: la regla solo necesita valores.**

Paso 6 (error). Restando, $\int e^{-x^2}(f - H)\,dx = \int [f^{(2n)}(\xi(x))/(2n)!] \cdot e^{-x^2} \prod(x - x_k)^2\,dx$. Como la función _____ es ≥ 0, el hecho (H___) da el error del teorema.

Remate. Por (H1), $\prod(x - x_k) = H_n(x)$ / _____. Usando el dato $\int e^{-x^2} H_n(x)^2\,dx = 2^n\, n!\,\sqrt{\pi}$, el error queda

$$\text{error} = \frac{f^{(2n)}(\eta)}{(2n)!} \cdot \frac{n!\,\sqrt{\pi}}{_____}.$$

I.2 · Pruébalo a mano con n = 2 (3 puntos)

En el estado base del oscilador ($\hbar = m = \omega = 1$), la densidad de probabilidad es $|\psi_0(x)|^2 = e^{-x^2}/\sqrt{\pi}$, así que $\langle f\rangle = (1/\sqrt{\pi}) \int e^{-x^2} f(x)\,dx$. Datos: $\int e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$, $\int x^2 e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}/2$, y el valor exacto es $\langle x^4\rangle = 3/4$.

a) Con $H_2 = 4x^2 - 2$, halla los nodos x_1, x_2 y calcula $w_1 = \int e^{-x^2} L_1(x)^2\,dx$. Escribe L_1 explícitamente. (Por simetría, $w_2 = w_1$.)

b) Calcula la aproximación de $\langle x^4\rangle$ con la regla de 2 nodos.

c) Calcula el error con la fórmula del teorema (aquí $f^{(4)}$ es constante, así que no necesitas η). ¿Aproximación + error = 3/4?

I.3 · ¿Dónde se usó...? (2 puntos)

a) ¿En qué paso se usó que los nodos son **las raíces de H_n** y no unos nodos cualesquiera? Si tomas los nodos −1, 0, 1, ¿qué pasa con los B_j? (Vas a ver la respuesta numérica en la Parte III, acción C.)

b) ¿En qué paso hace falta que $e^{-x^2} \prod(x - x_k)^2$ no cambie de signo? ¿Qué se perdería si cambiara?

Parte II · Predecir → correr → explicar con datos reales (14 puntos)

Los datos. NIST Chemistry WebBook, página *Hydrogen chloride*, tabla *Constants of diatomic molecules* (compilación de Huber y Herzberg, 1979), estado fundamental X $^1\Sigma^+$ de $H^{35}Cl$: ωe = 2990,9463 cm^{-1}, $\omega e \cdot xe$ = 52,8186 cm^{-1}, $\omega e \cdot ye$ = 0,22437 cm^{-1}, $\omega e \cdot ze$ = −0,01218 cm^{-1}, r_e = 1,274552 Å. URL: https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C7647010&Mask=1000 (consultada el 15 oct 2026; el cuaderno trae una copia congelada por si la página falla).

El modelo (te lo regalamos). Mide la distancia en unidades de $\ell = \sqrt{(\hbar/(\mu\omega))}$ y la energía en unidades de $\hbar\omega$ (= ωe). Entonces el potencial armónico es V_arm(x) = $x^2/2$ y el de Morse es

$$V_M(x) = D\,(1 - e^{-ax})^2, \qquad D = \frac{\omega_e}{4\,\omega_e x_e} \approx 14{,}157, \qquad a = \frac{1}{\sqrt{2D}} \approx 0{,}18793.$$

(Con $a = 1/\sqrt{(2D)}$, V_M y V_arm tienen la misma curvatura en x = 0.) La diferencia es $g(x) = V_M(x) - x^2/2$.

Receta 1 (primer orden). Un término extra W(x) corre el nivel base en $\langle\psi_0|W|\psi_0\rangle = (1/\sqrt{\pi}) \int e^{-x^2} W(x)\,dx$.

Receta 2 (segundo orden, solo para un término cúbico $b \cdot x^3$). Lo corre en $-(11/8)\,b^2$.

En cada ítem: **(a) predice en esta guía antes de correr**, **(b) corre la celda**, **(c) explica** la diferencia entre lo que predijiste y lo que salió.

II.1 · La regla y $\langle x^4 \rangle$ — Celdas 3, 4 y 5 (4 puntos)

a) **Predice.** En la Celda 4, ¿cuál de las tres columnas de pesos debería dar 0, según el Paso 3? ¿Cuál es el menor n con el que la regla da $\langle x^4 \rangle = 3/4$ exacto, y qué da con $n = 2$?

b) **Corre.** Completa la única línea de la Celda 3 (la regla $(1/\sqrt{\pi})\ \Sigma\ w_j\ g(x_j)$) y corre las Celdas 3, 4 y 5.

c) **Explica.** ¿Por qué la columna que debería ser 0 da números como 10^{-17} y no 0? Cambia $k = 6$ en la Celda 5: ¿qué n mínimo aparece ahora y por qué? Cambia $k = 5$: ¿por qué sale exacto incluso con $n = 1$?

II.2 · La corrección de Morse con n nodos — Celda 6 (4 puntos)

La forma cerrada existe porque en la gaussiana $\langle e^{-kx} \rangle = e^{k^2/4}$: $\langle g \rangle = D(1 - 2e^{a^2/4} + e^{a^2}) - 1/4$.

a) **Predice.** e^{-ax} es una función entera (todas sus derivadas existen y son acotadas cerca de 0). Usa la fórmula del error de la Parte I con $\eta \approx 0$ y el dato $g^{(2n)}(0) = D\ a^{2n}(4^n - 2)$ para $n \geq 2$: al pasar de n a n + 1 nodos, ¿el error se divide por 2, por 10, por 100 o por más? ¿Con cuántos nodos crees que se llega al límite de la máquina ($\varepsilon \approx 2{,}2 \times 10^{-16}$)?

b) **Corre** la Celda 6. Mira las dos columnas de error y la gráfica.

c) **Explica.** ¿Qué tan cerca está la estimación de la Parte I del error real? Desde $n = 8$ las dos columnas de error se separan: con el valor "ingenuo" el error se estanca en unos 3×10^{-15}, y con el "estable" baja hasta el orden de 10^{-16}. Las dos fórmulas son algebraicamente idénticas. ¿Cuál de los temas del curso explica la diferencia? Señala la resta culpable.

II.3 · ¿Cuánto se corre el nivel base? — Celda 7 (3 puntos)

Taylor de Morse alrededor de 0 (usa $D \cdot a^2 = 1/2$): $V_M(x) = x^2/2 - (a/2)\, x^3 + (7/24)\, a^2\, x^4 + \dots$

a) **Predice.** Según la receta 1, ¿el nivel base sube o baja? Según la fórmula exacta de Morse, $E_v = \omega e(v + ½) - \omega e \cdot xe(v + ½)^2$, ¿cuántos cm^{-1} se corre E_0 respecto al armónico?

b) **Corre** la Celda 7, con `incluir_cubico = False` y después con `True`.

c) **Explica.** ¿Por qué la receta 1 y Morse exacto dan signos contrarios? ¿Por qué el término cúbico no aporta nada a primer orden? (Piensa en paridad: ¿cuánto vale $\langle x^3 \rangle$?) ¿Qué pasa cuando sumas la receta 2?

II.4 · La frecuencia fundamental de HCl — Celda 8 (3 puntos)

La fundamental es la transición $v = 0 \to 1$: $\nu = E_1 - E_0$. Para el armónico, $\nu = \omega e$; para Morse, $\nu = \omega e - 2\omega e \cdot xe$. La "observada" se calcula con todas las constantes de NIST, que vienen de ajustar las bandas infrarrojas medidas.

a) **Predice.** ¿Qué error relativo (en %) esperas del modelo armónico? ¿Y del de Morse? ¿Cuántos niveles ligados tiene el pozo de Morse? (Pista: los niveles existen mientras E_v siga creciendo con v.)

b) **Corre** la Celda 8.

c) **Explica.** ¿Por qué el armónico **sobreestima** la frecuencia? Mira en la tabla cómo se separan E_arm y E_Morse al subir v. ¿A qué longitud de onda (en μm) absorbe HCl su fundamental?

Parte III · El agente (12 puntos)

> **Escenario inventado para este parcial.** Los números de la tabla sí están calculados de verdad, pero el agente no existe.

Un agente de RL tiene un **presupuesto de 6 condiciones** para estimar valores esperados en el estado base, $\langle f\rangle = (1/\sqrt{\pi}) \int e^{-x^2} f(x)\, dx$. Una condición es un valor $f(x_j)$ o una derivada $f'(x_j)$. En cada acción escoge dónde poner las condiciones y usa la regla que integra exactamente el polinomio (Lagrange u osculante) que pasa por ellas. Su recompensa es $-|\text{error}|$ en $\langle g\rangle = \langle V_M - V_arm\rangle$ de HCl (valor exacto 0,0078276501608889). Las acciones E y F están como referencia.

Acción	Condiciones	Pesos de las derivadas	$\langle x^4\rangle$ (exacto 0,75)	$\langle x^6\rangle$ (exacto 1,875)	$\lvert\text{error}\rvert$ en $\langle g\rangle$ de HCl
A · Gauss–Hermite n = 6	6 valores	—	0,75	1,875	$2{,}7 \times 10^{-12}$
B · osculante en los 3 nodos de H_3	3 valores + 3 derivadas	0, 0, 0	0,75	1,125	$4{,}1 \times 10^{-5}$
C · osculante en -1, 0, 1	3 valores + 3 derivadas	$-0{,}0625$; 0; 0,0625	0,75	1,000	$4{,}8 \times 10^{-5}$
D · 6 nodos equiespaciados en $[-2{,}5;\ 2{,}5]$	6 valores	—	0,75	1,984	$5{,}9 \times 10^{-6}$
E · Gauss–Hermite n = 3	3 valores	—	0,75	1,125	$4{,}1 \times 10^{-5}$
F · Gauss–Hermite n = 2	2 valores	—	0,25	0,125	$5{,}2 \times 10^{-3}$

El agente aprendió a escoger A.

III.1 · ¿Verdadero o falso? (6 puntos, 1 cada una)

Para cada afirmación del "reporte del agente", escribe V o F y **justifícala con la teoría** en una o dos líneas. Un V o F sin razón no vale.

1. "Con n = 2 nodos de Gauss–Hermite, la regla da exactamente $\langle x^5\rangle$, aunque 5 es mayor que $2n - 1 = 3$."
2. "Con n = 2 nodos la regla es exacta para todo polinomio de grado ≤ 5."
3. "La acción B gasta 6 condiciones y rinde exactamente lo mismo que E con 3: sus 3 derivadas no aportan nada."
4. "B y C usan 6 condiciones cada una, así que son exactas para todo polinomio de grado $\leq 2 \cdot 6 - 1 = 11$."
5. "Pasar de 3 a 6 nodos de Gauss–Hermite (de E a A) baja el error de $\langle g\rangle$ más o menos a la mitad."
6. "En C las derivadas sí cuentan (sus pesos no son todos 0), porque -1, 0, 1 no son las raíces de H_3."

III.2 · Inferencia (3 puntos)

¿Por qué el agente aprendió A y no B, si las dos gastan 6 condiciones? Responde con el número $2n - 1$ y con el Paso 3 de la Parte I. ¿Y por qué A le gana a D, que también usa 6 valores?

III.3 · Reward hacking (3 puntos)

Una versión anterior del agente se evaluaba sobre la familia $\{x^3, x^5, \sin x\}$, en vez de $\langle g \rangle$, y pagaba un pequeño costo por cada condición usada. Ese agente aprendió a usar **un solo nodo** (Gauss–Hermite $n = 1$, el nodo $x = 0$) y reportó "error 0 en todas las pruebas".

a) ¿Por qué obtuvo error 0 de verdad? b) ¿Qué error tiene esa acción en $\langle x^4 \rangle$ y en $\langle g \rangle$ de HCl? (Calcúlalo: no hace falta el computador.) c) Propón un cambio concreto a la familia de prueba para que esta trampa deje de funcionar.

Parte IV · Consulta: nuestra idea de paper aplicada a tu tema (12 puntos)

Haz una búsqueda profunda (NotebookLM Deep Research u otra herramienta) sobre **cuadratura de Gauss y Gauss–Hermite en física y química cuántica**: la representación de variable discreta (DVR), los métodos espectrales y pseudoespectrales para la ecuación de Schrödinger, y trabajos de ML/RL que escogen bases, mallas o nodos en problemas cuánticos.

Algunos puntos de partida que el profesor verificó que existen. Igual tienes que auditarlos, porque que existan no quiere decir que digan lo que alguien les atribuye:

- G. H. Golub y J. H. Welsch, "Calculation of Gauss quadrature rules", *Math. Comp.* 23 (1969), 221–230.
- J. C. Light, I. P. Hamilton y J. V. Lill, "Generalized discrete variable approximation in quantum mechanics", *J. Chem. Phys.* 82 (1985), 1400–1409.
- D. T. Colbert y W. H. Miller, "A novel discrete variable representation for quantum mechanical reactive scattering via the S-matrix Kohn method", *J. Chem. Phys.* 96 (1992), 1982–1991.
- J. Yang et al., "Reinforcement Learning for Adaptive Mesh Refinement", arXiv:2103.01342 (2021).

IV.1 · Síntesis (4 puntos)

Una página escrita **por ti, sin IA**, que responda las preguntas guía:

1. ¿Qué es una DVR y qué tiene que ver con los nodos de Gauss y los L_j de la Parte I? (Pista: ¿qué le pasa a la matriz del potencial cuando la calculas con la regla de cuadratura?)
2. ¿Por qué los métodos espectrales convergen "exponencialmente" para funciones suaves, y cómo se relaciona con lo que viste en la Celda 6?

3. ¿Hay trabajos donde un agente de RL o un modelo de ML escoja la base, la malla o los nodos en un problema cuántico? ¿Qué usan como recompensa? ¿Tienen riesgo de reward hacking como el de III.3?

IV.2 · Cuatro fuentes auditadas (4 puntos, 1 por fuente)

Al menos **dos** tienen que ser fuentes que encontraste tú, no de la lista de arriba.

#	Referencia (autores, año, título)	¿Existe? (DOI/enlace)	Tipo (artículo, libro, preprint…)	¿Dice lo que la herramienta le atribuye?	Conexión con el curso
1					
2					
3					
4					

IV.3 · Nuestra idea en tu tema (4 puntos)

La idea de paper del curso es una biblioteca de demostraciones escritas como grafo (pasos, razones, dependencias, distractores), sobre la que un agente aprende a demostrar, más agentes que toman las mismas decisiones que un estudiante de métodos numéricos.

a) (2 puntos) Escribe la demostración de la Parte I como grafo: una lista de 6 a 8 nodos (paso + razón), con flechas "depende de", e incluye **un distractor**: un paso que suene plausible pero sea falso (por ejemplo, una razón equivocada para que $B_j = 0$).

b) (2 puntos) **¿Qué tendría que ser verdad para que nuestra idea fuera nueva en tu tema?** Piensa en un agente que aprenda a escoger nodos o bases para problemas cuánticos y que además "sepa por qué" (que pueda citar el Paso 3 o la fórmula del error). ¿Qué encontraste, o no encontraste, en tu búsqueda que lo haga nuevo o ya hecho?

Bitácora de IA

Una fila por cada uso. Si no usaste IA, escribe «No usé IA» y firma.

Punto	Qué le pedí	Qué me respondió, en una línea	Qué comprobé o corregí yo, y cómo

Firma: _____

Sustentación (la llena el profesor el martes)

Punto sorteado: _____

- ☐ Explica el punto con sus palabras, sin leer la guía
- ☐ Reproduce en el tablero la cuenta o el paso clave
- ☐ Responde una variante: otro dato, otro valor inicial, otro nodo
- ☐ Lo que dice coincide con lo que entregó y con su bitácora

Factor: 1 ☐ 0,6 ☐ 0,2 ☐ **Nota escrita:** ____ / 50 **Nota final:** ____