

Departamento:	Risaralda	Lote:	130	Fecha de muestreo:	2022.08.05
Municipio:	SANTA ROSA DE	Etapas/Edad del cultivo:	Crecimiento - 20 mes(es)	Fecha de análisis:	2022.08.05
SICA Lote:		Densidad de siembra:	2000 árboles/ha	Fecha de reporte:	2022.8.05
Nombre Finca:	CAu00d1A BRAVA	Nivel de sombra:	20 %		
Solicitante:	MULTILAB AGROANALITICA				

Determinación	Método	Resultado	Rango adecuado	Interpretación				
				Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
pH	Potenciométrico en agua 1:1	5,3	Entre 5,0 y 5,5					
Materia orgánica	Walkley-Black - Colorimétrico	8,5 %	Mayor de 8,0					
Fósforo (P)	Bray II - Colorimétrico	10 mg/kg	Mayor de 30					
Potasio (K)	Acetato de amonio - Absorción atómica	0,07 cmol _c /kg	Mayor de 0,40					
Magnesio (Mg)	Acetato de amonio - Absorción atómica	0,1 cmol _c /kg	Mayor de 0,9					
Calcio (Ca)	Acetato de amonio - Absorción atómica	1,4 cmol _c /kg	Mayor de 3,0					
Azufre (S)	Fosfato de calcio - Turbidimétrico	24 mg/kg	Mayor de 12					
Aluminio (Al)	Yuan - Absorción atómica	0,4 cmol _c /kg	Menor de 1,0					
Textura	Al tacto	Franco						

Nutrientes requeridos:

		Nutrientes				
Etapas	Época	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S
Producción	Año 1 - Aplicación 1 (kg/ha)	119	51	128	51	
	Año 1 - Aplicación 2 (kg/ha)	119		128		
	Total año 1 (kg/ha)	238	51	255	51	
	Año 2 - Aplicación 1 (kg/ha)	119	51	128	51	
	Año 2 - Aplicación 2 (kg/ha)	119		128		
	Total año 2 (kg/ha)	238	51	255	51	
TOTAL	Cantidad total etapas de producción (kg/ha)	476	102	510	102	

Alternativas para la fertilización:

Etapas de Producción:

Año 1	Aplicación 1	215 kg/ha de Urea, 111 kg/ha de DAP, 213 kg/ha de Cloruro de potasio y 58 kg/ha de Oxido de magnesio ó 235 kg/ha de Urea, 98 kg/ha de MAP, 213 kg/ha de Cloruro de potasio y 58 kg/ha de Oxido de magnesio
	Aplicación 2	259 kg/ha de Urea y 213 kg/ha de Cloruro de potasio ó 259 kg/ha de Urea y 213 kg/ha de Cloruro de potasio
Año 2	Aplicación 1	215 kg/ha de Urea, 111 kg/ha de DAP, 213 kg/ha de Cloruro de potasio y 58 kg/ha de Oxido de magnesio ó 235 kg/ha de Urea, 98 kg/ha de MAP, 213 kg/ha de Cloruro de potasio y 58 kg/ha de Oxido de magnesio
	Aplicación 2	259 kg/ha de Urea y 213 kg/ha de Cloruro de potasio ó 259 kg/ha de Urea y 213 kg/ha de Cloruro de potasio

Sugerencias para el manejo de enmiendas:

* Aplicar 400 kg/ha de Caliza dolomítica 2 ó 3 meses antes o después de una fertilización

Observaciones:

- * El Óxido de magnesio no se debe mezclar con los fertilizantes granulados en la etapa de producción. De ser necesario, este fertilizante se puede mezclar con la cal.
- * Las fertilizaciones se deben realizar teniendo en cuenta las épocas de lluvia.
- * Los resultados de los análisis de suelos presentados en este documento y su interpretación tendrán validez siempre y cuando se haya tomado y analizado de manera correcta la muestra de suelo. Puede encontrar mayor información en el Boletín Técnico Cenicafe No. 32 'Fertilidad del suelo y nutrición del café en Colombia'.
- * Las recomendaciones para este análisis de suelos tienen vigencia entre agosto de 2022 y agosto de 2024