

# PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA

MANUAL DE TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM  
TUMORES CEREBRAIS



# PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA

MANUAL DE TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM  
TUMORES CEREBRAIS

*Editado por*

FRANCISCO H. C. FÉLIX

*Centro Pediátrico do Câncer, Hospital Infantil Albert Sabin*

JUVENIA B. FONTENELE

*Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,  
Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - CE*

2017

SHARELATEX

<http://bit.ly/fhcflix-2ifVArn>





Dedicado a nossos filhos, Lucas, Beatriz e Sofia, sem cujo suporte e paciência nada teria sido realizado.

---

# Sumário

---

<b>Sumário</b>	<b>6</b>
<b>Lista de Figuras</b>	<b>9</b>
<b>Lista de Tabelas</b>	<b>9</b>
<b>1 Introdução</b>	<b>3</b>
1.1 Tumores cerebrais na infância e adolescência . . . . .	3
1.2 Por quê criar um compêndio de protocolos de quimioterapia? . . . . .	7
<b>2 O tratamento de tumores cerebrais em crianças</b>	<b>9</b>
2.1 Gliomas de baixo grau . . . . .	9
2.1.1 Avaliação crítica de ensaios clínicos . . . . .	9
2.1.2 O panorama molecular dos gliomas de baixo grau . . . . .	13
2.2 Tumores embrionários . . . . .	14
<b>Referências Bibliográficas</b>	<b>15</b>
<b>3 Esquemas de tratamento</b>	<b>19</b>
3.1 Introdução . . . . .	19
3.2 O que são estes protocolos . . . . .	19
3.3 Como utilizar estes protocolos . . . . .	20
3.4 Formato e contribuições . . . . .	20
<b>A Protocolos principais</b>	<b>21</b>
A.1 GLIOMA DE BAIXO GRAU – Adaptado do ensaio COG-A9952 . . . . .	23
A.1.1 Indução: 10 semanas . . . . .	23
A.1.2 Manutenção: 48 semanas (08 blocos de 6 semanas) . . . . .	24
A.1.3 Modificações de dose: . . . . .	28
A.2 GLIOMA DE BAIXO GRAU: TRATAMENTO ALTERNATIVO DE PRIMEIRA LINHA, SEGUNDA LINHA NA CONTRA-INDICAÇÃO AO USO DA CARBOPLATINA OU RECORRÊNCIA APÓS TRATAMENTO . . . . .	29
A.2.1 Quimioterapia adjuvante: 52 semanas ou 1 ano . . . . .	29

A.2.2	Modificações de dose: . . . . .	34
A.3	MEDULOBLASTOMA - RISCO PADRÃO – Adaptado dos ensaios CCG-9961 e ACNS0331	35
A.3.1	Radioquimioterapia: 7 semanas (43 dias) . . . . .	35
A.3.2	Manutenção: 04 ciclos A e 04 ciclos B . . . . .	38
A.3.3	Modificações de dose: . . . . .	40
A.4	TUMORES MALIGNOS DO SNC EM MENORES DE 3 ANOS – Adaptado do ensaio CCG 9921 . . . . .	41
A.4.1	Indução: 5 ciclos (VCEC) . . . . .	41
A.4.2	Manutenção: 08 ciclos . . . . .	44
A.4.3	Modificações de dose: . . . . .	48
A.5	EPENDIMOMA – Adaptado dos ensaios do COG e SIOP e de dados combinados da literatura	49
<b>B</b>	<b>Protocolos <i>off-label</i> (não padronizados)</b>	<b>51</b>
B.1	PNET - ALTO RISCO – Adaptado dos ensaios COG-A99701 e ACNS0332 - protocolo <i>off-label</i>	53
B.1.1	Radioquimioterapia: 7 semanas (43 dias) . . . . .	53
B.1.2	Manutenção: 06 ciclos . . . . .	56
B.1.3	Modificações de dose: . . . . .	58
B.2	GLIOMA DE ALTO GRAU E DIPG – Adaptado do ensaio ACNS0423 - protocolo <i>off-label</i>	59
B.2.1	Indução: 6 semanas (radioquimioterapia) . . . . .	59
B.2.2	Manutenção: 06 ciclos . . . . .	60
B.2.3	Modificações de dose: . . . . .	62
B.3	GLIOMA DE ALTO GRAU E DIPG – Adaptado do ensaio HIT-GBM-D - protocolo <i>off-label</i>	65
B.3.1	Indução: 6 semanas (radioquimioterapia) . . . . .	65
B.3.2	Manutenção: 08 ciclos . . . . .	67
B.3.3	Modificações de dose: . . . . .	69
<b>C</b>	<b>Quimioterapia de resgate (doença recorrente/progressiva)</b>	<b>71</b>
C.1	TUMORES PEDIÁTRICOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL RECORRENTES (protocolo <i>off-label</i> ) . . . . .	73
C.1.1	Quimioterapia: 10 ciclos . . . . .	73
C.1.2	Modificações de dose: . . . . .	78
C.2	IFOSFAMIDA/ETOPOSIDO - protocolo <i>off-label</i> . . . . .	79
C.2.1	Resgate: 03 ciclos - repetir enquanto não houver progressão . . . . .	79
C.2.2	Modificações de dose: . . . . .	80
C.3	IFOSFAMIDA, CARBOPLATINA E ETOPOSIDO (ICE) - protocolo <i>off-label</i> . . . . .	83
C.3.1	Resgate: 02 ciclos - repetir enquanto não houver progressão . . . . .	83
C.3.2	Modificações de dose: . . . . .	84
<b>D</b>	<b>Quimioterapia neoadjuvante</b>	<b>87</b>
D.1	VIMBLASTINA METRONÔMICA NEOADJUVANTE - protocolo <i>off-label</i> . . . . .	89
D.1.1	Esquema: 6 semanas . . . . .	89
D.1.2	Modificações de dose: . . . . .	91

D.2	IFOSFAMIDA, CARBOPLATINA E ETOPOSIDO (ICE) NEOADJUVANTE PARA TUMORES DE PLEXO CORÓIDE - protocolo <i>off-label</i> . . . . .	92
D.2.1	Dois ciclos - repetir uma vez se necessário e não houver progressão . . . . .	92
D.2.2	Modificações de dose: . . . . .	93
<b>E</b>	<b>Quimioterapia metronômica</b>	<b>95</b>
E.1	VIMBLASTINA SEMANAL METRONÔMICA - protocolo <i>off-label</i> . . . . .	97
E.1.1	Esquema 1: 6 semanas - usar esquema 1 ou 2, não ambos . . . . .	97
E.1.2	Esquema 2: 6 semanas - usar esquema 1 ou 2, não ambos . . . . .	99
E.1.3	Modificações de dose: . . . . .	101
<b>F</b>	<b>Protocolos depreciados (substituídos por atualizações)</b>	<b>103</b>
F.1	GLIOMA DE ALTO GRAU E DIPG – Adaptado do ensaio ACNS0126 . . . . .	105
F.1.1	Indução: 6 semanas (radioquimioterapia) . . . . .	105
F.1.2	Manutenção: 10 ciclos . . . . .	106
F.1.3	Modificações de dose: . . . . .	110
F.2	EPENDIMOMA NÃO METASTÁTICO – Adaptado dos ensaios ACNS0121 e ACNS0831 . . . . .	113
F.2.1	Indução: 2 ciclos (pré-radioterapia) . . . . .	114
F.2.2	Manutenção: 04 ciclos (VCEC) . . . . .	114
F.2.3	Modificações de dose: . . . . .	116
<b>G</b>	<b>Protocolos experimentais (estudos clínicos)</b>	<b>119</b>
G.1	VALQUIRIA (VALPROATO, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA - protocolo experimental cancelado . . . . .	121
G.1.1	Resumo do tratamento: . . . . .	122
G.1.2	Indução: 6 semanas (radioquimioterapia) . . . . .	122
G.1.3	Manutenção: 08 ciclos . . . . .	124
G.1.4	Modificações de dose: . . . . .	126



---

## Lista de Figuras

---

1.1	Tratamento de crianças com tumores cerebrais, com histologia . . . . .	4
1.2	Tratamento de crianças com tumores cerebrais, sem histologia . . . . .	6
2.1	Tratamento de crianças com gliomas de baixo grau. . . . .	10

---

## Lista de Tabelas

---

1.1	incidência relativa de grupos histológicos de tumores cerebrais em criança e adolescentes relatada no Brasil. A classificação está de acordo com a ICC. A última coluna mostra dados não publicados de nosso serviço. P = Tinho et al, 2011; R = Rosenberg et al, 2007; H = HIAS, não publicado; NI = não informado. . . . .	5
-----	--	---



---

# **Prefácio**

---



---

# Introdução

---

## 1.1 Tumores cerebrais na infância e adolescência

Os tumores cerebrais são um grupo heterogêneo de doenças neoplásicas de comportamento variável, com as características comuns de relativa raridade, elevada morbidade e elevada mortalidade. Dentre as neoplasias infantis, no entanto, constituem (como um grupo) o primeiro tumor sólido e a segunda neoplasia maligna mais frequente nas crianças, atrás apenas das leucemias, perfazendo em torno de 20% das neoplasias pediátricas. A sua incidência varia de acordo com a região do mundo. Nos EUA, a incidência anual ajustada para a idade de tumores cerebrais malignos primários na população de 0 – 15 anos foi de 3,4 por  $10^5$  pessoas-ano entre 2004 – 2008 [1]. Já na Europa, entre 1988 – 1997, a incidência reportada foi de 2,99 por  $10^5$  [2]. Esta incidência é mais alta do que a usualmente reportada na Ásia, onde relatos indicam entre 1,8 – 2,2 casos por  $10^5$  [3]. No Brasil, o primeiro relato do Registro de Câncer de Base Populacional indicou uma incidência de 0,9 a 3,2 por  $10^5$ , semelhante à estatística do mundo desenvolvido ocidental [4]. Fortaleza teve uma das menores incidências relatadas, 1,3 casos por  $10^5$ , o que pode indicar subdiagnóstico. Hoje em dia, no entanto, já não é apropriado falar em “tumores cerebrais” infantis, sem separar as diversas entidades patológicas entre si, as quais têm incidência, tratamento e prognóstico muito díspares.

Os tumores cerebrais mais frequentes em crianças são os astrocitomas pilocíticos, tumores de comportamento incerto, ora classificados como benignos, ora como malignos. Eles representam em torno de 18% dos tumores cerebrais infantis. Em seguida, vem os tumores embrionários, a maior parte dos quais meduloblastomas, os tumores malignos mais comuns da infância, que representam em torno de 15% dos diagnósticos de tumor cerebral em crianças [1]. Astrocitomas pilocíticos são tumores indolentes, de crescimento lento, tratados principalmente pela ressecção cirúrgica, a qual é curativa na maioria dos casos, com pouca probabilidade de disseminação e virtualmente ausência de transformação maligna [5]. Já os meduloblastomas são tumores indiferenciados, com elevado índice mitótico, com acentuada propensão à disseminação e recidiva, necessitando de terapia adjuvante com radioquimioterapia após ressecção cirúrgica [6]. Estes dois tipos tumorais, que juntos correspondem a mais de 30% dos casos de tumores cerebrais em crianças, têm hoje um excelente prognóstico quando comparado ao passado. Outros tipos tumorais menos frequentes, todavia, têm resultados menos brilhantes com o tratamento atualmente disponível. Tumores de




Figura 1.1: Tratamento de crianças com tumores cerebrais, com histologia

Tipos tumorais (histologia)				P	R	H
Neuroepiteliais	Gliomas	Astrocitomas	Pilocítico	37%	18,2%	10,6%
			Difuso		6,2%	7%
			Anaplásico		4,4%	2,2%
		Oligodendrogliomas		NI	0,9%	0,9%
		Ependimomas	Clássico	6,8%	7,4%	7,9%
			Anaplásico			4%
		Glioblastoma		NI	3,7%	3,5%
	Embrionários	Meduloblastomas	Clássico	13,6%	11,2%	21%
			Desmoplásico			3,5%
			Anaplásico			0,4%
		Pineoblastomas		3,9%	NI	0,4%
		PNET	Supratentorial		2,7%	1,3%
			Outros			0,9%
	Neural	Ganglioglioma		NI	4,6%	0,8%
		Neurocitoma, DNET, ganglioneuroma			3%	0%
Meninges	Meningioma			NI	3%	NI
Endócrino	Craniofaringioma			10,5%	11%	NI
TCG	Tumores de células germinativas			6,1	3,6%	NI

**Tabela 1.1:** incidência relativa de grupos histológicos de tumores cerebrais em criança e adolescentes relatada no Brasil. A classificação está de acordo com a ICC. A última coluna mostra dados não publicados de nosso serviço. P = Tinho et al, 2011; R = Rosemberg et al, 2007; H = HIAS, não publicado; NI = não informado.

tronco cerebral, normalmente não biopsiados na sua maioria, constituem cerca de 10% dos tumores cerebrais infantis, e têm um prognóstico extremamente reservado, com apenas um subgrupo pequeno de pacientes com tumores neste sítio alcançando sobrevida prolongada.

O tratamento de tumores cerebrais em crianças e adolescentes evoluiu significativamente nas últimas décadas. Dos anos 80 até hoje, o conhecimento sobre o papel das várias modalidades de terapia (cirurgia, radioterapia e quimioterapia) ficou mais claro e programas terapêuticos específicos para cada tipo de doença puderam ser desenvolvidos. Hoje em dia, a maioria das crianças com um diagnóstico de tumor cerebral conseguirá ser adequadamente tratada e alcançará sobrevida prolongada. O manejo dos efeitos colaterais a longo prazo da terapia e das sequelas da doença são as principais preocupações na neuro-oncologia pediátrica moderna [7]. No Brasil, estudos de sobrevida de pacientes pediátricos com tumores cerebrais são raros. Nosso grupo publicou recentemente uma análise de sobrevida de 103 pacientes pediátricos diagnosticados com tumores cerebrais entre 2000 e 2006 num único centro hospitalar, mostrando resultados que se assemelham aqueles dos registros populacionais dos EUA e Europa para as principais patologias [8].

Os protocolos listados foram avaliados e qualificados segundo a nova classificação de níveis de evidência da OCEBM [9]. A partir desta classificação, foram selecionados os tratamentos com maior qualidade de evidência, os quais podem ser recomendados rotineiramente. Lacunas no conhecimento atual foram




Figura 1.2: Tratamento de crianças com tumores cerebrais, sem histologia

listadas (não exaustivamente). De acordo com a classificação 2011 da OCEBM, os ensaios controlados e randomizados são considerados evidência de nível 2, enquanto os estudos não controlados e séries de casos (equivalentes) são considerados evidência de nível 4 (tratamento). Nenhum trabalho com nível 3 de evidência (controlados, porém não randomizados) foi encontrado. Alguns ensaios foram desenhados para obter informações sobre história natural da doença. Grandes coortes para estudo de prognóstico (*inception cohort*) são consideradas nível 2 de evidência, enquanto coortes de qualidade menor ou grupos controle de ensaios randomizados são nível 3.



## **1.2 Por quê criar um compêndio de protocolos de quimioterapia?**

O Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) é uma instituição hospitalar da administração direta da saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, habilitado como unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia, UNACON exclusiva de oncologia pediátrica, UTI pediátrica nível II e hospital de ensino, nível de atenção de alta complexidade, atendendo pelo SUS [10]. O Centro Pediátrico do Câncer é o anexo do HIAS onde o tratamento oncológico clínico é realizado, contando ainda com equipe multiprofissional de atenção às crianças com câncer. Tem 22 leitos de internação em enfermaria (2 isolamentos), 06 leitos de UTIP, e 05 consultórios para atendimento ambulatorial. O ambulatório e a enfermaria contam com material para atendimento às urgências e emergências, incluindo carrinho de emergência completo com drogas e equipamento para reanimação. O CPC conta com plantão médico 24h por dia.

O HIAS-CPC é referência estadual para o tratamento de crianças com tumores cerebrais, servindo uma população de 8,8 milhões de habitantes (um e meio milhão de crianças e jovens até 18 anos) [11]. A incidência ajustada para a idade de tumores cerebrais pediátricos no Ceará foi estimada em 1,3 casos por  $10^5$ , entre 1998 e 2002 [12]. Seu papel é fundamental para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de centenas de crianças com câncer, incluindo tumores cerebrais. O HIAS-CPC recebeu cerca de 35 novos pacientes com tumores cerebrais ao ano entre 2007 e 2013 (um total de 250). Isto indica que a esmagadora maioria das crianças com esta doença no estado do Ceará são tratadas no HIAS-CPC. Dessa forma, torna-se imprescindível que a qualidade da atenção à saúde dispensada a estes pequenos pacientes em nosso serviço hospitalar seja continuamente revisada, avaliada e padronizada.



---

# O tratamento de tumores cerebrais em crianças

---

## 2.1 Gliomas de baixo grau

### 2.1.1 Avaliação crítica de ensaios clínicos

Esse grupo inclui os astrocitomas, oligodendrogliomas, gangliogliomas e tumores gliais mistos ou variantes (grupos IIIa, b e d da ICC3) [13]. A denominação de baixo grau refere-se à classificação da OMS para tumores do sistema nervoso central, a qual divide as neoplasias em 4 grupos, baseada em critérios histológicos. A classificação da OMS para tumores do sistema nervoso central constitui uma “escala de malignidade”, mais do que um esquema de estadiamento convencional [14]. Os tumores classificados como Grau I ou II são coletivamente denominados tumores de baixo grau de malignidade, enquanto aqueles classificados como Grau III ou IV são designados tumores de alto grau de malignidade. Os tumores de baixo grau são comumente tratados apenas cirurgicamente, com elevados índices de cura e sobrevida prolongada. Tumores astrocíticos e oligodendrogliais de baixo grau têm bom prognóstico associado à ressecção cirúrgica como única terapia. Todavia, a possibilidade de ressecção cirúrgica completa varia muito de acordo com o sítio tumoral [15]. Gliomas cerebelares são passíveis de ressecção completa em 60 – 70% dos casos, a maioria são astrocitomas pilocíticos (grau I) e seu comportamento é praticamente benigno [5]. A recidiva após ressecção e a progressão para tumores de maior grau de malignidade são muito raras. Mesmo tumores incompletamente ressecados mostram uma baixa propensão a progredir. A sobrevida livre de progressão em 5 anos após a cirurgia é de 84 – 91%. A sobrevida livre de progressão em 5 anos em pacientes com doença residual é de 54 – 63% [15]. Gliomas da via óptica e hipotálamo (e demais tumores diencefálicos ou da linha média) são lesões difusas, infiltrativas, em sua maioria astrocitomas de baixo grau (pilocítico ou difuso), com maior chance de disseminação e metástase no neuro-eixo, com maior incidência em pacientes com neurofibromatose tipo 1. Devido a sua natureza infiltrativa e ao risco de sequelas visuais e neuro-endócrinas, a ressecção cirúrgica não é realizada na maioria dos casos e a biópsia somente está indicada nos casos de imagem atípica. A maioria dos pacientes é tratada com base apenas em imagens sugestivas. Apesar de sua histologia, têm um prognóstico mais reservado do que os pacientes com lesões cerebelares [5]. A sobrevida livre de progressão em 5 anos é de 47% [15]. Oligodendrogliomas, tumores mistos e variantes de tumores astrocíticos são raros em crianças (1% ou menos de todos os tumores cerebrais). São tumores da substância branca supratentorial, infiltrativos, e o controle cirúrgico é curativo na maioria. Terapia adjuvante não está




Figura 2.1: Tratamento de crianças com gliomas de baixo grau.

bem definida para estes tumores [5]. A sobrevida livre de progressão em 5 anos é de 67% [15].

O papel da cirurgia no controle dos gliomas de baixo grau está bem estabelecido. O estudo prospectivo multi-institucional do Children's Oncology Group (COG) CCG9891 avaliou uma coorte de 518 pacientes diagnosticados com tumores de origem glial, tratados inicialmente com ressecção cirúrgica. Ocorreu revisão

central da histologia de todos os casos incluídos. Do total, 64% dos pacientes não tinha evidência de doença residual após a cirurgia, 20% tinha doença residual limitada ( $< 1,5\text{cm}^3$ ) e 16% tinha doença residual significativa ( $> 1,5\text{cm}^3$ ). A maioria dos pacientes (76%) tinha astrocitoma pilocítico, 6% astrocitoma difuso, 8% ganglioglioma e 10% oligodendroglioma, tumores mistos ou variantes. A maioria dos pacientes (73%) tinha 5 anos ou mais. A maioria (57%) tinha tumores cerebelares, 24% de hemisférios cerebrais, 14% da linha média e 4% das vias ópticas ou hipotálamo. A sobrevida livre de progressão em 5 anos de toda a coorte foi de 80%, sendo 84 a 91% para tumores cerebelares, 78% para hemisférios cerebrais, 65% para a linha média e 47% para vias ópticas ou hipotálamo ( $p < 0,001$ ) (nível 2). A sobrevida livre de progressão em 5 anos foi de 83% para astrocitomas pilocíticos, 88% para gangliogliomas, 66% para astrocitomas difusos e 67% para outros tumores ( $p = 0,64$ ) (nível 2). Finalmente, a ressecção cirúrgica completa foi o fator isolado de maior impacto na progressão nesta coorte, 94% dos pacientes com ressecção completa estavam livres de progressão após 5 anos, enquanto 59% dos pacientes com doença residual limitada e 53% dos pacientes com doença residual significativa alcançaram sobrevida livre de progressão prolongada ( $p < 0,01$ ) (nível 2). A conclusão é de que a ressecção completa deve ser tentada sempre que possível (ou seja, desde que não acarrete comprometimento funcional) para os pacientes pediátricos com gliomas de baixo grau (nível 4). Além disso, o fato de que mais de 50% dos pacientes com doença residual não progrediram em 5 anos indica que as intervenções terapêuticas adjuvantes devem ser postergadas até que ocorra progressão objetiva da doença. No entanto, apesar de sua histologia aparentemente benigna, 44% dos pacientes progrediram mesmo com doença residual muito limitada, o que indica a necessidade de monitorização dos pacientes com ressecção incompleta, independente da quantidade de tumor residual (nível 2) [15].

Fica evidente que um número significativo de pacientes pediátricos com gliomas de baixo grau sofre recidiva após controle cirúrgico ou não pode ter seu tumor ressecado. Nestes casos, indica-se terapia adjuvante com a intenção de evitar a progressão da doença. Vários estudos exploraram a contribuição da radioterapia e quimioterapia no tratamento de gliomas de baixo grau progressivos. Um ensaio fase II não controlado estudou 78 crianças com gliomas de baixo grau tratadas com radioterapia conformacional. Os pacientes tinham astrocitoma pilocítico ( $n = 50$ ), tumores de via óptica ou hipotálamo sem biópsia ( $n = 13$ ), astrocitoma difuso ( $n = 4$ ), ganglioglioma ( $n = 3$ ) e oligodendroglioma, tumores mistos ou variantes ( $n = 8$ ). A maioria dos tumores localizava-se no diencéfalo (47), 17 no cerebelo e 3 nos hemisférios cerebrais. Treze pacientes tinham NF-1, 25 receberam QT previamente e 65 sofreram cirurgia (biópsia ou ressecção incompleta). O tratamento foi indicado nos pacientes sintomáticos na avaliação inicial ou com evidência radiológica de progressão ou, ainda, com uma lesão residual numa área de risco para progressão. Dentre os pacientes cujo tratamento primário foi radioterapia, mais da metade iniciou o tratamento em menos de 90 dias após o diagnóstico. A sobrevida livre de progressão em 5 anos do grupo foi de 87%. Treze pacientes apresentaram progressão com uma mediana de tempo de 83 meses. Quatro pacientes apresentaram falha terapêutica, desenvolvendo doença metastática. Não ocorreu diferença digna de nota entre os tipos histológicos (nível 2). Nenhum dos pacientes com NF-1 teve progressão ou malignização. Um paciente da série desenvolveu um glioma de alto grau na região do campo de irradiação, 78 meses após o tratamento. A incidência cumulativa de vasculopatia na série foi de cerca de 5% em 7 anos e o principal fator de risco para esta complicação foi a idade menor que 5 anos (nível 2) [16]. Em relação aos efeitos cognitivos, um declínio de 10 pontos de QI foi estimado para crianças com 5 anos de idade ao tratamento, 5 anos após a radioterapia. O risco cumulativo de desenvolver insuficiência tireoidiana foi de 64% e de deficiência de GH foi de 49%, em 10 anos. A incidência cumulativa de déficit auditivo foi de cerca de 6% em 10 anos. A presença de NF-1 foi

um fator de risco para vasculopatia e déficit cognitivo (nível 2) [17]. Em conclusão, esta série mostrou inequivocamente que a radioterapia pode controlar adequadamente os gliomas de baixo grau pediátricos não controlados cirurgicamente, com uma elevada proporção de pacientes tendo sobrevida prolongada sem progressão (nível 4). No entanto, isso ocorre às custas de frequentes efeitos colaterais, provavelmente permanentes. A radioterapia para gliomas de baixo grau deve ser evitada em pacientes com menos de 5 anos, devido ao risco de vasculopatia (nível 2). Apesar do risco cumulativo de déficit auditivo ser baixo e do fato do declínio cognitivo ser menor com o avançar da idade, adiar a radioterapia o quanto for possível parece razoável.

Com o intuito de atrasar o início da radioterapia, vários estudos foram realizados com diferentes esquemas de quimioterapia em crianças com gliomas de baixo grau recorrentes ou progressivos. As combinações mais utilizadas foram: carboplatina e vincristina [18, 19]; procarbazina, tioguanina, lomustina e vincristina (TPCV) [20]; cisplatina e etoposídeo [21]. Packer et al trataram 78 pacientes até 15 anos com gliomas de baixo grau confirmados por histologia ou imagem típica, progressivos, reportando 56% de resposta radiológica objetiva e 68% de sobrevida livre de progressão em 3 anos (nível 4). A maioria dos pacientes ( $n = 32$ ) tinha astrocitoma fibrilar (difuso), 17 tinham astrocitoma pilocítico e 26 não tinham histologia. A maioria dos pacientes tinha tumores diencefálicos ( $n = 52$ ), 12 tinham no tronco e 6 em outros locais. Somente pacientes que sofreram ressecção de 50% ou menos das lesões foram admitidos. Não ocorreu revisão central de histologia ou imagens. Este ensaio clínico não avaliou se o esquema conseguia adiar o início da radioterapia, principal motivo do tratamento, devido ao curto tempo de seguimento [18]. A carboplatina foi testada pelo Pediatric Oncology Group (POG), em comparação com a iproplatina, num ensaio fase II, randomizado. Um grupo de pacientes pediátricos com tumores cerebrais histologicamente verificados, recorrentes ou progressivos, foi avaliado. O subgrupo de pacientes com astrocitoma de baixo grau (12 pacientes, agregando pacientes de um ensaio não randomizado prévio do POG) não mostrou resposta radiológica objetiva, mas a maioria dos pacientes apresentou estabilização prolongada da doença com a carboplatina, o que motivou os pesquisadores a testá-la num grupo maior [22]. O ensaio não randomizado HIT-LGG 1996, do grupo de pediatria oncológica dos países de língua alemã (GPOH) utilizou um esquema de carboplatina e vincristina diferente daquele do COG. Um relato do subgrupo com gliomas hipotalâmico-quiasmáticos que recebeu quimioterapia ( $n = 123$ ) mostrou sobrevida livre de progressão de 61% em 5 anos [19] (nível 4). Os resultados completos do ensaio ainda não foram publicados, mas foram apresentados na reunião anual da Société Internationale d'Oncologie Pédiatrique (SIOP) de 2005. A sobrevida livre de eventos em 5 anos relatada foi de 43% para o grupo tratado com quimioterapia [23]. Com o intuito de tentar melhorar estes resultados, a SIOP e o GPOH iniciaram conjuntamente o ensaio SIOP-LGG 2004, o qual terminou de cadastrar pacientes em 2012. Este ensaio randomizado compara carboplatina e vincristina com carboplatina, vincristina e etoposídeo [24]. Em 2002, um grupo italiano relatou um grupo de 34 crianças com gliomas de baixo grau não ressecáveis, a maior parte hipotalâmico-quiasmáticos ( $n = 29$ ), tratadas com cisplatina e etoposídeo. Eles mostraram uma sobrevida livre de progressão de 78% em 3 anos, com 11 pacientes obtendo remissão parcial e 1 completa (nível 4). No entanto, uma quantidade significativa de pacientes apresentou toxicidade auditiva, um efeito colateral conhecido da cisplatina [21].

Prados et al trataram 42 crianças até 18 anos com gliomas de baixo grau histologicamente confirmados (exceto tumores de diencefalo em pacientes com NF-1 ou de vias ópticas), com doença progressiva. A sobrevida livre de progressão foi de 45% em 3 anos, com mediana de 2,5 anos para progressão (nível 4). A maioria dos pacientes tinha astrocitoma pilocítico ( $n = 23$ ), 11 tinham astrocitoma (sem outra especificação),

6 não tinham histologia e 2 tinham oligodendroglioma ou ganglioglioma. A maioria dos pacientes tinham tumores hipotalâmicos ou quiasmáticos ( $n = 33$ ), 4 talâmicos e 5 em outras localizações. A maioria dos pacientes sofreu ressecção parcial ou subtotal. Este esquema foi derivado de experimentos pré-clínicos que mostraram que a combinação das drogas utilizadas tinha efeitos sinérgicos nas células neoplásicas [20]. Apesar da aparente superioridade da combinação carboplatina e vincristina, os ensaios tinham grandes diferenças entre si quanto aos diagnósticos histológicos e topográficos dos pacientes, além de diferenças na terapia prévia. Para definir qual o melhor dentre os dois esquemas, um ensaio fase III randomizado foi levado a cabo pelo COG e seus resultados publicados recentemente [25]. O estudo avaliou 274 pacientes com 10 anos ou menos, com gliomas de baixo grau e com doença residual (mais de 5% da lesão inicial ou  $1,5\text{cm}^2$ ) ou progressiva. Ocorreu revisão central das imagens e da patologia. Pacientes com tumores hipotalâmico-quiasmáticos foram incluídos com base nas imagens. A sobrevida livre de progressão em 5 anos foi de 45% para todo o grupo, sendo de 39% para o esquema carboplatina-vincristina e 52% para o esquema TPCV. Esta diferença não foi significativa num teste de log-rank, mas mostrou-se significativa num modelo de sobrevida com fração de cura (cure rate model), onde parte desta diferença deveu-se a pacientes com sobrevida prolongada ( $p < 0,05$ ) (nível 2). O ensaio encontrou dois preditores independentes da sobrevida livre de eventos: idade (menor risco entre 1 e 5 anos e doença residual (menor risco se  $< 3\text{cm}^2$ ) (nível 2).

O resultado deste ensaio deve ser encarado com senso crítico. Apesar de ambos os regimes terapêuticos aparentemente terem conseguido adiar a progressão nos pacientes estudados, a comparação com o subgrupo com doença residual significativa do CCG9891 indica que deve-se ter cautela na indicação de tratamentos adjuvantes. Pacientes com tumor residual maior que  $1,5\text{cm}^2$  e menor que  $3,0\text{cm}^2$  serão melhor seguidos com conduta expectante? Para pacientes com mais de 5 anos e mais de  $3,0\text{cm}^2$  de tumor residual, deve-se indicar radioterapia precocemente? A quimioterapia tem papel restrito aos pacientes menores de 5 anos com progressão documentada e naqueles com gliomas hipotalâmico-quiasmáticos? A ausência de ensaios comparativos entre as abordagens terapêuticas e de ensaios com controles não tratados impede a resposta destas questões com certeza. A conclusão sobre a terapia dos gliomas de baixo grau é de que, hoje em dia, temos evidência de relativa boa qualidade documentando a história natural deste grupo de tumores, mas a ausência de adequados estudos controlados e randomizados ainda suscita dúvidas quanto à melhor conduta em cada situação. A partir dos dados que temos até o momento, um esquema racional de tratamento para gliomas de baixo grau pediátricos inclui a melhor ressecção cirúrgica possível (mantendo ao máximo a função), seguimento de perto de todos os pacientes com doença residual (independente da quantidade), aguardar a progressão para indicar terapia adjuvante (mesmo quando doença residual), evitar radioterapia em menores de 5 anos e portadores de NF-1 através do uso de quimioterapia (TPCV um pouco superior a carboplatina-vincristina) e tratar com radioterapia lesões progressivas após cirurgia e/ou quimioterapia. Infelizmente, mesmo com essa abordagem baseada em evidência, uma quantidade significativa de pacientes terá doença progressiva apesar da melhor terapia, mostrando que a idéia geral de que os gliomas de baixo grau pediátricos são “benignos” deve ser revista e que ainda é necessário definir subgrupos de risco.

### 2.1.2 O panorama molecular dos gliomas de baixo grau

Até 2016, a classificação dos tumores do sistema nervoso central agregava o conhecimento anátomo-patológico e clínico acumulado em 130 anos de neuropatologia desde o trabalho pioneiro de Santiago de Ramón y Cajal [26]. Neste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou a revisão de sua quarta edição da Classificação dos Tumores do Sistema Nervoso Central [27]. Pela primeira vez, a classificação

incluiu dados moleculares oriundos de estudos genômicos empreendidos nos últimos 15 anos, desde a conclusão do Projeto Genoma Humano. Dessa forma, o conhecimento sobre as alterações moleculares mais frequentes em gliomas de baixo grau foram agregadas à avaliação clínico-patológica destes tumores, com valor prognóstico já demonstrado. Este novo conhecimento ainda não originou mudanças na prática clínica, tanto em termos de estratificação de grupos de risco, quanto em relação à terapia. No entanto, isso será somente questão de tempo.

## **2.2 Tumores embrionários**



---

## Referências Bibliográficas

---

- [1] Quinn T. Ostrom, Haley Gittleman, Peter Liao, Chaturia Rouse, Yanwen Chen, Jacqueline Dowling, Yingli Wolinsky, Carol Kruchko, and Jill Barnholtz-Sloan. Cbtrus statistical report: Primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the united states in 2007–2011. *Neuro-Oncology*, 16(suppl 4):iv1–iv63, 2014.
- [2] Rafael Peris-Bonet, Carmen Martínez-García, Brigitte Lacour, Svetlana Petrovich, Begoña Giner-Ripoll, Aurora Navajas, and Eva Steliarova-Foucher. Childhood central nervous system tumours – incidence and survival in europe (1978–1997): Report from automated childhood cancer information system project. *European Journal of Cancer*, 42(13):2064–2080, 2006.
- [3] Tai-Tong Wong, Donald M. Ho, Kai-Ping Chang, Sang-Hue Yen, Wan-You Guo, Feng-Chi Chang, Muh-Lii Liang, Hung-Chi Pan, and Wen-Yuh Chung. Primary pediatric brain tumors. *Cancer*, 104(10):2156–2167, 2005.
- [4] Beatriz de Camargo, Marceli de Oliveira Santos, Marise Souto Rebelo, Rejane de Souza Reis, Sima Ferman, Claudio Pompeaino Noronha, and Maria S. Pombo-de Oliveira. Cancer incidence among children and adolescents in brazil: First report of 14 population-based cancer registries. *International Journal of Cancer*, 126(3):715–720, 2010.
- [5] Gregory Gan and Daphne Haas-Kogan. Low-grade gliomas. In Nalin Gupta, Anuradha Banerjee, and Daphne Haas-Kogan, editors, *Pediatric CNS Tumors*, Pediatric Oncology, pages 1–35. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
- [6] Sonia Partap and PaulGraham Fisher. Embryonal tumors. In Nalin Gupta, Anuradha Banerjee, and Daphne Haas-Kogan, editors, *Pediatric CNS Tumors*, Pediatric Oncology, pages 89–114. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
- [7] Thomas E Merchant, Ian F Pollack, and Jay S Loeffler. Brain tumors across the age spectrum: Biology, therapy, and late effects. *Seminars in Radiation Oncology*, 20(1):58–66, 2010.
- [8] Orlandira L Araujo, Karinne M Trindade, Nadia M Trompieri, Juvenia B Fontenele, and Francisco Helder C Felix. Analysis of survival and prognostic factors of pediatric patients with brain tumor. *Jornal de Pediatria (Rio J)*, 87(5):425–432, 2011.

- [9] Jeremy Howick, Iain (on behalf of the James Lind Library) Chalmers, Paul Glasziou, Trish Greenhalgh, Carl Heneghan, Alessandro Liberati, Ivan Moschetti, Bob Phillips, Hazel Thornton, Olive Goddard, and Mary Hodgkinson. The Oxford 2011 Levels of Evidence. Technical report, Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, 2011. <http://www.cebm.net/index.aspx?o=5653>.
- [10] Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. <http://bit.ly/1rrj62P>, 2014. Acessado: 26-12-2014.
- [11] Anuário Estatístico do Ceará 2013. <http://bit.ly/1wt5ZtA>, 2013. Acessado: 26-12-2014.
- [12] Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Coordenação de Prevenção e Vigilância de Câncer. *Câncer da criança e adolescente no Brasil: dados dos registros de base populacional e de mortalidade*. INCA, 2008.
- [13] Eva Steliarova-Foucher, Charles Stiller, Brigitte Lacour, and Peter Kaatsch. International classification of childhood cancer, third edition. *Cancer*, 103(7):1457–1467, 2005.
- [14] David N. Louis, Hiroko Ohgaki, Otmar D. Wiestler, Webster K. Cavenee, Peter C. Burger, Anne Jouvett, Bernd W. Scheithauer, and Paul Kleihues. The 2007 who classification of tumours of the central nervous system. *Acta Neuropathologica*, 114(2):97–109, 2007.
- [15] Jeffrey H Wisoff, Robert A Sanford, Linda A Heier, Richard Sposto, Peter C Burger, Allan J Yates, Emiko J Holmes, and Larry E Kun. Primary neurosurgery for pediatric low-grade gliomas: A prospective multi-institutional study from the children’s oncology group. *Neurosurgery*, 68(6), 2011.
- [16] Thomas E. Merchant, Larry E. Kun, Shengjie Wu, Xiaoping Xiong, Robert A. Sanford, and Frederick A. Boop. Phase ii trial of conformal radiation therapy for pediatric low-grade glioma. *Journal of Clinical Oncology*, 27(22):3598–3604, 2009.
- [17] Thomas E. Merchant, Heather M. Conklin, Shengjie Wu, Robert H. Lustig, and Xiaoping Xiong. Late effects of conformal radiation therapy for pediatric patients with low-grade glioma: Prospective evaluation of cognitive, endocrine, and hearing deficits. *Journal of Clinical Oncology*, 27(22):3691–3697, 2009.
- [18] Roger J. Packer, Joanne Ater, Jeffrey Allen, Peter Phillips, Russell Geyer, H. Stacy Nicholson, Regina Jakacki, Elizabeth Kurczynski, Michael Needle, Jonathan Finlay, Gregory Reaman, and James M. Boyett. Carboplatin and vincristine chemotherapy for children with newly diagnosed progressive low-grade gliomas. *Journal of Neurosurgery*, 86(5):747–754, 1997. PMID: 9126887.
- [19] A K Gnekow, R-D Kortmann, T Pietsch, and A Emser. Low grade chiasmatic-hypothalamic glioma- carboplatin and vincristin chemotherapy effectively defers radiotherapy within a comprehensive treatment strategy – report from the multicenter treatment study for children and adolescents with a low grade glioma – hit-lgg 1996 – of the society of pediatric oncology and hematology (gpoh). *Klin Padiatr*, 216(6):331–342, Nov-Dec 2004.
- [20] M D Prados, M S Edwards, J Rabbitt, K Lamborn, R L Davis, and V A Levin. Treatment of pediatric low-grade gliomas with a nitrosourea-based multiagent chemotherapy regimen. *J Neurooncol*, 32(3):235–241, May 1997.

- [21] Maura Massimino, Filippo Spreafico, Graziella Cefalo, Riccardo Riccardi, John David Tesoro-Tess, Lorenza Gandola, Daria Riva, Antonio Ruggiero, Laura Valentini, Elena Mazza, Lorenzo Genitori, Concezio Di Rocco, Piera Navarria, Michela Casanova, Andrea Ferrari, Roberto Luksch, Monica Terenziani, Maria Rosa Balestrini, Cesare Colosimo, and Franca Fossati-Bellani. High response rate to cisplatin/etoposide regimen in childhood low-grade glioma. *J Clin Oncol*, 20(20):4209–4216, Oct 2002.
- [22] H S Friedman, J P Krischer, P Burger, W J Oakes, B Hockenberger, M D Weiner, J M Falletta, D Norris, A H Ragab, and D H Jr Mahoney. Treatment of children with progressive or recurrent brain tumors with carboplatin or iproplatin: a pediatric oncology group randomized phase ii study. *J Clin Oncol*, 10(2):249–256, Feb 1992.
- [23] Astrid Gnekow, Jutta Scheiderbauer, Thorsten Pietsch, Niels Soerensen, Andreas Faldum, Angela Emser, Stephan von Hornstein, Monika Warmuth-Metz, and Joachim Kuehl. HIT-LGG 1996 – Success of a countrywide, comprehensive treatment strategy for children and adolescent with low grade glioma of all histologies and locations. *Pediatric Blood & Cancer*, 45(4):465, 2005.
- [24] Astrid K. Gnekow, Fabian Falkenstein, David Walker, Giorgio Perilongo, Sue Picton, Jacques Grill, Rolf-Dieter Kortmann, Tore Stokland, Antoinette Schouten van Meeteren, Irene Slavc, Andreas Faldum, and Gian Luca de Salvo. SIOP-LGG 2004 - Cohort description of a comprehensive treatment strategy for low grade glioma in children and adolescents including a randomised chemotherapy trial and a radiotherapy trial. *Neuro-Oncology*, 14(suppl 1):i74, 2012.
- [25] Joann L. Ater, Tianni Zhou, Emiko Holmes, Claire M. Mazewski, Timothy N. Booth, David R. Freyer, Ken H. Lazarus, Roger J. Packer, Michael Prados, Richard Sposto, Gilbert Vezina, Jeffrey H. Wisoff, and Ian F. Pollack. Randomized study of two chemotherapy regimens for treatment of low-grade glioma in young children: A report from the children’s oncology group. *Journal of Clinical Oncology*, 30(21):2641–2647, 2012.
- [26] J.M.L. Piñero. *Santiago Ramón y Cajal*:. Biografías (Universidad de Valencia). Editorial UOC, 2014.
- [27] David N. Louis, Arie Perry, Guido Reifenberger, Andreas von Deimling, Dominique Figarella-Branger, Webster K. Cavenee, Hiroko Ohgaki, Otmar D. Wiestler, Paul Kleihues, and David W. Ellison. The 2016 world health organization classification of tumors of the central nervous system: a summary. *Acta Neuropathologica*, 131(6):803–820, Jun 2016.



---

## Esquemas de tratamento

---

### 3.1 Introdução

No Centro Pediátrico do Câncer do Hospital Infantil Albert Sabin, utilizamos um total de 16 (dezesesseis) protocolos de tratamento farmacológico para tumores cerebrais em crianças e adolescentes, baseados na literatura que foi citada neste manual. Estes protocolos foram adaptados a partir dos racionais dos ensaios clínicos descritos, com modificações pertinentes à realidade e disponibilidade de recursos em nosso serviço hospitalar. Além disso, quaisquer conclusões oriundas dos resultados destes ensaios clínicos, bem como informações de outros trabalhos e de outras fontes, foram usadas para adaptar os esquemas de tratamento à luz da melhor evidência disponível no momento em que este manual foi escrito. Alguns dos ensaios clínicos utilizados como modelo para parametrizar nossos protocolos ainda estão em andamento. Neste caso, apenas a parte não randomizada, não experimental dos esquemas foi adaptada e utilizada, mas não os braços de tratamento experimental ou não comprovado por evidências científicas.

Pacientes com condições patológicas que não têm nenhum tratamento amplamente aceito, ou sobre as quais recaem controvérsias importantes quanto à terapêutica, não poderão ser tratados com os protocolos principais descritos, mas poderão entrar, mediante consentimento informado, em esquemas de tratamento *off-label* (não padronizado). Estes esquemas incluem aqueles sobre os quais a evidência científica presente é inconclusiva ou preliminar. Tratamentos baseados em trabalhos observacionais, ensaios clínicos fase I ou II com número limitado de pacientes estão nesta condição. Os resultados favoráveis de ensaios fase II que tenham recrutado maior número de pacientes, mesmo que não randomizado, poderão servir de base para o tratamento de pacientes entre os protocolos principais, em vista da falta de evidências científicas de qualidade maior, como ficou exposto no texto deste manual.

### 3.2 O que são estes protocolos

Protocolo aqui significa um esquema de tratamento baseado em um ensaio clínico patrocinado por grandes grupos cooperativos de tratamento do câncer infantil. Nenhum destes protocolos inclui o texto completo ou trechos dos protocolos originais de pesquisa. Os pacientes tratados em nosso centro seguindo estes protocolos não estão sendo recrutados para pesquisa clínica. Estes protocolos também não constituem diretrizes terapêuticas, nem protocolos clínicos no sentido estrito, pois não foram elaborados por instituições ou grupos organizados, usando metodologia explícita. Nossos protocolos podem ser encarados como rotinas

de manuseio dos pacientes e suas patologias, utilizados em nosso serviço hospitalar e baseados em ensaios clínicos dos grande grupos cooperativos.

Este manuscrito não necessariamente representa os pontos de vista ou é endossado pelo Hospital Infantil Albert Sabin ou pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, sendo de iniciativa do responsável pela sua elaboração.

Apesar de tratados conforme os racionais de ensaios clínicos conhecidos, os pacientes não estão sendo recrutados para pesquisa, e isso é deixado claro antes do início do tratamento. Quaisquer esquemas alternativos de tratamento aceitáveis do ponto de vista de chances de sucesso e risco de efeitos adversos são informados aos responsáveis pelos pacientes. Estes podem escolher livremente entre os protocolos principais ou tratamentos alternativos aceitáveis.

### 3.3 Como utilizar estes protocolos

Este manuscrito tem fins educativos e é voltado para falantes da língua portuguesa. Embora este documento seja usado pelo responsável deste projeto como rotina de tratamento dos seus pacientes, o autor não pode responsabilizar-se pelo seu uso em outros locais e para o tratamento de outros pacientes, que não aqueles sob sua estrita supervisão. Os procedimentos e doses de medicamentos descritos no documento são no máximo possível fiéis ao empregado na literatura científica utilizada. No entanto, o autor não pode se responsabilizar por estas doses e seu uso, incluindo o manuseio não criterioso por profissional não habilitado para prescrever e administrar tais medicamentos. Apenas médicos registrados de acordo com a legislação vigente em seu país e devidamente habilitados por sociedades de cancerologia (hemato-oncologia) pediátrica devem usar este documento, em parte, ou no todo, e segundo seu juízo, para o tratamento de pacientes. Neste caso, o autor isenta-se de responsabilidade legal sobre quaisquer resultados, incluindo complicações, eventos adversos, prejuízos ou custos, advindos do uso deste documento, ou parte dele, por qualquer outro que não ele mesmo. Ao obter este documento a partir deste projeto, o usuário dele (o documento) está tacitamente concordando com estes e outros termos explicitados aqui.

### 3.4 Formato e contribuições

Nas páginas que se seguem, apresentamos as folhas de acompanhamento ambulatorial dos pacientes que estão em tratamento quimioterápico em nosso serviço hospitalar. Estas folhas são anexadas a cada prontuário do paciente e são preenchidas de acordo com o andamento do tratamento, anotando doses administradas, principais complicações, atrasos, modificações de doses, atualização de informações, entre outros dados. As versões aqui mostradas são as mais atuais quando da publicação deste manual.

O manual foi escrito em LaTeX, usando ShareLatex e programas para desktop (Texmaker). Todo o código do projeto está disponível num repositório público do GitHub, que pode ser acessado neste endereço: <https://github.com/fhcflx/cpc-neuro.git>. O arquivo \*.tex contém o código correspondente. Contribuições são bem-vindas. Visite o repositório ou a página do projeto em <https://fhcflx.github.io/cp>. Se você ainda não tem uma conta no GitHub (gratuita), inscreva-se, abra uma pendência (*issue*) ou faça uma cópia (*fork*), modifique o que achar necessário e peça para integrar (*pull request*) suas mudanças ao projeto.

*Apêndice A*

---

## **Protocolos principais**

---





## A.1 GLIOMA DE BAIXO GRAU – Adaptado do ensaio COG-A9952

**Racional:** no estudo fase III do COG, a QT possibilitou adiar a RT em pacientes com gliomas de baixo grau recorrentes ou progressivos.<sup>1</sup> Dois esquemas foram comparados: o TPCV, mais antigo, e carboplatina-vincristina. Embora o esquema TPCV tenha mostrado resultados algo superiores (não estatisticamente significantes), o segundo esquema ainda é o preferido pelo menor risco de efeitos a longo prazo.

**Elegível:** pacientes com menos de 12 anos ou portadores de NF-1, com astrocitoma de baixo grau (pilocítico, difuso, outros), oligodendroglioma, ganglioglioma, tumores mistos (oligoastrocitomas, outros), tumores de vias ópticas/hipotálamo (imagem típica, mesmo sem biópsia). Incluir tumores focais de tronco, excluir DIPG, ou tumores difusos de linha média H3K27M+. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** a conduta expectante é uma opção, uma vez que, via de regra, o crescimento destes tumores é lento e sua progressão demora anos, ou mesmo décadas. Pacientes de maior risco, como aqueles com lesões de vias ópticas ou hipotálamo, síndrome diencefálica ou com lesões de crescimento rápido devem ser tratados sem grande demora. Se possível, uma nova ressecção cirúrgica deve ser avaliada. O tratamento com vimblastina semanal também pode ser usado como primeira linha. A principal alternativa adjuvante para pacientes com mais de 5 anos e sem NF-1 é a RT local. Pacientes com astrocitomas difusos têm maior risco de transformação maligna após RT.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### A.1.1 Indução: 10 semanas

Exames:	Neut(> $1,5 \times 10^3$ ):	Pla(> $10^5$ ):	TGO:
<b>D1</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D8</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D15</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D22</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> $1,5 \times 10^3$ ):	Pla(> $10^5$ ):	TGO:

<sup>1</sup>Ater *et al*, 2012  
Versão Outubro/2017

<b>D29</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D36</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D43</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D50</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D57</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D64</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica

**Intervalo de 21 dias.**

#### **A.1.2 Manutenção: 48 semanas (08 blocos de 6 semanas)**

<b>D85</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D92</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D99</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D106</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica

**Intervalo de 21 dias.**

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

<b>D127</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D134</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
---------	----------------------------------	--------------------------	------

<b>D141</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D148</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	-----------------------------------	--	---------

**Intervalo de 21 dias.**

<b>D169</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D176</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
---------	----------------------------------	--------------------------	------

<b>D183</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D190</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	-----------------------------------	--	---------

**Intervalo de 21 dias.**

<b>D211</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D218</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D225</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D232</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica

**Intervalo de 21 dias.**

<b>D253</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D260</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D267</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D274</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica

**Intervalo de 21 dias.**

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

<b>D295</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D302</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
---------	----------------------------------	---------------------------	------

<b>D309</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D316</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	-----------------------------------	--	---------

**Intervalo de 21 dias.**

<b>D337</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D344</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
---------	----------------------------------	---------------------------	------

<b>D351</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D358</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	-----------------------------------	--	---------

**Intervalo de 21 dias.**

<b>D379</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D386</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D393</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup> Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D400</b>	Carboplatina 175mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica

***Final de Protocolo***  
**Solicitar imagem (RNM)**

### **A.1.3 Modificações de dose:**

Iniciar a manutenção se Neut > 1000/mm<sup>3</sup> e Plaq > 100 mil/mm<sup>3</sup>. Adiar ciclo 1 semana se Neut < 500mm<sup>3</sup> ou Plaq > 50 mil/mm<sup>3</sup>. Qualquer paciente com febre ou neutropenia e/ ou infecção localizada terão tratamento in- terrompido até que estas complicações sejam resolvidas. Para os pacientes com mais do que um atraso de 2 semanas de tratamento, associados com sepse, neutropenia ou uma contagem de plaquetas inferior a 20000, a próxima dose de carboplatina será diminuída em 50%. Para aqueles pacientes que desenvolverem neurotoxicidade significativa relacionada à vincristina (queda do pé, íleo), a administração de vincristina será suspensa até que haja evidência de melhora neurológica e a próxima dose de vincristina será reduzida em 50%.

**ATENÇÃO:** o objetivo deste protocolo é ADIAR O USO DA RT até a criança atingir uma idade onde os efeitos adversos da radiação sejam reduzidos. A principal resposta deste protocolo é ESTABILIZAÇÃO DA DOENÇA. Logo, é inadequado iniciar este esquema de QT em crianças em regime de internação prolongada, dependentes de cuidados hospitalares, visando "melhorar" sua condição clínica. Igualmente, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.

## A.2 GLIOMA DE BAIXO GRAU: TRATAMENTO ALTERNATIVO DE PRIMEIRA LINHA, SEGUNDA LINHA NA CONTRA-INDICAÇÃO AO USO DA CARBOPLATINA OU RECORRÊNCIA APÓS TRATAMENTO

**Racional:** num estudo piloto de 2003, o grupo de Eric Bouffet mostrou a viabilidade e boa resposta do uso de vimblastina semanal em pacientes com reação à carboplatina. No estudo fase II do The Hospital for Sick Children, a vimblastina foi eficaz em induzir remissão parcial ou completa em 36% de 51 pacientes com gliomas de baixo grau recorrentes ou progressivos, após esquemas prévios de quimioterapia e/ou radioterapia <sup>2</sup>. Um estudo fase II que incluiu 54 pacientes com gliomas de baixo grau progressivos usou a vimblastina como primeira linha, mostrando resultados aparentemente semelhantes a outros estudos (como o COG-A9952) <sup>3</sup>.

**Elegível:** astrocitoma de baixo grau (pilocítico, difuso, outros), oligodendroglioma, ganglioglioma, tumores mistos (oligoastrocitomas, outros), tumores de vias ópticas/hipotálamo (imagem típica, mesmo sem biópsia). Incluir tumores focais de tronco, excluir DIPG, ou tumores difusos de linha média H3K27M+. Pacientes com reação ou contra-indicação ao uso de carboplatina; doença recorrente após prévio tratamento com quimioterapia e/ou radioterapia. Alternativa como primeira linha de tratamento. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** a conduta expectante é uma opção, uma vez que, via de regra, o crescimento destes tumores é lento e sua progressão demora anos, ou mesmo décadas. Pacientes de maior risco, como aqueles com lesões de vias ópticas ou hipotálamo, síndrome diencefálica ou com lesões de crescimento rápido devem ser tratados sem grande demora. Se possível, uma nova ressecção cirúrgica deve ser avaliada. O protocolo baseado no estudo COG-A9952 (carboplatina e vincristina) pode ser usado como primeira linha. A principal alternativa adjuvante para pacientes com mais de 5 anos e sem NF-1 é a RT local. Pacientes com astrocitomas difusos têm maior risco de transformação maligna após RT.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### A.2.1 Quimioterapia adjuvante: 52 semanas ou 1 ano

<b>D1</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D8</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	

Versão Outubro/2017

<sup>2</sup>Lafay-Cousin *et al*, 2003; Bouffet *et al*, 2012

<sup>3</sup>Lassaletta *et al*, 2016

<b>D15</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D22</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D29</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D36</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D43</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D50</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D57</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D64</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D71</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D78</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D85</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D92</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica



Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

<b>D99</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
------------	--	--	---------

<b>D106</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	--	--	---------

<b>D113</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	--	--	---------

Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
---------	----------------------------------	---------------------------	------

<b>D120</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	--	--	---------

<b>D127</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	--	--	---------

<b>D134</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	--	--	---------

<b>D141</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	--	--	---------

Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
---------	----------------------------------	---------------------------	------

<b>D148</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	--	--	---------

<b>D155</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	--	--	---------

<b>D162</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	--	--	---------

<b>D169</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D176</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D183</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D190</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D197</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D204</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D211</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D218</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>225</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D232</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D239</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D246</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

<b>D253</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

<b>D260</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D267</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D274</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D281</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

<b>D288</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D295</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D302</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D309</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

<b>D316</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D323</b>	Vimblastina 6,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-------------	---	--	---------

<b>D330</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D337</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D344</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D351</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D358</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D365</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

***Final de Protocolo***  
**Solicitar imagem (RNM)**

### **A.2.2 Modificações de dose:**

Se  $750 \geq \text{Neut} \geq 500/\text{mm}^3$ , reduzir dose para  $5\text{mg}/\text{m}^2$ . Se  $\text{Neut} < 500/\text{mm}^3$ , interromper até subir para 750 ou mais. Se toxicidade hematológica recorrente, reduzir dose para  $4\text{mg}/\text{m}^2$ .

**ATENÇÃO:** o objetivo deste protocolo é ADIAR O USO DA RT (se não tiver sido feita) até a criança atingir uma idade onde os efeitos adversos da radiação sejam reduzidos, ou controlar doença recidivada após a RT. A principal resposta deste protocolo é ESTABILIZAÇÃO DA DOENÇA. Logo, é inadequado iniciar este esquema de QT em crianças em regime de internação prolongada, dependentes de cuidados hospitalares, visando "melhorar" sua condição clínica. Igualmente, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.

### A.3 MEDULOBLASTOMA - RISCO PADRÃO – Adaptado dos ensaios CCG-9961 e ACNS0331

**Racional:** no estudo do COG, a QT possibilitou a redução da dose da RT para o neuro-eixo para 2340 cGy, com *boost* para o sítio tumoral completando 54 Gy de dose total<sup>4</sup>. O COG está testando agora uma nova redução da RT, com o ensaio fase III ACNS0331. O COG fez modificações na manutenção do protocolo. Utilizamos o esquema de QT segundo o braço controle do ensaio ACNS0331, derivado do CCG-9961.

**Elegível:** apenas meduloblastoma (fossa posterior), com menos de 1,5cm<sup>2</sup> de tumor residual (RNM de controle até 21 dias pós-op, preferido 72h após); sem metástases (RNM de neuro-eixo e PL/MO); excluir tumores com anaplasia ou positivos para N-MYC/C-MYC. Tratamento precisa iniciar até 31 dias após cirurgia. Excluir pacientes com menos de 3 anos. **NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.**

**Alternativa:** a principal alternativa é a RT para neuro-eixo sem redução de dose (36 Gy) com boost para a fossa posterior de 18-20 Gy, completando 54-56 Gy de dose total. Essa estratégia, na ausência de QT adjuvante, é capaz de evitar recidivas em pacientes de risco padrão.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

#### A.3.1 Radioquimioterapia: 7 semanas (43 dias)

SEMANA 1					
Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
D1		1, 8 Gy		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	
D2		1, 8 Gy			
D3		1, 8 Gy			
D4		1, 8 Gy			
D5		1, 8 Gy			
Exames	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

**SEMANA 2**

Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D8</b>		1, 8 Gy		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	
<b>D9</b>		1, 8 Gy			
<b>D10</b>		1, 8 Gy			
<b>D11</b>		1, 8 Gy			
<b>D12</b>		1, 8 Gy			
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Pla ( $> 7,5 \times 10^4$ ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

**SEMANA 3**

Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D15</b>		1, 8 Gy		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	
<b>D16</b>		1, 8 Gy			
<b>D17</b>		1, 8 Gy			
<b>D18</b>		1, 8 Gy			
<b>D19</b>		1, 8 Gy			
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Pla ( $> 7,5 \times 10^4$ ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

**SEMANA 4**

Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D22</b>		1, 8 Gy		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	
<b>D23</b>		1, 8 Gy			
<b>D24</b>		1, 8 Gy			
<b>D25</b>	1, 8 Gy				
<b>D26</b>	1, 8 Gy				
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Pla ( $> 7,5 \times 10^4$ ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

#### SEMANA 5

Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D29</b>	1, 8 Gy			Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	
<b>D30</b>	1, 8 Gy				
<b>D31</b>	1, 8 Gy				
<b>D32</b>	1, 8 Gy				
<b>D33</b>	1, 8 Gy				
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7, 5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7, 5 \times 10^4$ ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

#### SEMANA 6

Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D36</b>	1, 8 Gy			Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	
<b>D37</b>	1, 8 Gy				
<b>D38</b>	1, 8 Gy				
<b>D39</b>	1, 8 Gy				
<b>D40</b>	1, 8 Gy				
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7, 5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7, 5 \times 10^4$ ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

#### SEMANA 7

Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D43</b>	1, 8 Gy			Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7, 5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7, 5 \times 10^4$ ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

#### Intervalo de 28 dias

Máximo de 8 doses de VCR, máximo de 20 dias recebendo RT cranioespinhal, máximo de 51 dias de RT no total

### A.3.2 Manutenção: 04 ciclos A e 04 ciclos B

CICLO A				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D71</b>	Cisplatina 75 mg/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D72</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			

<b>D78</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>D85</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	

#### Intervalo de 28 dias

CICLO B				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D113</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D114</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			

<b>D120</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
-------------	--	--	-----------------	--

#### Intervalo de 21 dias

CICLO A				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D141</b>	Cisplatina 75 mg/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D142</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			

<b>D148</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
-------------	--	--	-----------------	--

<b>D155</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
-------------	--	--	-----------------	--



Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

**Intervalo de 28 dias**

<b>CICLO B</b>				
<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D183</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D184</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			
<b>D190</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 21 dias**

<b>CICLO A</b>				
<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D211</b>	Cisplatina 75 mg/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D212</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			
<b>D218</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>D225</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 28 dias**

<b>CICLO B</b>				
<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D253</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D254</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			
<b>D260</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 21 dias**

<b>CICLO A</b>				
<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D281</b>	Cisplatina 75 mg/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D282</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			
<b>D288</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>D295</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 28 dias**

<b>CICLO B</b>				
<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D323</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D324</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 10 <sup>3</sup> ):		Plaq (> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			
<b>D330</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	

**FIM DE PROTOCOLO**

**A.3.3 Modificações de dose:**

Se tiver que adiar a CTX por neutropenia, reduzir em 50% a dose, mesmo após recuperação. Toxicidade grau 3-4 pela VCR, suspender dose seguinte. Reiniciar com dose normal. Recorrência: reduzir dose. Se ocorrer redução de 20dB ou mais em frequências auditivas baixas (500-2000Hz), reduzir CDDP em 50%. Se ocorrer redução de 30dB na faixa de 4000-8000 Hz), reduzir CDDP em 50%. Ototoxicidade grau IV: interromper CDDP até nível de lesão retornar ao grau II.

**Avaliação:** imagem a cada 3 ciclos (3 meses), se progressão, interromper protocolo.

**ATENÇÃO:** o objetivo deste protocolo é REDUZIR A DOSE DA RT PARA O NEURO-EIXO, visando reduzir os efeitos adversos da radiação, sem aumentar a taxa de recidiva. Logo, é inadequado iniciar este esquema de QT em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.

## A.4 TUMORES MALIGNOS DO SNC EM MENORES DE 3 ANOS – Adaptado do ensaio CCG 9921

**Racional:** no estudo do COG, a QT foi capaz de adiar e até tornar desnecessária a RT. Essa tem sido a principal estratégia de tratamento na maioria dos ensaios clínicos em crianças com esse perfil<sup>5</sup>. Pacientes com sPNET e ATRT têm prognóstico bem inferior que os outros.

**Elegível:** gliomas de alto grau, ependimoma, tumores embrionários, tumores de células germinativas. Independente se metástase. Estadiamento: citologia LCR e imagem do neuro-eixo (RNM) para ependimomas e tumores embrionários (meduloblastoma, PNET, ATRT, pineoblastoma, outros); marcadores para TCG. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** não existe tratamento padrão para crianças menores de 3 anos com tumores cerebrais malignos. Os pacientes com ressecção incompleta têm um prognóstico insatisfatório e sobrevida livre de progressão prolongada reduzida.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### A.4.1 Indução: 5 ciclos (VCEC)

Ciclo 1						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
1		Vincristina 0,05 mg/kg	$> 10^3/mm^3$	$> 10^5/mm^3$	( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		Cisplatina 3,5mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
2		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1$ e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
3		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1$ e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
4-13		G-CSF 5 $\mu$ g/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
8		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
15		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 2						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
22		Vincristina 0,05 mg/kg	$> 10^3/mm^3$	$> 10^5/mm^3$	( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		Cisplatina 3,5 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
23		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1 e 5h$			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
24		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1 e 5h$			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
25-34		G-CSF 5 $\mu$ g/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
29		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
36		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 3						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
43		Vincristina 0,05 mg/kg	$> 10^3/mm^3$	$> 10^5/mm^3$	( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		Cisplatina 3,5 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
44		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1 e 5h$			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
45		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1 e 5h$			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
46-55		G-CSF 5 $\mu$ g/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
50		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
57		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

Ciclo 4

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
64		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		Cisplatina 3,5 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
65		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia × 0,1 e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
66		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia × 0,1 e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
67-76		G-CSF 5µg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 5

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
85		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		Cisplatina 3,5 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
86		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia × 0,1 e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
87		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia × 0,1 e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
88-97		G-CSF 5µg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

**REAVALIAR**

**Menos de 36 meses de idade ao terminar indução:** Sem doença residual – ir para manutenção. Doença residual: considerar *second look surgery*.

**Mais de 36 meses de idade ao terminar a indução:** Sem doença residual, nem metástase – manutenção. Doença residual/metástase – RT antes da manutenção. Reiniciar QT 4 semanas após o fim da RT e completar a manutenção.

#### A.4.2 Manutenção: 08 ciclos

Ciclo 1						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
1		Carboplatina 10 mg/kg	$> 10^3$	$> 10^5$	( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 0,05 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
2		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
8		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
15		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
22		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
29		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1$ e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
30		Etoposido 1,5 mg/kg/dia)			( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 2						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
50		Carboplatina 10 mg/kg	$> 10^3$	$> 10^5$	( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 0,05 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
51		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
57		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
64		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
71		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
78		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1$ e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
79		Etoposido 1,5 mg/kg/dia)			( ) Sim ( ) Não	

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

Ciclo 3						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
99		Carboplatina 10 mg/kg	$> 10^3$	$> 10^5$	( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 0,05 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
100		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
106		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
113		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
120		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
127		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1$ e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
128		Etoposido 1,5 mg/kg/dia)			( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 4						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
148		Carboplatina 10 mg/kg	$> 10^3$	$> 10^5$	( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 0,05 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
149		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
155		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
162		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
169		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
176		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1$ e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
177		Etoposido 1,5 mg/kg/dia)			( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 5						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
197		Carboplatina 10 mg/kg	$> 10^3$	$> 10^5$	( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 0,05 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
198		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
204		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
211		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
218		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
225		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1$ e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
226		Etoposido 1,5 mg/kg/dia)			( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 6						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
246		Carboplatina 10 mg/kg	$> 10^3$	$> 10^5$	( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 0,05 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
247		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
253		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
260		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
267		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
274		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1$ e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
275		Etoposido 1,5 mg/kg/dia)			( ) Sim ( ) Não	



Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

Ciclo 7

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
295		Carboplatina 10 mg/kg	$> 10^3$	$> 10^5$	( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 0,05 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
296		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
302		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
309		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
316		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
323		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1$ e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
324		Etoposido 1,5 mg/kg/dia)			( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 8

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
344		Carboplatina 10 mg/kg	$> 10^3$	$> 10^5$	( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 0,05 mg/kg			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
345		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
351		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
358		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	
365		Vincristina 0,05 mg/kg		( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
372		Ciclofosfamida 55 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 55 mg/kg/dia $\times 0,1$ e 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 1,5 mg/kg/dia			( ) Sim ( ) Não	
373		Etoposido 1,5 mg/kg/dia)			( ) Sim ( ) Não	

***Reavaliar com imagem – Re-operação se possível***  
***Encaminhar para Radioterapia***  
***Final de Protocolo***

#### **A.4.3 Modificações de dose:**

Adiar se  $L < 1000/\text{mm}^3$  ou  $P < 100000/\text{mm}^3$ . Se atraso maior que 7 dias, reduzir dose de ciclofosfamida em 20%. Toxicidade grau 3-4 pela VCR, suspender dose seguinte. Reiniciar com dose normal. Recorrência: reduzir dose. Bilirrubina total de 1,5-1,9 mg/dl, reduzir VCR para 1,0 mg/m<sup>2</sup>; se bilirrubina  $> 1,9$  mg/dl, suspender uma dose de VCR.

G-CSF: se ocorrer atraso maior que 1 semana no início do próximo ciclo, fazer G-CSF imediatamente após a droga que causou neutropenia. Se ocorrer infecção grave com neutropenia, tratar a infecção e iniciar G-CSF imediatamente e fazer no próximo ciclo. Se novo episódio infeccioso ocorrer apesar de usar G-CSF, reduzir dose em 25% da droga causadora da neutropenia.

Se o clearance de creatinina  $< 50\%$  basal ou  $< 60$ , suspender CDDP. No ciclo seguinte, se exames normalizados, fazer 50% da dose de CDDP. Aumente novamente para 100% somente no terceiro ciclo, se exames mantiverem-se normais. Se ocorrer redução de 20dB ou mais em frequências auditivas baixas (500-2000Hz), reduzir carboplatina em 50%. Se ocorrer redução de 30dB na faixa de 4000-8000 Hz), reduzir carboplatina em 50%. Ototoxicidade grau IV: interromper carboplatina até nível de lesão retornar ao grau II.

**ATENÇÃO:** este protocolo é *off-label* (não padronizado) e não tem eficácia comprovada quando comparado com tratamento padrão sem QT. Dessa forma, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.

## A.5 EPENDIMOMA – Adaptado dos ensaios do COG e SIOP e de dados combinados da literatura

**Racional:** nos estudos do COG, os pacientes foram estratificados em 4 grupos <sup>6</sup>:

Estrato 1 - Paciente com endimomas clássicos supratentoriais com ressecção microscopicamente completa.

Estrato 2 - Pacientes com ressecção parcial.

Estrato 3 - Pacientes com ressecção total macroscópica ou subtotal (até 5 mm de tumor residual).

Estrato 4 - Pacientes com endimomas anaplásicos supratentoriais com ressecção total ou infratentoriais (qualquer histologia) com ressecção total.

Dados combinados da literatura Ramaswamy *et al*, 2016 confirmam o impacto da ressecção tumoral e da radioterapia no tratamento do endimoma, mas relativizam a importância do grau da OMS. Os resultados dos estudos do SIOP parecem indicar uma pequena influência da anaplasia no prognóstico, porém eles não levaram em conta os novos dados moleculares <sup>7</sup>. Até o momento, não existem dados comprovando a eficácia do uso rotineiro de QT adjuvante pré ou pós-RT. Além disso, os resultados do ensaio ACNS0121 parecem indicar que a RT não deve ser postergada após a cirurgia, nem mesmo para tentar a realização de *second-look surgery* para diminuir o tumor residual.

Assim, o principal tratamento para pacientes com endimoma mantém-se a ressecção mais ampla possível e RT logo em seguida, idealmente até 30 dias depois. Da mesma forma, os dados combinados da literatura sugerem que a dose de RT deve ser idealmente não menor que 59.4 Gy em crianças maiores que 3 anos <sup>8</sup>. Um consenso de conduta clínica baseado nas novas informações moleculares sugere o seguinte para pacientes com endimoma intracraniano <sup>9</sup>:

- 1 . O tratamento não deve se basear no grau histológico da OMS, exceto em ensaios clínicos.
- 2 . Endimomas supratentoriais e da fossa posterior são doenças molecularmente diferentes (mas isso não impacta na clínica ainda).
- 3 . Revisão central de imagens e histologia e estadiamento molecular devem ser componentes centrais em ensaios clínicos.
- 4 . O padrão de tratamento fora de ensaios clínicos é a máxima ressecção segura para o paciente, seguida de RT focal.

**Elegível:**Estadiamento pré-tratamento: até 0,5cm de tumor residual (RNM de controle até 21 dias pós-op, preferido 72h após); sem metástases (RNM de neuro-eixo e PL/MO). Tratamento precisa iniciar até 56 dias após cirurgia. Apenas EPENDIMOMA (excluindo espinhal). Pacientes com mais de 3 anos de idade. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** não existe esquema de QT amplamente aceito para tratar crianças com endimoma. O tratamento padrão é RT no leito tumoral. Os pacientes com ressecção incompleta têm um prognóstico insatisfatório e sobrevida livre de progressão prolongada reduzida.

---


Versão Outubro/2017

<sup>6</sup>Merchant *et al*, 2015

<sup>7</sup>Massimino *et al*, 2016

<sup>8</sup>Merchant *et al*, 2017

<sup>9</sup>Pajtler *et al*, 2017



---

## **Protocolos *off-label* (não padronizados)**

---



## B.1 PNET - ALTO RISCO – Adaptado dos ensaios COG-A99701 e ACNS0332 - protocolo *off-label*

**Racional:** no estudo piloto do COG<sup>1</sup>, a QT durante a RT possibilitou a melhora da sobrevida de pacientes com tumor residual ou metástase. O COG está testando agora essa estratégia no ensaio fase III ACNS0332. Não existe tratamento quimioterápico padrão para estes pacientes, porém os resultados do COG são os melhores publicados até o momento. Reforço deve ser feito também sobre as metástases espinhais, até 45Gy dose total acima do cone medular e 50,4 Gy abaixo dele. Reavaliar com imagens 4 semanas após terminar RT.

**Elegível:** meduloblastoma (fossa posterior) e PNET, com mais de 1,5cm<sup>2</sup> de tumor residual (RNM de controle até 21 dias pós-op, preferido 72h após); e/ou com metástases (RNM de neuro-eixo e PL/MO); incluir tumores com anaplasia ou positivos para N-MYC/C-MYC. Excluir pacientes com marcador INI-1 negativo ou menores de 3 anos. Tratamento precisa iniciar até 31 dias após cirurgia. **NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.**

**Alternativa:** não existe alternativa de QT amplamente aceita para este grupo de pacientes. Invariavelmente, os pacientes com doença metastática e fatores de risco molecular têm prognóstico insatisfatório, com reduzida sobrevida livre de progressão prolongada.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### B.1.1 Radioquimioterapia: 7 semanas (43 dias)

SEMANA 1					
Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
D1		1, 8 Gy		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
D2		1, 8 Gy		Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
D3		1, 8 Gy		Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
D4		1, 8 Gy		Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
D5		1, 8 Gy		Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
Exames	Neut (> 7, 5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

SEMANA 2					
Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D8</b>		1, 8 Gy		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D9</b>		1, 8 Gy		Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D10</b>		1, 8 Gy		Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D11</b>		1, 8 Gy		Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D12</b>		1, 8 Gy		Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Pla ( $> 7,5 \times 10^4$ ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

SEMANA 3					
Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D15</b>	1, 8 Gy			Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D16</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D17</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D18</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D19</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Pla ( $> 7,5 \times 10^4$ ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

SEMANA 4					
Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D22</b>	1, 8 Gy			Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D23</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D24</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D25</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D26</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Pla ( $> 7,5 \times 10^4$ ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		



Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

#### SEMANA 5

Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D29</b>	1, 8 Gy			Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D30</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D31</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D32</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D33</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>Exames</b>	Neut (> 7, 5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

#### SEMANA 6

Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D36</b>	1, 8 Gy			Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D37</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D38</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D39</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>D40</b>	1, 8 Gy			Carboplatina 35mg/m <sup>2</sup>	
<b>Exames</b>	Neut (> 7, 5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

#### SEMANA 7

Dia	Dose RT		Data	Quimioterapia	Rubrica
	Neuro-eixo	Fossa poster			
<b>D43</b>	1, 8 Gy			Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup>	
<b>Exames</b>	Neut (> 7, 5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):		
	BT(<1,9mg/dl):		BD(< 1, 5mg/dl):		

Intervalo de 42 dias

**B.1.2 Manutenção: 06 ciclos**

<b>CICLO 1</b>				
<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D85</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D86</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			

<b>D92</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
------------	--	--	-----------------	--

Intervalo de 21 dias

<b>CICLO 2</b>				
<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D113</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D114</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			

<b>D120</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
-------------	--	--	-----------------	--

Intervalo de 21 dias

<b>CICLO 3</b>				
<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>141</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D142</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			

<b>D148</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
-------------	--	--	-----------------	--

Intervalo de 21 dias

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

#### CICLO 4

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D169</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D170</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			

<b>D176</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
-------------	--	--	-----------------	--

#### Intervalo de 21 dias

#### CICLO 5

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D197</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D198</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			

<b>D204</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
-------------	--	--	-----------------	--

#### Intervalo de 21 dias

#### CICLO 6

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D225</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
<b>D226</b>	Ciclofosfamida 1,0 g/m <sup>2</sup> EV em 6h		( ) Sim ( ) Não	
	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut(> 10 <sup>3</sup> ):		Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	
	ClearCreat Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):			

<b>D232</b>	Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> , max 2 mg		( ) Sim ( ) Não	
-------------	--	--	-----------------	--

FIM DE PROTOCOLO

### **B.1.3 Modificações de dose:**

Se tiver que adiar a CTX por neutropenia, reduzir em 25% a dose, mesmo após recuperação. Toxicidade grau 3-4 pela VCR, suspender dose seguinte. Reiniciar com dose normal. Recorrência: reduzir dose.

**Avaliação:** imagem a cada 3 ciclos (3 meses), se progressão, interromper protocolo.

**ATENÇÃO:** este protocolo é *off-label* (não padronizado) e não tem eficácia comprovada. Dessa forma, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.

## B.2 GLIOMA DE ALTO GRAU E DIPG – Adaptado do ensaio ACNS0423 - protocolo *off-label*

**Racional:** no estudo do COG, a temozolomida (TMZ) associada à lomustina mostraram superioridade em relação ao controle histórico (ACNS0126)<sup>2</sup>. Deve-se levar em conta a disponibilidade e custo do esquema. Não foi realizada comparação com os dados do estudo CCG-945.

**Elegível:** extensão da ressecção cirúrgica (RNM de controle até 21 dias pós-op, preferido 72h após); não é necessário pesquisar metástases de rotina (RNM de neuro-eixo e PL/MO). Tratamento precisa iniciar até 42 dias após cirurgia. Inclui glioblastoma multiforme, astrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico, gliossarcoma, gliomas difusos de linha média H3K27M+ (DIPG). Pacientes com mais de 3 anos de idade. Somente iniciar o protocolo após a assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, conforme acordado. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** não existe esquema de QT amplamente aceito para tratar crianças com gliomas de alto grau, incluindo gliomas pontinos intrínsecos difusos (DIPG). O tratamento padrão é RT craniana. Os pacientes com mais de 3 anos têm um prognóstico insatisfatório e sobrevida mediana de pouco mais de 12 meses.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### B.2.1 Indução: 6 semanas (radioquimioterapia)

Semana	Dose	Data	Neut	Plaq	Administrado	Rubrica
1	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	
2	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	
3	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	
4	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	
5	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	
6	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	

Intervalo de 28 dias.

---

Versão Outubro/2017

<sup>2</sup>Jakacki *et al*, 2016

**B.2.2 Manutenção: 06 ciclos****CICLO 1**

<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D1</b>	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Lomustina 90 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 28 dias.****CICLO 2**

<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D1</b>	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Lomustina 90 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 28 dias.**

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### CICLO 3

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
D1	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Lomustina 90 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D2	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D3	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D4	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D5	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
Exames	Neut (> 7, 5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1, 5 vezes)		BT(< 1, 5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Intervalo de 28 dias.**

### CICLO 4

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
D1	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Lomustina 90 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D2	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D3	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D4	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D5	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
Exames	Neut (> 7, 5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1, 5 vezes)		BT(< 1, 5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Intervalo de 28 dias.**

**CICLO 5**

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
D1	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Lomustina 90 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D2	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D3	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D4	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D5	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
Exames	Neut (> 7, 5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1, 5 vezes)		BT(< 1, 5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 28 dias.****CICLO 6**

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
D1	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Lomustina 90 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D2	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D3	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D4	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D5	Temozolomida 160 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
Exames	Neut (> 7, 5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1, 5 vezes)		BT(< 1, 5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 28 dias.****B.2.3 Modificações de dose:**

Se atraso maior que 7 dias por toxicidade, reduzir os ciclos subsequentes para 150 mg/m<sup>2</sup>/dia



**Avaliação:** imagem a cada 3 ciclos (3 meses), se progressão, interromper protocolo.

**APRESENTAÇÕES DE TEMOZOLOMIDA NO HIAS:** cápsulas de 100mg

**APRESENTAÇÕES DE LOMUSTINA NO HIAS:** cápsulas de 10mg

**ADVERTÊNCIA:** SMZ+TMP não deve ser administrada juntamente com a temozolomida!

**ATENÇÃO:** este protocolo é *off-label* (não padronizado) e mostrou eficácia quando comparado com tratamento padrão sem QT em um ensaio fase II com número limitado de pacientes. Dessa forma, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.



## B.3 GLIOMA DE ALTO GRAU E DIPG – Adaptado do ensaio HIT-GBM-D - protocolo *off-label*

**Racional:** no estudo fase II do GPOH, a manutenção simplificada com prednisona, vincristina e lomustina foi tão eficaz quanto a manutenção intensiva do HIT-GBM-C<sup>3</sup>. Optamos por não usar a lomustina, apenas a manutenção com prednisona e VCR. O braço experimental com MTX não foi utilizado, apenas o braço controle.

**Elegível:** extensão da ressecção cirúrgica (RNM de controle 24-48h pós-op, máximo 72h após); citologia do LCR 10-14 dias pós-op. Iniciar 2 semanas após a cirurgia. Inclui glioblastoma multiforme, astrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico, gliossarcoma. Pacientes com mais de 3 anos de idade. Somente iniciar o protocolo após a assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, conforme acordado. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** não existe esquema de QT amplamente aceito para tratar crianças com gliomas de alto grau, incluindo gliomas pontinos intrínsecos difusos (DIPG). O tratamento padrão é RT craniana. Os pacientes com mais de 3 anos têm um prognóstico insatisfatório e sobrevida mediana de pouco mais de 12 meses.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### B.3.1 Indução: 6 semanas (radioquimioterapia)

**Radioterapia:** 54 Gy para crianças 3-5 anos e 59,4 Gy para crianças a partir de 6 anos. DIPG: dose máxima 54 Gy.

**Síndrome pós-RT:** sonolência, fadiga e alterações do EEG podem ocorrer semanas a meses após a RT. Trata-se de uma síndrome reversível, o tratamento não deve ser modificado.

**Atraso no início da RT:** janela de vincristina semanal 1,5 mg/m<sup>2</sup>, máximo 2mg, até iniciar RT.

PEV						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
1		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia	> 2000	> 10 <sup>5</sup>	( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
2		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
3		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
4		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
5		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
12		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
19		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
26		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

PEIV						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
35		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia	> 2000	> 10 <sup>5</sup>	( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
		Ifosfamida 1500 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
36		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
		Ifosfamida 1500 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
37		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
		Ifosfamida 1500 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
38		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Ifosfamida 1500 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
39		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Ifosfamida 1500 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	

**RNM após radioquimioterapia: considerar segunda cirurgia.**

**Intervalo de 28 dias**

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_

Estatura: \_\_\_\_\_

### B.3.2 Manutenção: 08 ciclos

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
63		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
70		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
77		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### Intervalo de 21 dias

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
98		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
105		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
112		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### Intervalo de 21 dias

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
133		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
140		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
147		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### Intervalo de 21 dias

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
<b>168</b>		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
<b>175</b>		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
<b>182</b>		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 21 dias**

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
<b>203</b>		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
<b>210</b>		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
<b>217</b>		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 21 dias**

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
<b>238</b>		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
<b>245</b>		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
<b>252</b>		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 21 dias**

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
273		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
280		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
287		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### Intervalo de 21 dias

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
308		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
315		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
322		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### FIM DE PROTOCOLO

### B.3.3 Modificações de dose:

**ATENÇÃO:** este protocolo é off-label (não padronizado) e não tem eficácia comprovada quando comparado com tratamento padrão sem QT. Dessa forma, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.

**Avaliação:** imagem a cada 3 ciclos (3 meses), se progressão, interromper protocolo. RNM após fim do protocolo (30 semanas): considerar segunda cirurgia.

**Evitar dexametasona** durante a radioquimioterapia. Se necessário, na fase de RT apenas (entre PEV e PEIV), usar 1 mg/m<sup>2</sup>/dia cada 8h.

**Profilaxia textitP. carinii:** sulfametoxazol + trimetoprima durante todo o tratamento.

#### Ajustes de dose:

Durante a radioterapia:

1. Não interromper por alterações do hemograma
2. Transfundir plaquetas para manter > 20 mil/m<sup>3</sup>
3. Transfundir hemoglobina para manter igual ou acima de 10 mg/dl
4. Tratar leucopenia com G-CSF
5. Interromper radioterapia apenas se sintomas clínicos ameaçadores
6. Não deixar de fazer as doses de vincristina do D12, 19 e 26

**Critérios de controle para radioquimioterapia (PEV):**

<b>Crítérios</b>	<b>Recomendações de tratamento</b>
Leucócitos > 2000/mm <sup>3</sup> e Plaquetas > 100 mil/ mm <sup>3</sup>	Iniciar radioquimioterapia concomitante
Leucócitos: 1500 – 2000/ mm <sup>3</sup> e/ou Plaquetas: 50 – 100 mil/ mm <sup>3</sup>	100% da dose de radioterapia 66% da dose de quimioterapia
Leucócitos: 1000 – 1500/ mm <sup>3</sup> e/ou Plaquetas: 30 – 50 mil/ mm <sup>3</sup>	100% da dose de radioterapia Adiar a quimioterapia 1 semana
Leucócitos: < 1000/ mm <sup>3</sup> e/ou Plaquetas: < 30 mil/ mm <sup>3</sup>	Adiar ambos os tratamentos por 1 semana
Convulsões na semana anterior	Adiar vincristina por 1 semana Iniciar anti-epiléptico
Obstipação	Adiar vincristina por 1 semana Lactulose 0,1 g/kg cada 12h profilática

**Antes do segundo bloco (PEIV):**

<b>Crítérios</b>	<b>Recomendações de tratamento</b>
Leucócitos > 2000/mm <sup>3</sup> e Plaquetas > 100 mil/ mm <sup>3</sup>	Iniciar radioquimioterapia concomitante
Leucócitos: 1500 – 2000/ mm <sup>3</sup> e/ou Plaquetas: 50 – 100 mil/ mm <sup>3</sup>	100% da dose de cisplatina 50% da dose de etoposido/ifosfamida
Perda de audição de > 25 dB a 6000 Hz após 1 bloco de cisplatina	Trocar a cisplatina por carboplatina 200 mg/m <sup>2</sup> D1-3, infundir diluído em 1h
Perda de audição de > 40 dB a 4000 Hz	Evitar qualquer composto de platina
Clearance de creatinina de 50 – 80 ml/min	Trocar a cisplatina por carboplatina 200 mg/m <sup>2</sup> D1-3, infundir diluído em 1h
Clearance de creatinina menor que 50 ml/min	Sem compostos de platina 30% da dose de ifosfamida
Hematúria	Sem ifosfamida

**Reação ao etoposido:** Na reação aguda: interromper a infusão, administrar anti-histamínicos e corticóide, re-iniciar infusão na metade da velocidade. Antes da próxima dose: anti-histamínicos e corticóide pré-quimioterapia e metade da velocidade de infusão.



*Apêndice C*

---

**Quimioterapia de resgate (doença  
recorrente/progressiva)**

---



## C.1 TUMORES PEDIÁTRICOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL RECORRENTES (protocolo *off-label*)

**Racional:** em 2007, Nicholson et al publicaram um ensaio fase II do COG de pacientes pediátricos com tumores recorrentes tratados com ciclos mensais de temozolomida. A série incluía 104 pacientes com tumores cerebrais, sendo que 25 tinham tumores embrionários, 22 tinham astrocitomas de baixo grau recorrentes e 8 tinham outros tumores de baixo grau. Dentre as respostas objetivas (parcial ou completa), 4 de 6 pacientes respondedores tinham tumores embrionários. No subgrupo de tumores de baixo grau, os pacientes mostraram uma sobrevida livre de progressão prolongada, com cerca de 40% dos pacientes mostrando estabilidade de doença. Um estudo fase II mostrou sobrevida global de 43% em 1 ano após o tratamento de pacientes com tumores embrionários recorrentes com temozolomida (Cefalo, 2014).

**Elegível:** pacientes com glioma de baixo grau (astrocitoma pilocítico, pilomixóide, difuso (ou fibrilar), oligodendroglioma, ganglioglioma, tumores mistos, tumores de vias ópticas/hipotálamo, tumores focais de tronco). Todos os pacientes devem ter feito, pelo menos, 2 (dois) esquemas de QT previamente (recorrência múltipla). Pacientes com contra-indicação à RT (menores de 5 anos e portadores de NF-1) podem ser incluídos. Paciente com tumores embrionários (meduloblastoma, pineoblastoma, ATRT, outros) na primeira recidiva. Somente iniciar o protocolo após a assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, conforme acordado. **NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.**

**Alternativa:** para pacientes com tumores de baixo grau, a conduta expectante é uma opção, uma vez que, via de regra, o crescimento destes tumores é lento e sua progressão demora anos, ou mesmo décadas. Pacientes de maior risco, como aqueles com lesões de vias ópticas ou hipotálamo, síndrome diencefálica ou com lesões de crescimento rápido devem ser tratados sem grande demora. Se possível, uma nova ressecção cirúrgica deve ser avaliada. A principal alternativa adjuvante para pacientes com mais de 5 anos e sem NF-1 é a RT local. Pacientes com astrocitomas difusos têm maior risco de transformação maligna após RT. Pacientes com tumores embrionários recorrentes não tem alternativa estabelecida de tratamento.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### C.1.1 Quimioterapia: 10 ciclos

CICLO 1				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
D1	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D2	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D3	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D4	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D5	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
Exames	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):		PlaQ (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

**CICLO 2**

<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

**CICLO 3**

<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

#### CICLO 4

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

#### CICLO 5

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

**CICLO 6**

<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 14 dias.****CICLO 7**

<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### CICLO 8

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

### CICLO 9

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

CICLO 10				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
D1	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D2	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D3	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D4	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D5	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
Exames	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

#### FIM DE PROTOCOLO

#### C.1.2 Modificações de dose:

Se atraso maior que 7 dias por toxicidade, reduzir os ciclos subsequentes para 150 mg/m<sup>2</sup>/dia.

**Avaliação:** imagem a cada 3 ciclos (3 meses), se progressão, interromper protocolo.

**APRESENTAÇÕES DE TEMOZOLOMIDA NO HIAS:** cápsulas de 100mg

**ADVERTÊNCIA:** SMZ+TMP não deve ser administrada juntamente com a temozolomida!

**ATENÇÃO:** o objetivo deste protocolo é ADIAR O USO DA RT (se não tiver sido feita) até a criança atingir uma idade onde os efeitos adversos da radiação sejam reduzidos, ou controlar doença recidivada após a RT. A principal resposta deste protocolo é ESTABILIZAÇÃO DA DOENÇA. Logo, é inadequado iniciar este esquema de QT em crianças em regime de internação prolongada, dependentes de cuidados hospitalares, visando "melhorar" sua condição clínica. Igualmente, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.



## C.2 IFOSFAMIDA/ETOPOSIDO - protocolo *off-label*

**Racional:** o Pediatric Oncology Group (POG) publicou os resultados de um ensaio fase II que incluiu 294 pacientes com tumores sólidos previamente tratados (mais de 70% metastáticos) que receberam uma mediana de 4 ciclos, dos quais 30% obtiveram resposta parcial ou completa. Este ensaio não incluiu pacientes com tumores cerebrais<sup>1</sup>. No entanto, esta combinação tem sido usada em vários protocolos no tratamento de pacientes pediátricos com tumores cerebrais, em vários cenários diferentes.

**Elegível:** Inclui meduloblastoma, outros tumores embrionários, ependimoma clássico ou anaplásico, gliomas difusos de linha média H3K27M+ (DIPG), glioblastoma multiforme, astrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico, tumores malignos raros do SNC. Pacientes com doença recorrente e/ou progressiva após 1 ou mais esquemas de tratamento. Somente iniciar o protocolo após a assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, conforme acordado. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** não existe esquema de QT amplamente aceito para tratar crianças com tumores malignos do SNC recorrentes e/ou progressivos. Verificar a possibilidade de incluir o paciente em algum estudo investigacional. Outra alternativa é repetir RT craniana.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### C.2.1 Resgate: 03 ciclos - repetir enquanto não houver progressão

CICLO 1				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
D1	Ifosfamida 2000 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D2	Ifosfamida 2000 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D3	Ifosfamida 2000 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
Exames	Neut (> 1,0 × 10 <sup>3</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):		TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)	BT(< 1,5 vezes):		TGP:

**Intervalo de 14-21 dias.**

CICLO 2				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>    <b>D2</b>    <b>D3</b>	Ifosfamida 2000 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Ifosfamida 2000 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Ifosfamida 2000 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 1, 0 × 10 <sup>3</sup> ):		Pla <sub>q</sub> (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1, 5 vezes)		BT(< 1, 5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14-21 dias.**

CICLO 3				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>    <b>D2</b>    <b>D3</b>	Ifosfamida 2000 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Ifosfamida 2000 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Ifosfamida 2000 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 1, 0 × 10 <sup>3</sup> ):		Pla <sub>q</sub> (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1, 5 vezes)		BT(< 1, 5 vezes):	TGP:

**REAVALIAR A CADA 3 CICLOS**

### C.2.2 Modificações de dose:

Se atraso maior que 7 dias por toxicidade, reduzir os ciclos subsequentes em 25

**Avaliação:** imagem a cada 3 ciclos, se progressão, interromper protocolo.

**ATENÇÃO:** este protocolo é *off-label* (não padronizado) e não tem eficácia comprovada quando comparado com tratamento padrão sem QT. Dessa forma, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.



### C.3 IFOSFAMIDA, CARBOPLATINA E ETOPOSIDO (ICE) - protocolo *off-label*

**Racional:** o Children's Cancer Group (CCG) publicou os resultados de alguns ensaios fase II que incluíram, conjuntamente, 229 pacientes com tumores previamente tratados (43 com tumores cerebrais) que receberam uma mediana de 1 ciclo. Dos pacientes com sarcomas, cerca de 50% obtiveram resposta parcial ou completa <sup>2</sup>.

**Elegível:** Inclui meduloblastoma, outros tumores embrionários, ependimoma clássico ou anaplásico, gliomas difusos de linha média H3K27M+ (DIPG), glioblastoma multiforme, astrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico, tumores malignos raros do SNC. Pacientes com doença recorrente e/ou progressiva após 1 ou mais esquemas de tratamento. Somente iniciar o protocolo após a assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, conforme acordado. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** não existe esquema de QT amplamente aceito para tratar crianças com tumores malignos do SNC recorrentes e/ou progressivos. Verificar a possibilidade de incluir o paciente em algum estudo investigacional. Outra alternativa é repetir RT craniana.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

#### C.3.1 Resgate: 02 ciclos - repetir enquanto não houver progressão

CICLO 1				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Carboplatina 400 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Carboplatina 400 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	

<b>D5</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D6 até recuperar</b>	Filgrastima 0,01 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 1,0 \times 10^3$ ):		PlaQ ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	

**Intervalo de 21 dias.**

## **CICLO 2**

<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D1</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Carboplatina 400 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Carboplatina 400 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D6 até recuperar</b>	Filgrastima 0,01 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 1,0 \times 10^3$ ):		PlaQ ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	

**REAVALIAR A CADA 2 CICLOS**

### **C.3.2 Modificações de dose:**

Se recuperação hematológica não ocorrer até o D21, reduzir os ciclos subsequentes em 25

**Avaliação:** imagem a cada 4 ciclos, se progressão, interromper protocolo.

**ATENÇÃO:** este protocolo é *off-label* (não padronizado) e não tem eficácia comprovada quando comparado com tratamento padrão sem QT. Dessa forma, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.





---

## **Quimioterapia neoadjuvante**

---



## D.1 VIMBLASTINA METRONÔMICA NEOADJUVANTE - protocolo *off-label*

**Racional:** Estudos mostraram a utilidade da vimblastina como monoterapia ou associada à terapia convencional em pacientes pediátricos com linfoma anaplásico de grandes células, na primeira linha ou após recorrência.<sup>1</sup> Um estudo fase II piloto que incluiu 33 pacientes pediátricos com tumores sólidos recorrentes usou a vimblastina como terapia metronômica, associada ou não à ciclofosfamida, mostrando resultados objetivos num subgrupo pequeno<sup>2</sup>. Um outro estudo tratou 64 pacientes pediátricos com tumores sólidos recorrentes (incluindo 9 pacientes com tumor cerebral) com vimblastina metronômica e radioterapia, obtendo resposta objetiva em quase 50%<sup>3</sup>. Os esquemas variam na dose ( $1 - 6\text{mg}/\text{m}^2$ ), na frequência (1 a 3 vezes por semana) e na associação com outras terapias (celecoxibe, quimioterapia convencional, radioterapia).

**Elegível:** pacientes pediátricos com tumores cerebrales estadiamento de Chang T3 ou T4. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** O tratamento padrão é a cirurgia com ressecção máxima possível, mantendo com segurança uma mínima incidência de complicações. Este tratamento é experimental e somente deve ser iniciado após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da unidade proponente.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### D.1.1 Esquema: 6 semanas

Solicitar imagem (RNM com perfusão se disponível)

<b>D1</b>	Vimblastina $1,0\text{mg}/\text{m}^2$	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	
Exames:	Neut( $> 1,5 \times 10^3$ ):	Pla( $> 10^5$ ):	TGO:
<b>D3</b>	Vimblastina $1,0\text{mg}/\text{m}^2$	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	
<b>D5</b>	Vimblastina $1,0\text{mg}/\text{m}^2$	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	
<b>D8</b>	Vimblastina $1,0\text{mg}/\text{m}^2$	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	

Versão Outubro/2017

<sup>1</sup>Le Deley *et al*, 2010; Brugières *et al*, 2009

<sup>2</sup>Stempak *et al*, 2006

<sup>3</sup>Ali *et al*, 2016

<b>D10</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D12</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D15</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D17</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D19</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D22</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D24</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D26</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D29</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D31</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

<b>D33</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	

<b>D36</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	

<b>D38</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	

Exames: Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
--	---------------------------	------

<b>D40</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	

***Reavaliar e encaminhar à cirurgia***  
**Solicitar imagem (RNM com perfusão se disponível)**

### **D.1.2 Modificações de dose:**

Se  $750 \geq \text{Neut} \geq 500/\text{mm}^3$ , reduzir dose para 5mg/m<sup>2</sup>. Se  $\text{Neut} < 500/\text{mm}^3$ , interromper até subir para 750 ou mais. Se toxicidade hematológica recorrente, reduzir dose para 4mg/m<sup>2</sup>.

**ATENÇÃO:** o objetivo deste protocolo é permitir a máxima ressecção possível em tumores cerebelares de difícil abordagem. Seu desfecho principal mensurável é a quantidade de pacientes com ressecção total ou subtotal. Logo, deve-se considerar caso a caso a possibilidade de iniciar este esquema de QT em crianças em regime de internação prolongada, dependentes de cuidados hospitalares intensivos, ou com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.

## D.2 IFOSFAMIDA, CARBOPLATINA E ETOPOSIDO (ICE) NEOADJUVANTE PARA TUMORES DE PLEXO CORÓIDE - protocolo *off-label*

**Racional:** o Children's Cancer Group (CCG) publicou os resultados de alguns ensaios fase II que incluíram, conjuntamente, 229 pacientes com tumores previamente tratados (43 com tumores cerebrais) que receberam uma mediana de 1 ciclo. Dos pacientes com sarcomas, cerca de 50% obtiveram resposta parcial ou completa<sup>4</sup>.

**Elegível:** Inclui meduloblastoma, outros tumores embrionários, ependimoma clássico ou anaplásico, gliomas difusos de linha média H3K27M+ (DIPG), glioblastoma multiforme, astrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico, tumores malignos raros do SNC. Pacientes com doença recorrente e/ou progressiva após 1 ou mais esquemas de tratamento. Somente iniciar o protocolo após a assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, conforme acordado. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** não existe esquema de QT amplamente aceito para tratar crianças com tumores malignos do SNC recorrentes e/ou progressivos. Verificar a possibilidade de incluir o paciente em algum estudo investigacional. Outra alternativa é repetir RT craniana.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### D.2.1 Dois ciclos - repetir uma vez se necessário e não houver progressão

CICLO 1				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Carboplatina 400 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Carboplatina 400 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	

<b>D5</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D6 até recuperar</b>	Filgrastima 0,01 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 1,0 \times 10^3$ ):		PlaQ ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	

**Intervalo de 21 dias.**

<b>CICLO 2</b>				
<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D1</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Carboplatina 400 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Carboplatina 400 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Ifosfamida 1800 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
	MESNA 1500 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D6 até recuperar</b>	Filgrastima 0,01 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 1,0 \times 10^3$ ):		PlaQ ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	

**REAVALIAR A CADA 2 CICLOS**

### **D.2.2 Modificações de dose:**

Se recuperação hematológica não ocorrer até o D21, reduzir os ciclos subsequentes em 25

**Avaliação:** imagem a cada 4 ciclos, se progressão, interromper protocolo.

**ATENÇÃO:** este protocolo é *off-label* (não padronizado) e não tem eficácia comprovada quando comparado com tratamento padrão sem QT. Dessa forma, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.



*Apêndice E*

---

## **Quimioterapia metronômica**

---



## E.1 VIMBLASTINA SEMANAL METRONÔMICA - protocolo *off-label*

**Racional:** Estudos mostraram a utilidade da vimblastina como monoterapia ou associada à terapia convencional em pacientes pediátricos com linfoma anaplásico de grandes células, na primeira linha ou após recorrência.<sup>1</sup> Um estudo fase II piloto que incluiu 33 pacientes pediátricos com tumores sólidos recorrentes usou a vimblastina como terapia metronômica, associada ou não à ciclofosfamida, mostrando resultados objetivos num subgrupo pequeno<sup>2</sup>. Um outro estudo tratou 64 pacientes pediátricos com tumores sólidos recorrentes (incluindo 9 pacientes com tumor cerebral) com vimblastina metronômica e radioterapia, obtendo resposta objetiva em quase 50%<sup>3</sup>. Os esquemas variam na dose ( $1 - 6 \text{ mg/m}^2$ ), na frequência (1 a 3 vezes por semana) e na associação com outras terapias (celecoxibe, quimioterapia convencional, radioterapia).

**Elegível:** pacientes pediátricos com tumores sólidos recorrentes ou progressivos após múltiplos tratamentos. Este protocolo não tem objetivo curativo e somente deve ser utilizado em pacientes para os quais se contraindica QT de resgate ou se os pais ou responsáveis do paciente preferirem. Radioterapia concomitante a critério clínico. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** Não existe alternativa amplamente aceita para este perfil de paciente. Apenas palição é uma alternativa aceitável.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### E.1.1 Esquema 1: 6 semanas - usar esquema 1 ou 2, não ambos

<b>D1</b>	Vimblastina $6,0 \text{ mg/m}^2$ EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut( $> 1,5 \times 10^3$ ):	Pla( $> 10^5$ ):	TGO:
<b>D8</b>	Vimblastina $6,0 \text{ mg/m}^2$ EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D15</b>	Vimblastina $6,0 \text{ mg/m}^2$ EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D22</b>	Vimblastina $6,0 \text{ mg/m}^2$ EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica

Versão Outubro/2017

<sup>1</sup>Le Deley *et al*, 2010; Brugières *et al*, 2009

<sup>2</sup>Stempak *et al*, 2006

<sup>3</sup>Ali *et al*, 2016

<b>D29</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

<b>D36</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
------------	--	--	---------

*Reavaliar e repetir se resposta objetiva*

<b>D43</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

<b>D50</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
------------	--	--	---------

<b>D57</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
------------	--	--	---------

<b>D64</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
------------	--	--	---------

<b>D71</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	Plaq(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

<b>D78</b>	Vimblastina 6, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
------------	--	--	---------

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_

Estatura: \_\_\_\_\_

### E.1.2 Esquema 2: 6 semanas - usar esquema 1 ou 2, não ambos

<b>D1</b>	Vimblastina 1,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

<b>D3</b>	Vimblastina 1,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-----------	---	--	---------

<b>D5</b>	Vimblastina 1,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-----------	---	--	---------

<b>D8</b>	Vimblastina 1,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
-----------	---	--	---------

<b>D10</b>	Vimblastina 1,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

<b>D12</b>	Vimblastina 1,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
------------	---	--	---------

<b>D15</b>	Vimblastina 1,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1,5 × 10 <sup>3</sup> ):	Pla(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

<b>D17</b>	Vimblastina 1,0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
------------	---	--	---------

<b>D19</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D22</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D24</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D26</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D29</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:
<b>D31</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D33</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D36</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
<b>D38</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup> EV em bolo (max 10mg)	Administrado: ( ) Sim ( ) Não Data:	Rubrica
Exames:	Neut(> 1, 5 × 10 <sup>3</sup> ):	PlaQ(> 10 <sup>5</sup> ):	TGO:

<b>D40</b>	Vimblastina 1, 0mg/m <sup>2</sup>	Administrado: ( ) Sim ( ) Não	Rubrica
	EV em bolo (max 10mg)	Data:	

*Reavaliar e repetir se resposta objetiva*  
**Solicitar imagem (RNM)**

### **E.1.3 Modificações de dose:**

Se  $750 \geq \text{Neut} \geq 500/\text{mm}^3$ , reduzir dose para  $5\text{mg}/\text{m}^2$ . Se  $\text{Neut} < 500/\text{mm}^3$ , interromper até subir para 750 ou mais. Se toxicidade hematológica recorrente, reduzir dose para  $4\text{mg}/\text{m}^2$ .

**ATENÇÃO:** o objetivo deste protocolo é controlar doença recidivada após diversos tratamentos anteriores, quando não existem outras alternativas. A principal resposta esperada deste protocolo é **ESTABILIZAÇÃO DA DOENÇA**. Logo, é inadequado iniciar este esquema de QT em crianças em regime de internação prolongada, dependentes de cuidados hospitalares, visando "melhorar" sua condição clínica. Igualmente, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como aquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.





---

## **Protocolos depreciados (substituídos por atualizações)**

---



## F.1 GLIOMA DE ALTO GRAU E DIPG – Adaptado do ensaio ACNS0126

**Racional:** no estudo do COG, a temozolomida (TMZ) não mostrou aumento de sobrevida em relação ao controle histórico (CCG-945), porém é proposta como alternativa principal por suas vantagens <sup>1</sup>. Deve-se levar em conta a disponibilidade e custo do esquema. Este protocolo foi substituído em 2017 pelo ACNS-0423, que mostrou resultados superiores.

**Elegível:** extensão da ressecção cirúrgica (RNM de controle até 21 dias pós-op, preferido 72h após); não é necessário pesquisar metástases de rotina (RNM de neuro-eixo e PL/MO). Tratamento precisa iniciar até 42 dias após cirurgia. Inclui glioblastoma multiforme, astrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico, gliossarcoma. Pacientes com mais de 3 anos de idade. Somente iniciar o protocolo após a assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, conforme acordado. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** não existe esquema de QT amplamente aceito para tratar crianças com gliomas de alto grau, incluindo gliomas pontinos intrínsecos difusos (DIPG). O tratamento padrão é RT craniana. Os pacientes com mais de 3 anos têm um prognóstico insatisfatório e sobrevida mediana de pouco mais de 12 meses.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### F.1.1 Indução: 6 semanas (radioquimioterapia)

Semana	Dose	Data	Neut	Plaq	Administrado	Rubrica
1	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	
2	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	
3	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	
4	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	
5	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	
6	Temozolomida 90mg/m <sup>2</sup> /dia Seg-Sex				( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 28 dias.**

### F.1.2 Manutenção: 10 ciclos

CICLO 1				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
D1	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D2	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D3	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D4	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D5	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
Exames	Neut (> 7, 5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1, 5 vezes)		BT(< 1, 5 vezes):	TGP:

Intervalo de 14 dias.

Exames (data):	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
----------------	-------------------------------	-------------------------------

Intervalo de 14 dias.

CICLO 2				
Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
D1	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D2	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D3	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D4	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
D5	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
Exames	Neut (> 7, 5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7, 5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1, 5 vezes)		BT(< 1, 5 vezes):	TGP:

Intervalo de 14 dias.

Exames (data):	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
----------------	-------------------------------	-------------------------------

Intervalo de 14 dias.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### CICLO 3

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

### CICLO 4

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

**CICLO 5**

<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 14 dias.****CICLO 6**

<b>Dia</b>	<b>Dose</b>	<b>Data</b>	<b>Administrado</b>	<b>Rubrica</b>
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_\_

### CICLO 7

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

### CICLO 8

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):		Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

**Intervalo de 14 dias.**

<b>Exames (data):</b>	Neut (> 7,5 × 10 <sup>2</sup> ):	Plaq (> 7,5 × 10 <sup>4</sup> ):
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Intervalo de 14 dias.**

**CICLO 9**

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

Intervalo de 14 dias.

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

Intervalo de 14 dias.

**CICLO 10**

Dia	Dose	Data	Administrado	Rubrica
<b>D1</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D2</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D3</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D4</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>D5</b>	Temozolomida 200 mg/m <sup>2</sup>		( ) Sim ( ) Não	
<b>Exames</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):		Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):	TGO:
	Creat(< 1,5 vezes)		BT(< 1,5 vezes):	TGP:

Intervalo de 14 dias.

<b>Exames (data):</b>	Neut ( $> 7,5 \times 10^2$ ):	Plaq ( $> 7,5 \times 10^4$ ):
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

**FIM DE PROTOCOLO****F.1.3 Modificações de dose:**

Se atraso maior que 7 dias por toxicidade, reduzir os ciclos subsequentes para 150 mg/m<sup>2</sup>/dia

**Avaliação:** imagem a cada 3 ciclos (3 meses), se progressão, interromper protocolo.

**APRESENTAÇÕES DE TEMOZOLOMIDA NO HIAS:** cápsulas de 100mg

**ADVERTÊNCIA:** SMZ+TMP não deve ser administrada juntamente com a temozolomida!



**ATENÇÃO:** este protocolo é *off-label* (não padronizado) e não tem eficácia comprovada quando comparado com tratamento padrão sem QT. Dessa forma, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.



## F.2 EPENDIMOMA NÃO METASTÁTICO – Adaptado dos ensaios ACNS0121 e ACNS0831

**Racional:** no estudo recém-terminado do COG (ACNS0121), os pacientes foram estratificados em 4 grupos <sup>2</sup>:

Estrato 1 - Paciente com ependimomas clássicos supratentoriais com ressecção microscopicamente completa.

Estrato 2 - Pacientes com ressecção parcial.

Estrato 3 - Pacientes com ressecção total macroscópica ou subtotal (até 5 mm de tumor residual).

Estrato 4 - Pacientes com ependimomas anaplásicos supratentoriais com ressecção total ou infratentoriais (qualquer histologia) com ressecção total.

Os pacientes do estrato 1 foram apenas observados, sendo que 5 de 11 apresentaram recidiva. Os pacientes do estrato 3 e 4 receberam RT conformacional no leito tumoral logo após a ressecção, com sobrevida livre de eventos de 75% para ependimoma clássico e 60% para ependimoma anaplásico. Os pacientes do estrato 2 receberam QT antes da RT e foram avaliados para possível nova cirurgia. A sobrevida livre de eventos deste último grupo foi de 40%. Os resultados deste estudo deixaram claro que a primeira escolha de tratamento para ependimoma, clássico ou anaplásico, é a RT no leito tumoral imediatamente após a cirurgia, a partir de 1 ano de idade. O uso de QT com este protocolo, assim, deve ser deixado para casos selecionados nos quais a RT inicial tem poucas chances de ser bem sucedida. O estudo em andamento ACNS0831 inclui QT pós-RT para pacientes do estrato 2. Todavia, em 2016, um estudo avaliou retrospectivamente uma coorte combinada de 820 casos de ependimoma levando em conta os novos subgrupos moleculares recém-descritos e não encontrou nenhuma vantagem do tratamento adjuvante com quimioterapia <sup>3</sup>.

**Elegível:**Estadiamento pré-tratamento: mais de 0,5cm de tumor residual (RNM de controle até 21 dias pós-op, preferido 72h após); sem metástases (RNM de neuro-eixo e PL/MO). Tratamento precisa iniciar até 56 dias após cirurgia. Apenas EPENDIMOMA (excluindo espinhal). Pacientes com mais de 3 anos de idade. Somente iniciar o protocolo após a assinatura do TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, conforme acordado. NÃO INICIAR ESTE PROTOCOLO EM CRIANÇAS GRAVEMENTE ENFERMAS.

**Alternativa:** não existe esquema de QT amplamente aceito para tratar crianças com ependimoma. O tratamento padrão é RT no leito tumoral. Os pacientes com ressecção incompleta têm um prognóstico insatisfatório e sobrevida livre de progressão prolongada reduzida.

---

Versão Outubro/2017

<sup>2</sup>Merchant *et al*, 2015

<sup>3</sup>Ramaswamy *et al*, 2016

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_

Estatura: \_\_\_\_\_

### F.2.1 Indução: 2 ciclos (pré-radioterapia)

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
1		Carboplatina 375 mg/m <sup>2</sup> /dia	> 10 <sup>3</sup>	> 10 <sup>5</sup>	( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Ciclofosfamida 1000 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 200 mg/m <sup>2</sup> × 0, 1, 5h			( ) Sim ( ) Não	
2		Ciclofosfamida 1000 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 200 mg/m <sup>2</sup> × 0, 1, 5h			( ) Sim ( ) Não	
3-12		G-CSF 5µg/ml			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
8		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### Intervalo de 14 dias

Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
21		Carboplatina 375 mg/m <sup>2</sup> /dia	> 10 <sup>3</sup>	> 10 <sup>5</sup>	( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
22		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
23		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
28		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

*Reavaliar com imagem – Re-operação se possível*  
*Encaminhar para Radioterapia*

### F.2.2 Manutenção: 04 ciclos (VCEC)

Apenas pacientes com ependimomas ressecados incompletamente, de acordo com a definição do COG.

Ciclo 1						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
1		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia	> 10 <sup>3</sup>	> 10 <sup>5</sup>	( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
		Cisplatina 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
2		Ciclofosfamida 1000 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 200 mg/m <sup>2</sup> × 0, 1, 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
3		Ciclofosfamida 1000 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 200 mg/m <sup>2</sup> × 0, 1, 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
4-13		G-CSF 5µg/ml			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
8		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
15		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 2						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
22		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia	> 10 <sup>3</sup>	> 10 <sup>5</sup>	( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
		Cisplatina 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
23		Ciclofosfamida 1000 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 200 mg/m <sup>2</sup> × 0, 1, 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
24		Ciclofosfamida 1000 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 200 mg/m <sup>2</sup> × 0, 1, 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
25-34		G-CSF 5µg/ml			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
29		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
36		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 3						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
43		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia	> 10 <sup>3</sup>	> 10 <sup>5</sup>	( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
		Cisplatina 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
44		Ciclofosfamida 1000 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 200 mg/m <sup>2</sup> × 0,1, 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
45		Ciclofosfamida 1000 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 200 mg/m <sup>2</sup> × 0,1, 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
46-55		G-CSF 5µg/ml			( ) Sim ( ) Não	

Dia	Data			Administrado	Rubrica
50		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
57		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

Ciclo 4						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
64		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)	> 10 <sup>3</sup>	> 10 <sup>5</sup>	( ) Sim ( ) Não	
		Cisplatina 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
65		Ciclofosfamida 1000 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 200 mg/m <sup>2</sup> × 0,1, 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
66		Ciclofosfamida 1000 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		MESNA 200 mg/m <sup>2</sup> × 0,1, 5h			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia)			( ) Sim ( ) Não	
67-76		G-CSF 5µg/ml			( ) Sim ( ) Não	

### Final de Protocolo

## F.2.3 Modificações de dose:

Adiar se L < 1000/mm<sup>3</sup> ou P < 100000/mm<sup>3</sup>. Se atraso maior que 7 dias, reduzir dose de ciclofosfamida em 20%. Toxicidade grau 3-4 pela VCR, suspender dose seguinte. Reiniciar com dose normal. Recorrência: reduzir dose. Bilirrubina total de 1,5-1,9 mg/dl, reduzir VCR para 1,0 mg/m<sup>2</sup>; se bilirrubina > 1,9 mg/dl, suspender uma dose de VCR.

Se o clearance de creatinina <50% basal ou <60, suspender CDDP. No ciclo seguinte, se exames normalizados, fazer 50% da dose de CDDP. Aumente novamente para 100% somente no terceiro ciclo, se exames mantiverem-se normais. Se ocorrer redução de 20dB ou mais em frequências auditivas baixas (500-2000Hz), reduzir carboplatina em 50%. Se ocorrer redução de 30dB na faixa de 4000-8000 Hz), reduzir carboplatina em 50%. Ototoxicidade grau IV: interromper carboplatina até nível de lesão retornar ao grau II.

**Pacientes com superfície corpórea menor ou igual a 0,45m<sup>2</sup>:**

Carboplatina: 12,5 mg/kg – Vincristina: 0,05 mg/kg – Ciclofosfamida: 33 mg/kg – MESNA: 7 mg/kg – Etoposido: 3,4 mg/kg

**ATENÇÃO:** este protocolo é *off-label* (não padronizado) e não tem eficácia comprovada quando comparado com tratamento padrão sem QT. Dessa forma, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.





---

## **Protocolos experimentais (estudos clínicos)**

---



## G.1 VALQUIRIA (VALPROATO, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA - protocolo experimental cancelado)

**Racional:** O tratamento de pacientes pediátricos com gliomas intrínsecos difusos da ponte (DIPG) ainda associa-se com resultados insatisfatórios. Praticamente não existem pacientes com esta doença com sobrevivência prolongada. O ácido valpróico (valproato de sódio - VPA) é utilizado para o tratamento de convulsões em pacientes com tumores cerebrais. Comparamos a sobrevida dos pacientes tratados com valproato com um controle histórico não tratado. Comparando a sobrevida global e livre de eventos em pacientes com DIPG, encontramos uma diferença estatisticamente significativa em favor daqueles que fizeram a profilaxia com VPA. Esse resultado positivo nos levou a planejar um ensaio clínico prospectivo avaliando a sobrevida de pacientes com DIPG tratados com VPA associado à radioterapia e quimioterapia, comparando com um grupo controle histórico tratado com radioquimioterapia apenas. O objetivo principal é avaliar a sobrevida global (SG) em 12 e 24 meses de pacientes com diagnóstico de glioma intrínseco difuso da ponte tratados com uma combinação de radioquimioterapia e ácido valpróico. Os objetivos secundários são comparar a SG em 12 e 24 meses com os valores relatados pelo GPOH no ensaio HIT-GBM-C para tumores pontinos, comparar a curva de SG e SLP dos pacientes com as curvas de sobrevida dos pacientes do grupo histórico do nosso serviço, tratados com radioterapia e com uma combinação de tratamento adjuvante diferente do tratamento deste estudo, além de comparar a curva de SG e SLP dos pacientes com as curvas de sobrevida dos pacientes descritos num ensaio clínico realizado com crianças brasileiras portadoras de DIPG. Além destes, estão previstas avaliações de resposta radiológica, qualidade de vida e toxicidade. A pesquisa será desenvolvida no Hospital Infantil Albert Sabin e em seu anexo Centro Pediátrico do Câncer, incluindo pacientes de 0-18 anos, diagnosticados com DIPG. Usando as informações prévias disponíveis, o número mínimo necessário de pacientes para o grupo experimental (num desenho 1:2) será de 16 pacientes. Espera-se que sejam necessários 2 anos para recrutar esta amostra.

### Elegível:

Critérios de inclusão.

- A. Pacientes entre 0 e 18 anos que receberam diagnóstico de DIPG comprovado por imagem.
- B. Ausência de sangramento cerebral agudo. Inclui hematoma subdural, sangramento intraparenquimatoso e subaracnóideo.
- C. Ausência de tratamento anterior por quimioterapia ou radioterapia.

Critérios de exclusão.

- A. História de trauma craniano recente.
- B. Coma com sinais de herniação.
- C. Coagulopatia (plaquetas  $> 50000/mm^3$ , INR  $< 1.8$ ).
- D. Uso anterior recente de ácido valpróico.
- E. Uso de outras drogas anticonvulsivantes.

**Alternativa:** não existe esquema de QT amplamente aceito para tratar crianças com gliomas de alto grau, incluindo gliomas pontinos intrínsecos difusos (DIPG). O tratamento padrão é RT craniana. Os pacientes com mais de 3 anos têm um prognóstico insatisfatório e sobrevida mediana de pouco mais de 12 meses.

**Protocolo cancelado:** o ensaio VALQUIRIA foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital Infantil Albert Sabin em 16/01/2016 com o número de parecer 1.386.007 e CAAE 30166714.8.0000.5042. Em 19/11/2016, uma emenda foi aprovada postergando o início da coleta de dados do projeto para 2017. Em vista de dificuldades para garantir a execução do projeto de acordo com o planejado, o mesmo foi cancelado em agosto de 2017. Nenhum paciente foi recrutado para o ensaio clínico.

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_

Estatura: \_\_\_\_\_

### G.1.1 Resumo do tratamento:

#### Droga oral:

Ácido valpróico (valproato de sódio, ácido 2-propilpentanóico, ATC N03AG01, CAS 99-66-1, fármaco com efeito GABAérgico indireto usado como antiepiléptico (com registro na ANVISA para uso em adultos e crianças). Apresentação: xarope contendo 250mg em 5 ml, comprimidos de 500 mg. Fonte: farmácia hospitalar do HIAS.// Os pacientes serão tratados a partir da entrada no estudo com dose inicial de 15 mg/kg/dia, dividida a cada 8h, de VPA. A concentração sérica será dosada em laboratório de apoio do HIAS, através de quimioluminescência (CLIA), uma, duas e três semanas após o início do tratamento com VPA e a dose será modificada, entre 10 e 20 mg/kg/dia, a fim de atingir uma concentração sérica entre 75 e 100 mcg/ml.//

#### Protocolo de quimioterapia:

Adaptado do HIT-GBM-D do GPOH. O texto a seguir baseia-se parcialmente na livre tradução, com adaptações, para o português do texto do protocolo HIT-GBM-D <sup>1</sup>.//

#### Radioquimioterapia simultânea:

Resumo geral: a radioterapia fracionada convencional deve iniciar em 14 dias até no máximo quatro semanas após o diagnóstico radiológico,. Simultaneamente à radioterapia convencional dois ciclos de quimioterapia são administrados.// Se existir atraso no início da irradiação, vincristina semanal  $1.5\text{mg}/\text{m}^2$ , máximo 2 mg, uma vez por semana) deve ser administrada. O número total de seis doses de vincristina não deve ser ultrapassado até terminar radioterapia.

### G.1.2 Indução: 6 semanas (radioquimioterapia)

**Radioterapia:** 54 Gy para crianças 3-5 anos e 59,4 Gy para crianças a partir de 6 anos. DIPG: dose máxima 54 Gy.

**Síndrome pós-RT:** sonolência, fadiga e alterações do EEG podem ocorrer semanas a meses após a RT. Trata-se de uma síndrome reversível, o tratamento não deve ser modificado.

**Atraso no início da RT:** janela de vincristina semanal  $1,5\text{ mg}/\text{m}^2$ , máximo 2mg, até iniciar RT.

---

<sup>1</sup>Wolff, 2010c

PEV						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
1		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia	> 2000	> 10 <sup>5</sup>	( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
2		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
3		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
4		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
5		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	

Vincristina semanal						
Dia	Data				Administrado	Rubrica
12		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
19		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
26		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	

PEIV						
Dia	Data		Leuco	Plaq	Administrado	Rubrica
35		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia	> 2000	> 10 <sup>5</sup>	( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Ifosfamida 1500 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
36		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Ifosfamida 1500 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
37		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Etoposido 100 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Ifosfamida 1500 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
38		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Ifosfamida 1500 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
39		Cisplatina 20 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Ifosfamida 1500 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia			( ) Sim ( ) Não	

**RNM após radioquimioterapia: considerar segunda cirurgia.**

**Intervalo de 28 dias**

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_

Estatura: \_\_\_\_\_

### G.1.3 Manutenção: 08 ciclos

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
63		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
70		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
77		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### Intervalo de 21 dias

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
98		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
105		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
112		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### Intervalo de 21 dias

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
133		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
140		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
147		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### Intervalo de 21 dias

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
168		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
175		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
182		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 21 dias**

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
203		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
210		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
217		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 21 dias**

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
238		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
245		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
252		Vincristina 1,5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

**Intervalo de 21 dias**

Nome: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_

Estatura: \_\_\_\_\_

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
273		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
280		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
287		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### Intervalo de 21 dias

Vincristina semanal					
Dia	Data			Administrado	Rubrica
308		Prednisona 40 mg/m <sup>2</sup> /dia por 11 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 20 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Prednisona 10 mg/m <sup>2</sup> /dia por 3 dias		( ) Sim ( ) Não	
		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
315		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	
322		Vincristina 1, 5 mg/m <sup>2</sup> /dia		( ) Sim ( ) Não	

#### FIM DE PROTOCOLO

#### G.1.4 Modificações de dose:

**ATENÇÃO:** este protocolo é off-label (não padronizado) e não tem eficácia comprovada quando comparado com tratamento padrão sem QT. Dessa forma, é inadequado iniciar este protocolo em crianças com risco de complicações graves, como naquelas que têm sequelas importantes e muito limitantes.

**Avaliação:** imagem a cada 3 ciclos (3 meses), se progressão, interromper protocolo. RNM após fim do protocolo (30 semanas): considerar segunda cirurgia.

**Evitar dexametasona** durante a radioquimioterapia. Se necessário, na fase de RT apenas (entre PEV e PEIV), usar 1 mg/m<sup>2</sup>/dia cada 8h.

**Profilaxia textitP. carinii:** sulfametoxazol + trimetoprima durante todo o tratamento.

#### Ajustes de dose:

Durante a radioterapia:

1. Não interromper por alterações do hemograma
2. Transfundir plaquetas para manter > 20 mil/m<sup>3</sup>
3. Transfundir hemoglobina para manter igual ou acima de 10 mg/dl
4. Tratar leucopenia com G-CSF
5. Interromper radioterapia apenas se sintomas clínicos ameaçadores
6. Não deixar de fazer as doses de vincristina do D12, 19 e 26



**Critérios de controle para radioquimioterapia (PEV):**

<b>Crítérios</b>	<b>Recomendações de tratamento</b>
Leucócitos > 2000/mm <sup>3</sup> e Plaquetas > 100 mil/mm <sup>3</sup>	Iniciar radioquimioterapia concomitante
Leucócitos: 1500 – 2000/mm <sup>3</sup> e/ou Plaquetas: 50 – 100 mil/mm <sup>3</sup>	100% da dose de radioterapia 66% da dose de quimioterapia
Leucócitos: 1000 – 1500/mm <sup>3</sup> e/ou Plaquetas: 30 – 50 mil/mm <sup>3</sup>	100% da dose de radioterapia Adiar a quimioterapia 1 semana
Leucócitos: < 1000/mm <sup>3</sup> e/ou Plaquetas: < 30 mil/mm <sup>3</sup>	Adiar ambos os tratamentos por 1 semana
Convulsões na semana anterior	Adiar vincristina por 1 semana Iniciar anti-epiléptico
Obstipação	Adiar vincristina por 1 semana Lactulose 0,1 g/kg cada 12h profilática

**Antes do segundo bloco (PEIV):**

<b>Crítérios</b>	<b>Recomendações de tratamento</b>
Leucócitos > 2000/mm <sup>3</sup> e Plaquetas > 100 mil/mm <sup>3</sup>	Iniciar radioquimioterapia concomitante
Leucócitos: 1500 – 2000/mm <sup>3</sup> e/ou Plaquetas: 50 – 100 mil/mm <sup>3</sup>	100% da dose de cisplatina 50% da dose de etoposido/ifosfamida
Perda de audição de > 25 dB a 6000 Hz após 1 bloco de cisplatina	Trocar a cisplatina por carboplatina 200 mg/m <sup>2</sup> D1-3, infundir diluído em 1h
Perda de audição de > 40 dB a 4000 Hz	Evitar qualquer composto de platina
Clearance de creatinina de 50 – 80 ml/min	Trocar a cisplatina por carboplatina 200 mg/m <sup>2</sup> D1-3, infundir diluído em 1h
Clearance de creatinina menor que 50 ml/min	Sem compostos de platina 30% da dose de ifosfamida
Hematúria	Sem ifosfamida

**Reação ao etoposido:** Na reação aguda: interromper a infusão, administrar anti-histamínicos e corticóide, re-iniciar infusão na metade da velocidade. Antes da próxima dose: anti-histamínicos e corticóide pré-quimioterapia e metade da velocidade de infusão.