

Tumores embrionrios e pineoblastoma

Francisco Hlder Cavalcante Flix e Juvenia Bezerra Fontenele


Abstract

1 Tumores embrionrios

Tumores embrionrios incluem o meduloblastoma (mais comum deste grupo e o tumor cerebral maligno mais frequente em crianas e adolescentes), tumor teratide-rabdide atpico, tumor embrionrio formador de rosetas em multicamadas, tumor embrionrio sem outra especificao (SOE) e outros tumores mais raros.

Francisco Hlder Cavalcante Flix
Centro Peditrico do Cncer, Hospital Infantil Albert Sabin, R. Alberto Montezuma, 350, 60410-780,
Fortaleza - CE e-mail: fhcflix@outlook.com

Juvenia Bezerra Fontenele
Faculdade de Farmcia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do Cear, R. Alexandre
Barana, 949, 60430-160, Fortaleza - CE



FHC Félix, 2018

Fig. 1 Tratamento de crianças com ependimomas.




Fig. 2 Tratamento de crianças com meduloblastomas.

Table 1

Meduloblastoma	Desmoplásico/nodular	0-5	M0	R0+	MYC/N(-/+)	P1
				R0	MYC/N(-/?)	P2
		≥5	M1 ou R+ ou		MYC/N(+)	P3
			M2/3	R0+	MYC/N(-/+)	P4
	Clássico	0-3	M0	R0+	MYC/N(-/+)	P1
			M0	R0	MYC/N(-/?)	P2
		≥4	M0/1	R+	MYC/N(+)	P3
			M2/3	R+	MYC/N(-/+)	P4
	Grandes células/anaplásico	0-3	M0	R0+	MYC/N(-/+)	P1
		≥4	M0/1	R0+	MYC/N(-/+)	P3
			M2/3	R+	MYC/N(-/+)	P4
	Pineoblastoma	0-3	M0	R0+	MYC/N(-/+)	P1
		≥4	M0	R0+	MYC/N(-/+)	P3
			M+	R+	MYC/N(-/+)	P4