

Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde CIEVS/AL



Informe Epidemiológico

Grupo Técnico de Monitoramento da Emergência - GT COVID-19

24 DE ABRIL DE 2020

Nº 49

Este INFORME tem por objetivo apresentar a situação da COVID-19, com dados até o fechamento em 24/4/2020, ás 14h00.

DEFINICÕES DE CASO (atualizado em 3/4/2020)

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG):

quadro respiratório agudo, indivíduo com caracterizado por sensação febril ou febre*. relatada. acompanhada mesmo aue de OU tosse dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. *Na suspeita de COVID-19, a febre pode não estar presente.

EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):

Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório **OU** Pressão persistente no tórax **OU** saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente **OU** coloração azulada dos lábios ou rosto.

EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

A SESAU, desde fevereiro/2020, vem realizando ações de vigilância relacionadas à COVID-19, como preconizado pelo Ministério da Saúde (MS).

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL

Dados disponíveis pelo MS informam 49.492 casos confirmados em todos os Estados e no Distrito Federal, e 3.313 óbitos em todas as 27 Unidades Federadas (atualizado em: 23/04/2020 ás17h30).


CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM ALAGOAS

No período entre 26/02 e 24/4/2020 foram notificados 1.985 casos. Desses, 1.351 foram descartados por critério laboratorial e 2 por critério clínico-epidemiológico. Os confirmados por critério laboratorial somam 413 e 219 estão em investigação (**Tabela 1**).

Em 24/03 o 12º caso confirmado não tinha histórico de viagem para área de transmissão sustentada da doença, nem referiu contato com caso suspeito ou positivo. Com isso, caracterizou-se a transmissão comunitária da COVID–19 em Alagoas.

Na **Figura 1** tem-se a distribuição dos casos notificados, confirmados e óbitos por município de residência, evidenciando-se a distribuição nas10 regiões de saúde (RS) do Estado. Até 24/4/2020, têm-se casos notificados em 72 municípios. Dentre os confirmados, a maior parte encontra-se em Maceió (355), Marechal Deodoro (9), Rio Largo (7), Arapiraca,(4), Murici (3), Pilar (3), Satuba (3), Palmeira Dos Índios (2), Piaçabuçu (2), Anadia (1), Boca Da Mata (1), Barra De Santo Antônio (1), Capela (1), Delmiro Gouveia (1), Ibateguara (1), Limoeiro De Anadia (1), Maragogi (1), Maribondo (1), Paripueira (1), Porto Real Do Colégio (1), Santa Luzia do Norte (1), São Miguel dos Campos (1), São Miguel Dos Milagres (1), União Dos Palmares (1), Viçosa (1)e 9 residentes em outros estados (DF, PE, RJ e SP).

Figura 1 – Distribuição espacial das notificações, casos confirmados e óbitos da COVID-19 em Alagoas, segundo município de residência. Alagoas, 2020.



MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	CASOS CONFIRMADOS	Óbitos Confirmados	
Anadia	1	1	
Arapiraca	4	-	
Boca da Mata	1	-	
Barra de Santo Antônio	1	-	
Capela	1	-	
Delmiro Gouveia	1	-	
Ibateguara	1	1	
Limoeiro de Anadia	1	1	
Maceió	355	18	
Maragogi	1	-	
Marechal Deodoro	9	1	
Maribondo	1	-	
Murici	3	-	
Palmeira dos Índios	2	-	
Paripueira	1	1	
Piaçabuçu	2	-	
Pilar	3	-	
Porto Real do Colégio	1		
Rio Largo	7	-	
Santa Luzia do Norte	1		
São Miguel dos Campos	1		
São Miguel dos Milagres	1	1	
Satuba	3		
União Dos Palmares	1		
Viçosa	1	1	
Total	404	25	

Fonte: CIEVS/AL dados em 24/4/2020.

24 DE ABRIL DE 2020

Nº 49

Tabela 1 - Frequência de casos notificados, segundo situação para COVID-19. Alagoas, 2020.


Casos Notificados	Em inve	estigação	Casos Confirmados		Casos Descartados		Óbito / Letalidade	
1.985	219	11,0%	413	20,8%	1.353	68,2%	27	6,3%

Fonte: CIEVS/AL dados em 24/4/2020.

Dentre os casos confirmados hospitalizados, 10 encontram-se em UTI e 28 em enfermaria. O quantitativo de casos suspeitos está sujeito a alteração, após investigação da Vigilância Epidemiológica das Secretarias Municipais e da SESAU, podendo, inclusive, haver exclusão por não se enquadrar na definição de caso (**Gráfico 1**).


Em relação à situação dos casos confirmados, 78 estão curados (75 por alta médica/hospitalar ou por final do período de isolamento e 3 finalizaram o isolamento e retornaram ao estado de origem), 38 encontram-se hospitalizados, 116 permanecem em isolamento domiciliar, 154 foram orientados a realizar o isolamento domiciliar e no momento aguarda-se retorno quanto ao monitoramento por parte dos municípios de residência, e 26 evoluíram para óbito (**Gráfico 1**).

Gráfico 1 – Frequência da situação dos casos confirmados da COVID-19. Alagoas, 2020.



No **Gráfico 2** tem-se a distribuição dos casos confirmados da COVID-19 por faixa etária e sexo. Quando analisado o perfil das idades a média é de 43 anos, sendo a mínima 4 dias e a máxima 96 anos. Entre os infectados observa-se que o sexo feminino foi o mais acometido (52,1%). A média de idade dos casos do sexo feminino é de 42 anos e do sexo masculino é de 44 anos.

Gráfico 2 - Casos confirmados para COVID-19, segundo sexo e faixa etária. Alagoas, 2020.



Dentre os 27 óbitos confirmados até o momento, 15 são do sexo masculino e 8 do sexo feminino (**Gráfico 3**), sendo residentes de Maceió (18), Marechal Deodoro (1), São Miguel dos Milagres (1), Ibateguara (1), Viçosa (1), Anadia (1), Paripueira (1) Limoeiro de Anadia (1) e dois (2) residentes de outros estados: São Paulo e Pernambuco. Com relação à idade dos casos que evoluíram para óbito da COVID-19 a média é de 70 anos, sendo a idade mínima 24 e a máxima 89.

O **Gráfico 4** mostra o número de casos confirmados da COVID-19 segundo definição de caso da página 1. Desses, 330 (79,9%) apresentaram sinais leves definidos para SG e 83 (20,1%) evoluíram para forma mais grave (SRAG).

Gráfico 3 – Percentual de óbitos confirmados da COVID-19, segundo sexo, Alagoas, 2020.





Gráfico 4 – Percentual de casos confirmados da COVID-19, segundo definição de caso. Alagoas, 2020.



Fonte: CIEVS/AL dados em 24/4/2020.

24 DE ABRIL DE 2020

Nº 49

Na **Tabela 2** tem-se a situação epidemiológica dos casos confirmados, óbitos e taxa de letalidade da COVID-19, comparando Brasil, região Nordeste e Alagoas. A letalidade de Alagoas está em 6,5% ficando próximo da média nacional e do Nordeste.

Tabela 2 – Situação epidemiológica dos casos confirmados, óbitos e taxa de letalidade da COVID-19. Brasil, Nordeste, Alagoas, 2020.


BF	RASIL	NOR	DESTE	ALA	GOAS
Confirmados	49.492	Confirmados	12.782	Confirmados	413
Óbitos	3.313	Óbitos	804	Óbitos	27
Letalidade	6,7%	Letalidade	6,3%	Letalidade	6,5%

Fonte: Ministério da Saúde. Brasil, 2020. Última atualização 17h30 22/4/2020 Alagoas 13h00 24/04/2020

Em relação ao monitoramento diário de novos casos suspeitos e da variação percentual de casos acumulados, fez-se uma análise que considera dois diferentes momentos, tendo como ponto de corte o dia 23/03, por duas razões principais: (i) a definição da transmissão comunitária em todo o território nacional, passando a ser caso suspeito inclusive aquele com história de viagem dentro do país; e (ii) a mudança da fonte de dados que vinha apresentando problemas (RedCap) e que foi descontinuada pelo Ministério da Saúde.

Assim, o **Gráfico 6(A)** mostra uma elevação a partir do dia 20/03 com pico de casos suspeitos no dia 23/03, um dado que deve ser visto com cautela devido às fragilidades do RedCap. Já no **Gráfico 6(B)** que considera informações a partir de 24/4 observam-se oscilações tanto no número de casos suspeitos como no de casos acumulados. A variação média por semana epidemiológica evidencia um leve incremento a cada semana: +4,2% (entre 29/03 e 04/04), +4,5% (entre 05/04 e 11/04) e +3,8% (entre 12/04 e 18/04), chamando a atenção nesta última o percentual abaixo da variação média das semanas anteriores.

Gráfico 6 – Frequência diária de novos casos suspeitos e variação percentual de casos acumulados em dois períodos de tempo: A – até 23/03; e B – a partir de 24/03. Alagoas, 2020.



No **Gráfico 7** tem-se a distribuição acumulada dos casos confirmados, observando-se que a primeira confirmação em 10/03 ocorreu 9 dias após o registro dos primeiros casos suspeitos. Até 23/03 todos os casos confirmados foram importados ou referiram vínculo epidemiológico com caso confirmado laboratorialmente, e que a partir de 13/04 a curva de casos confirmados começa a ficar mais acentuada, sinalizando para o acerto da medida de isolamento social e a necessidade da sua manutenção.

19

5

Casos/Dia

73

3,1 7,8 0,9

Variação

9

28

0,6 2,1

6/4 | 7/4 | 8/4 | 9/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | 14/4 | 15/4 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4

7,6

10

31

21 49 386

65 87 73

5,7 6,1

58

Gráfico 7 - Frequência de casos confirmados cumulativamente e óbitos segundo data de confirmação. Alagoas, 2020.

60 33

3/4

42


0,9 6,0 6,0 7,6 3,9

45

28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4

2,4

14 74 1 32



0

Casos/Dia

24/3 25/3 26/3 27/3

23

Nº 49

24 DE ABRIL DE 2020

	NOTIFICAÇÃO
Casos leves de SG	Na atenção primária, pronto atendimentos e unidades privadas (clínicas, consultórios etc.) NOTIFICA no e-SUS VE (Clique aqui: ▶ <u>e-SUS VE</u>) A Unidade Sentinela NOTIFICA no SIVEP-GRIPE (Clique aqui: ▶ <u>SIVEP-GRIPE</u>) Preencher os dados como indicado no instrumento online.
SRAG hospitalizado e óbitos por SRAG	Em UNIDADE HOSPITALAR o serviço que atende o caso NOTIFICA no SIVEP-GRIPE (Clique aqui: ►SIVEP-GRIPE), utilizando a Ficha de SRAG Hospitalizado (modelo de março de 2020 – em anexo). E coleta a amostra e registra no GAL (Clique aqui: ►GAL) E informa de imediato ao CIEVS/SESAU (por telefone ou por e-mail), encaminhando a amostra para o LACEN/AL junto com a ficha de SRAG Hospitalizado e a ficha do GAL.

CASOS CONFIRMADOS

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de:

Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, Influenza ou VSR):

Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-CoV2.

Influenza: com resultado detectável para Influenza.

Vírus Sincicial Respiratório: com resultado detectável para VSR.

Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):

Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG com:

Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

CASO DESCARTADO DE DOENCA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-2019)

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para CORONAVÍRUS (SARS-COV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em tempo real), considerando a oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública Nacional pela Doença pelo Conoravírus 2019. 3/4/2020.

Coleta de Amostras Clínicas:

Em todos os casos de **SRAG** deve ser realizada coleta de secreção da nasofaringe (NSF) e orofaringe, utilizando 3 swabs (2 para NSF e 1 para orofaringe), acondicionados no mesmo meio de transporte viral e encaminhada para o LACEN-AL, acompanhada da ficha de SRAG e cadastro no GAL. A coleta deve ser realizada, preferencialmente, do 3º ao 5º dia, podendo ser realizada até o 7º dia de início dos sintomas.

A coleta de NSF para diagnóstico da COVID-19 está indicada para todos os casos classificados como SRAG e óbito por SRAG.

Importante!

A coleta NÃO está indicada:

Atentar para definição de caso para síndrome gripal

- → Para pessoas assintomáticas e
- → Para os casos de resfriado ou Síndrome Gripal (SG).

A utilização do **TESTE RÁPIDO** deve seguir as orientações preconizadas pelo Ministério da Saúde e referendadas pela Nota Conjunta CONASS/CONASEMS.

Coleta de Amostras em Situação de Óbito:

No paciente que evoluiu para óbito antes de ter sido coletada a amostra de NSF, deve ser realizada a coleta de swab combinado pós óbito.

Para melhor identificação viral, esse procedimento deve ser realizado de preferência até 6 horas depois do óbito, podendo ser estendida para até 12 horas. Nesse caso, o próprio hospital **DEVERÁ** realizar a coleta.

No óbito de pessoa não internada e que não tenha diagnóstico definido, o corpo deve ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para realização de autópsia verbal. Para esclarecimentos adicionais contatar o **SVO: (82) 3315-3223**

Sobre esse assunto acessar o link: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf.

Contate o CIEVS/AL para NOTIFICAÇÃO e informações técnicas: por telefone: (82) 3315-2059/0800 284 5415 (Horário comercial – todos os dias); (82) 98882-9752 (24 h) e por e-mail: notifica@saude.al.gov.br.