

Topología: apunte compilado

Definiciones, propiedades y teoremas asociados a las guías de ejercicios
(Espacios métricos, espacios topológicos, bases, separación, continuidad, subespacios, productos, conexidad, compacidad)

Cómo leer las referencias

Cada enunciado lleva entre corchetes la fuente y la página, para poder remitirse al texto original.

- **GT** = *Topología: Espacios Métricos y Topológicos* (Curso 2011/2012, autor no consignado). Es la *Guía Teórica* del curso: es el texto al que remiten los ejercicios cuando citan numeraciones del tipo “Ejemplo 2.8.16.2”. La numeración interna (1.1.1, 2.8.2, ...) coincide con la del PDF, y la página impresa coincide con la página del PDF.
- **MS** = Marta Macho Stadler, *Topología*, Curso 2014/2015. Se cita por página *impresa* (la del pie de página): la página impresa p es la página $p + 8$ del PDF.
- **EJ** = guía de ejercicios (**EMyT.pdf**), citada por página del PDF. Sus páginas 14–15 contienen el capítulo “Topologías iniciales y finales” (numerado allí como Cap. 3, páginas impresas 17–18).
- **TS** = apunte complementario *Topologías iniciales y finales*, §3.1 (“Topología del subespacio”), citado por su numeración interna (Def. 3.1.1, Props. 3.1.2–3.1.3, Obs. 3.1.4–3.1.7). Es el mismo texto que aparece en las páginas 14–15 de **EJ**.
- **TP** = apunte de cátedra *Topología Producto* (4 pp., 01-fuentes/TP-Topologia-Producto.pdf). Se cita por página.
- **clase 8, clase 9, ..., clase 13** = notas de clase (01-fuentes/Notas-clase-*.pdf), citadas por la numeración interna de cada nota (“clase 10, Obs. 2.3”). Se usan para lo que la docente dictó con una demostración o un enfoque propio que no está en **GT**.
- **CX** = guía *Ejercicios de Conexidad y Arco-conexidad* (01-fuentes/Ejercicios-Conexidad-2020.pdf), citada por número de ejercicio.
- **[curso]** = definición o resultado que se usa en los ejercicios pero que no aparece enunciado con ese nombre en ninguno de los dos textos (típicamente: diámetro, acotación, distancia entre conjuntos). Conviene fijar la convención de clase.

Convención de notación. Salvo que el enunciado diga otra cosa: (X, τ) e (Y, τ') son espacios topológicos; (X, d) e (Y, ρ) espacios métricos; $A, B, C \subseteq X$; G un abierto y F un cerrado; β una base y σ una subbase; $\mathcal{N}_x$ el sistema de entornos de x ; $f : X \rightarrow Y$ una función, y $f^{-1}(B)$ siempre la *preimagen*. De todos modos, cada enunciado vuelve a nombrar los objetos que usa, para que se pueda leer suelto.

Se incluyen demostraciones solo cuando la idea es la que se evalúa (una técnica reusable, un contraejemplo estructural o una equivalencia clave). El resto va enunciado.

Qué significa cada rótulo. La distinción importa para saber qué hay que aceptar y qué hay que saber justificar:

- **Definición:** se admite. No se demuestra: fija el significado de una palabra. Lo único que puede pedirse es verificar que un objeto concreto la cumple.

- **Proposición / Teorema / Lema:** hay que poder demostrarlo. La diferencia entre los tres es sólo de peso (el lema es un paso auxiliar, el teorema un resultado central); lógicamente son lo mismo.
- **Corolario:** se deduce en pocos renglones de lo inmediatamente anterior.
- **Ejemplo / Contraejemplo:** no se demuestra en general, se exhibe. Los contraejemplos son los que marcan el límite exacto de un teorema.
- **Observación:** comentario, técnica de demostración o advertencia; no es material que se enuncie por sí solo.

Cuando un enunciado de los textos mezclaba una definición con una afirmación demostrable, acá aparecen separados: la definición por un lado y la proposición por el otro. Algunos enunciados llevan debajo, entre paréntesis, su versión en lenguaje formal; sólo los que redactados en palabras no quedaban ya escritos en símbolos. Las cajas naranjas de **Intuición** y las figuras no son parte del contenido evaluable: están para fijar la imagen mental antes de leer el enunciado formal.

Índice

1	Espacios métricos y normados	3
1.1	Normas y su distancia asociada	4
1.2	Producto interno	5
1.3	Fabricación de métricas nuevas	6
1.4	Distancias entre funciones	7
1.5	Distancia a un conjunto, diámetro, acotación	8
1.6	Bolas	9
2	La topología de un espacio métrico	10
2.1	Adherencia, frontera y cerrados en un espacio métrico	11
3	Espacios topológicos	14
3.1	Interior, clausura, acumulación, frontera	14
4	Bases, subbases y comparación de topologías	18
4.1	Entornos y bases de entornos	19
5	Axiomas de separación T_0, T_1, T_2	20
6	Sucesiones y convergencia	21
7	Continuidad	22
7.1	Continuidad en un punto	22
7.2	Continuidad global	23
7.3	Álgebra de funciones continuas a valores reales	24
7.4	Continuidad uniforme y métricas producto	25
7.5	Homeomorfismos	27
8	Topología de subespacio	29
9	Topología producto	31
9.1	La base de rectángulos y la topología producto	31
9.2	Proyecciones	32
9.3	Propiedades del producto (guía de productos)	35

10	Conexidad	36
10.1	Imagen continua y funciones a un discreto	37
10.2	La herramienta principal: dos puntos en un conexo	39
10.3	Unión, intersección y clausura de conexos	39
10.4	Más consecuencias (guía de conexidad)	40
10.5	Producto de conexos	42
10.6	Intervalos de $\mathbb{R}$ y Bolzano	43
10.7	Conexión por caminos (arcoconexión)	47
10.8	Componentes conexas por caminos y conexión local por caminos	52
10.9	Puntos de corte	57
10.10	Conexo más localmente arcoconexo implica arcoconexo	60
10.11	Componentes conexas y conexión local	60
11	Compacidad	65
11.1	Definición y primeros ejemplos	65
11.2	Compacidad y cerrados	69
11.3	Compacidad y Hausdorff	70
11.4	Compacidad y continuidad	71
11.5	Compacidad en productos	73
11.6	Compacidad en espacios métricos	75
11.7	Compacidad y completitud	77
11.8	Compacidad local	79
	Apéndice A: mapa rápido de los ejercicios	81
	Apéndice B: lista para el primer parcial	82
	Apéndice C: lista para el segundo parcial	91
	Apéndice D: glosario de notación	99
	Apéndice E: catálogo de topologías	103

1 Espacios métricos y normados

Definición 1.1 (Distancia, seudodistancia [GT 1.1.1, p. 2]). Una *distancia* sobre X es $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que para todos $x, x', x'' \in X$:

- (i) $d(x, x') \geq 0$;
- (ii) $d(x, x') = d(x', x)$ (simetría);
- (iii) $d(x, x') = 0 \iff x = x'$;
- (iv) $d(x, x') \leq d(x, x'') + d(x'', x')$ (desigualdad triangular).

(X, d) es un *espacio métrico*. Si (iii) se debilita a $d(x, x) = 0$, d es una *seudodistancia* y (X, d) un *espacio seudométrico*.

$$\begin{aligned}
 & \left(d \text{ es distancia} \iff \forall x, x', x'' \in X : d(x, x') \geq 0 \wedge d(x, x') = d(x', x) \right. \\
 & \quad \left. \wedge (d(x, x') = 0 \iff x = x') \wedge d(x, x') \leq d(x, x'') + d(x'', x') \right); \\
 & d \text{ es seudodistancia : lo mismo con } \forall x \, d(x, x) = 0 \text{ en lugar de la tercera. }
 \end{aligned}$$

1.1 Normas y su distancia asociada

Definición 1.2 (Norma [GT 1.1.4, p. 2]). Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. Una *norma* es $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, para todos $v, w \in V$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\|v\| \geq 0$;
- $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$ (homogeneidad);
- $\|v\| = 0 \iff v = 0$;
- $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (desigualdad triangular).

$$\begin{aligned} (\|\cdot\| \text{ es norma} &\iff \forall v, w \in V \forall \lambda \in \mathbb{R} : \|v\| \geq 0 \wedge \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\| \\ &\wedge (\|v\| = 0 \iff v = 0) \wedge \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.) \end{aligned}$$

Proposición 1.3 (Distancia asociada a una norma [GT 1.1.5, p. 3]). Si $(V, \|\cdot\|)$ es normado, $d(v, w) = \|v - w\|$ es una distancia sobre V .

$$((V, \|\cdot\|) \text{ normado} \Rightarrow d(v, w) := \|v - w\| \text{ es distancia en } V.)$$

Ejemplo 1.4 (Las métricas de referencia [GT 1.1.2–1.1.3, p. 2; GT 1.1.6–1.1.10, pp. 3–4]). En $\mathbb{R}^n$: euclídea $d_e(x, y) = (\sum_i (x_i - y_i)^2)^{1/2}$; taxi $d_{\text{taxi}}(x, y) = \sum_i |x_i - y_i|$; del máximo $d_{\text{max}}(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$. En $\mathbb{R}^3$ las bolas cerradas unidad son, respectivamente, la esfera sólida, el octaedro regular sólido y el cubo $[-1, 1]^3$ [EJ, Métricos–C.1, p. 4].

Proposición 1.5 (Las normas euclídea, del taxi y del máximo [GT Ejs. 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 y 1.1.10, pp. 3–4]). En $\mathbb{R}^n$, las funciones $\|x\|_e = (\sum_i x_i^2)^{1/2}$ (euclídea), $\|x\|_{\text{taxi}} = \sum_i |x_i|$ (del taxi) y $\|x\|_{\text{max}} = \max_i |x_i|$ (del máximo) son normas, y sus distancias asociadas (Prop. de la distancia asociada a una norma) son d_e , d_{taxi} y d_{max} . Para $n = 1$ las tres son el valor absoluto y dan $d(x, y) = |x - y|$ (GT 1.1.2 y 1.1.6); para $n = 2$, d_e es la distancia de la geometría del plano (GT 1.1.3).

$$(\|x\|_{\text{taxi}} = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_{\text{max}} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \quad \|x\|_e = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \text{ son normas en } \mathbb{R}^n.)$$

Demostración. Positividad, homogeneidad y anulación salen de las del valor absoluto. Sólo hay que mirar la desigualdad triangular, y en las dos primeras sale coordenada a coordenada de $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$:

- taxi: $\|x + y\|_{\text{taxi}} = \sum_i |x_i + y_i| \leq \sum_i |x_i| + \sum_i |y_i| = \|x\|_{\text{taxi}} + \|y\|_{\text{taxi}}$;
- máximo: para cada i , $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i| \leq \|x\|_{\text{max}} + \|y\|_{\text{max}}$; el miembro derecho no depende de i , así que también acota al máximo de los $|x_i + y_i|$, que es $\|x + y\|_{\text{max}}$;
- euclídea: es la norma de un producto interno, y la triangular es el corolario de Cauchy–Schwarz de §1.

□

Ejemplo 1.6 (Las distancias no coinciden [GT Ej. 1.1.8, p. 4]). Entre $(0, 0)$ y $(1, 1)$: $d_e = \sqrt{2}$, $d_{\text{taxi}} = 2$, $d_{\text{max}} = 1$. Las tres distancias son distintas como funciones, aunque (Prop. 2.5) dan los mismos abiertos.




Figura 1. Las bolas cerradas $B[(0,0),1]$ de las tres métricas de referencia en $\mathbb{R}^2$. En $\mathbb{R}^3$ las mismas fórmulas dan la esfera sólida, el octaedro y el cubo $[-1,1]^3$ (Métricos-C.1).

Intuición. Las tres bolas son distintas *como conjuntos*, pero cada una de las tres contiene una copia encogida de las otras dos alrededor del mismo centro: siempre se puede meter un rombito adentro de un disquito y un disquito adentro de un cuadradito. Eso es *exactamente* lo que significa que las tres métricas den la misma topología (Prop. 2.5): la topología no ve la forma de la bola, solo ve “qué conjuntos contienen una bolita alrededor de cada uno de sus puntos”.

Ejemplo 1.7 (Distancia discreta [GT 1.1.16, p. 7]). $d_D(x, y) = 1$ si $x \neq y$ y 0 si $x = y$. Es la métrica que induce la topología discreta.

Proposición 1.8 (La discreta no proviene de una norma [GT 1.1.17, p. 7]). *No existe ninguna norma en $\mathbb{R}^n$ cuya distancia asociada sea la discreta.*

$$(\neg \exists \|\cdot\| \text{ norma en } \mathbb{R}^n : \forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|x - y\| = d_D(x, y).)$$

Demostración. Si $d_D(v, w) = \|v - w\|$, tomo $v \neq 0$, con lo cual $\|v\| = d_D(v, 0) = 1$. Pero entonces $\|\frac{1}{2}v\| = \frac{1}{2}\|v\| = \frac{1}{2}$, valor que d_D nunca toma. La obstrucción es la *homogeneidad*: una norma obliga a que el conjunto de distancias sea cerrado bajo multiplicación por escalares positivos. $\square$

1.2 Producto interno

Definición 1.9 (Producto interno [EJ, Ejercicio teórico N° 1, p. 3]). Sobre un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial V , $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ es un *producto interno* si, para todos $u, v, w \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

- $(u, u) \geq 0$;
- $(u, u) = 0 \iff u = 0$;
- $(u, v) = (v, u)$ (simetría);
- $(u, v + w) = (u, v) + (u, w)$;
- $(\alpha u, v) = \alpha (u, v)$.

Se define $\|u\| = \sqrt{(u, u)}$.

$$((\cdot, \cdot) \text{ es producto interno} \iff \forall u, v, w \in V \forall \alpha \in \mathbb{R} : (u, u) \geq 0 \wedge ((u, u) = 0 \iff u = 0) \wedge (u, v) = (v, u) \wedge (u, v + w) = (u, v) + (u, w) \wedge (\alpha u, v) = \alpha (u, v); \quad \|u\| := \sqrt{(u, u)}.)$$

Teorema 1.10 (Desigualdad de Cauchy–Schwarz [EJ, Ej. teórico N° 1.1, p. 3]). *Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con producto interno $(\cdot, \cdot)$ y sea $\|u\| = \sqrt{(u, u)}$. Entonces $|(u, v)| \leq \|u\| \|v\|$ para todos $u, v \in V$.*

$$(\forall u, v \in V : |(u, v)| \leq \|u\| \|v\|.)$$

Demostración. Si $v = 0$ es trivial. Si $v \neq 0$, para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$0 \leq (u + tv, u + tv) = \|u\|^2 + 2t(u, v) + t^2\|v\|^2.$$

Es un polinomio real de grado 2 en t no negativo, luego su discriminante es ≤ 0 : $4(u, v)^2 - 4\|u\|^2\|v\|^2 \leq 0$. (Alternativamente, evaluar en $t = -(u, v)/\|v\|^2$.) $\square$

Corolario 1.11 (Norma asociada [EJ, Ej. teórico N° 1.2, p. 3]). *Sobre un espacio con producto interno, $\|u\| = \sqrt{(u, u)}$ es una norma; la desigualdad triangular sale de Cauchy-Schwarz vía $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2(u, v) + \|v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2$.*

$$(\|u\| = \sqrt{(u, u)} \text{ es norma; } \|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2(u, v) + \|v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2.)$$

Proposición 1.12 (Identidad de polarización [EJ, Ej. teórico N° 1.4, p. 3]). *Sea V con producto interno y $\|\cdot\|$ su norma asociada. Entonces $(u, v) = \frac{1}{4}\|u+v\|^2 - \frac{1}{4}\|u-v\|^2$ para todos $u, v \in V$. Una norma proviene de un producto interno si y sólo si la fórmula anterior define un producto interno; equivalentemente, si y sólo si cumple la ley del paralelogramo $\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$.*

$$((u, v) = \frac{1}{4}\|u+v\|^2 - \frac{1}{4}\|u-v\|^2; \|\cdot\| \text{ proviene de un producto interno} \iff \forall u, v : \|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.)$$

1.3 Fabricación de métricas nuevas

Tres de los ejercicios de la guía A son casos particulares de dos principios generales; conviene estudiarlos así y no uno por uno.

Lema 1.13 (Deformación por función cóncava [principio detrás de EJ, Métricos-A.1 y A.2, p. 1]). *Sea $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ tal que $f(t) = 0 \iff t = 0$, f es creciente y subaditiva ($f(a+b) \leq f(a) + f(b)$). Si d es una distancia en X , entonces $f \circ d$ también lo es.*

$$([f \text{ creciente} \wedge \forall a, b \ f(a+b) \leq f(a) + f(b) \wedge (f(t) = 0 \iff t = 0)] \Rightarrow f \circ d \text{ es distancia.})$$

Demostración. Positividad, anulación y simetría son inmediatas. Para la triangular: $f(d(x, y)) \leq f(d(x, z) + d(z, y)) \leq f(d(x, z)) + f(d(z, y))$, donde la primera desigualdad usa que f es creciente y la segunda que es subaditiva. $\square$

Lema 1.14 (Métrica inducida por una inyección [principio detrás de EJ, Métricos-A.3, p. 1]). *Sean $f : X \rightarrow Y$ una función y (Y, ρ) métrico. Entonces $d(x, x') := \rho(f(x), f(x'))$ es siempre una pseudodistancia en X , y es una distancia si y sólo si f es inyectiva.*

$$(d(x, x') := \rho(f(x), f(x')) \text{ es pseudodistancia; } d \text{ es distancia} \iff f \text{ es inyectiva.})$$

1.4 Distancias entre funciones

Proposición 1.15 (Norma del supremo [GT Ej. 1.1.11, pp. 4–5]). Sea $\ell^\infty(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ acotada}\}$, que es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con la suma y el producto por escalares punto a punto. Entonces $\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)| : x \in \mathbb{R}\}$ es una norma sobre $\ell^\infty(\mathbb{R})$ (la norma del supremo), y su distancia asociada es la distancia del supremo $d_\infty(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in \mathbb{R}\}$: dos funciones están a distancia menor que ε cuando sus gráficos están “uniformemente” cerca.

$$(\|f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| \text{ es norma en } \ell^\infty(\mathbb{R}); \quad d_\infty(f, g) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)|.)$$

Demostración. El supremo existe porque f es acotada. $\|f\|_\infty \geq 0$ por ser supremo de valores absolutos; $\|\lambda f\|_\infty = \sup |\lambda| |f(x)| = |\lambda| \|f\|_\infty$; si $\|f\|_\infty = 0$, entonces $0 \leq |f(x)| \leq 0$ para todo x y f es la función nula θ . Triangular: para cada x , $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$; como la cota no depende de x , también acota al supremo. $\square$

Ejemplo 1.16 (Cuentas con d_∞ [GT Ej. 1.1.12, p. 5]). $\|\sin\|_\infty = 1$. Entre $\sin$ y $\cos$: $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$, luego $d_\infty(\sin, \cos) = \sqrt{2}$ (se alcanza en $x = \frac{3\pi}{4}$). Si $f_n = \frac{1}{n} \sin$, entonces $d_\infty(f_n, \theta) = \frac{1}{n} \rightarrow 0$: la sucesión se acerca tanto como se quiera a la función nula en $(\ell^\infty(\mathbb{R}), d_\infty)$.

Observación 1.17 (Errata de GT 1.1.12). **GT** afirma $d_\infty(\sin, \cos) = 1$; el valor correcto es $\sqrt{2}$, por la cuenta de arriba.

Proposición 1.18 (La norma integral [GT Ej. 1.1.13, pp. 5–6]). Sobre $C[0, 1] = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ continua}\}$, $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$ es una norma, con distancia asociada $d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$ (el área entre los dos gráficos).

$$(\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx \text{ es norma en } C[0, 1]; \quad d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx.)$$

Demostración. Positividad y homogeneidad salen de las de la integral; la triangular, de integrar $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$. La anulación es la que usa la *continuidad*: si $f(x_0) \neq 0$ para algún x_0 , por continuidad $|f| \geq \frac{1}{2}|f(x_0)|$ en un intervalo $I \ni x_0$ de longitud $\ell > 0$ contenido en $[0, 1]$, y entonces $\|f\|_1 \geq \frac{1}{2}|f(x_0)|\ell > 0$. $\square$

Observación 1.19 (Sobre la demostración de GT 1.1.13 y las normas $\|\cdot\|_p$). En el punto 3, **GT** pasa de $\int_0^1 |f| = 0$ a $f \equiv 0$ “para todo $x \in \mathbb{R}$ ” sin justificar: hace falta la continuidad (una función que vale 1 en un solo punto y 0 en el resto tiene integral nula) y el dominio es $[0, 1]$. **GT** menciona además $\|f\|_p = (\int_0^1 |f|^p)^{1/p}$ (allí escrita con n); también es una norma, pero su triangular es la desigualdad de Minkowski, que no se demuestra en el curso.

Observación 1.20 (d_1 y d_∞ miden cosas distintas [GT Ej. 1.1.14, p. 6]). En $C[0, 1]$ vale $d_1 \leq d_\infty$ (se integra $|f - g| \leq d_\infty(f, g)$ sobre un intervalo de longitud 1), así que acercarse en d_∞ obliga a acercarse en d_1 . Al revés no: una sucesión de “picos” de altura 1 y base cada vez más angosta tiende a θ en d_1 y se queda a distancia 1 de θ en d_∞ .

Ejemplo 1.21 (Una seudodistancia: la llegada a la meta [GT Ej. 1.1.15, pp. 6–7]). En $C[0, 1]$, $d_{\text{meta}}(f, g) = |f(1) - g(1)|$ es una seudodistancia que no es distancia: dos funciones distintas que coinciden en 1 están a distancia 0. Es el Lema de la métrica inducida (§1) aplicado a la evaluación $f \mapsto f(1)$, de $C[0, 1]$ en $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, que no es inyectiva. Lectura de **GT**: si f creciente con $f(0) = 0$ da el tiempo en que un corredor pasa por cada punto de la pista $[0, 1]$, d_{meta} sólo compara los tiempos de llegada.

$$(d_{\text{meta}}(f, g) = |f(1) - g(1)|; \quad f \neq g \wedge f(1) = g(1) \Rightarrow d_{\text{meta}}(f, g) = 0.)$$

1.5 Distancia a un conjunto, diámetro, acotación

Definición 1.22 ([curso; usada en EJ, Métricos–A.7 y A.9, p. 2, y Continuidad–A.3, p. 12]). Dados (X, d) , subconjuntos no vacíos $A, B \subseteq X$ y $x \in X$:

- distancia de un punto a un conjunto: $d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}$;
- distancia entre conjuntos: $d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$;
- diámetro: $\delta(A) = \sup\{d(a, b) : a, b \in A\}$;
- A es *acotado* si $\delta(A) < \infty$.

$$\begin{aligned} (d(x, A) &= \inf\{d(x, a) : a \in A\}; & d(A, B) &= \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}; \\ \delta(A) &= \sup\{d(a, b) : a, b \in A\}; & A \text{ acotado} &\iff \delta(A) < \infty.) \end{aligned}$$

Observación 1.23 (Por qué ínfimo y no mínimo). $d(x, A)$ se define como un *ínfimo* porque el mínimo puede no existir: en $\mathbb{R}$ con $A = (0, 1)$ y $x = 0$, ninguna $a \in A$ realiza la distancia, y sin embargo $d(0, A) = 0$. Las dos cosas que se usan en toda demostración con $d(x, A)$ son:

- $d(x, A) \leq d(x, a)$ para todo $a \in A$ (es cota inferior);
- para todo $\varepsilon > 0$ existe $a \in A$ con $d(x, a) < d(x, A) + \varepsilon$ (es la *mayor* cota inferior, así que $d(x, A) + \varepsilon$ ya no lo es).

La primera sirve para acotar hacia abajo; la segunda, para fabricar el punto a que hace falta. Lo mismo, dado vuelta, para el supremo en $\delta(A)$. Y es exactamente por esto que $d(x, A) = 0$ no obliga a que x esté en A : sólo dice que hay puntos de A tan cerca como se quiera, es decir que $x \in \bar{A}$.

Proposición 1.24 ($d(\cdot, A)$ es 1-lipschitziana [EJ, Métricos–A.7, p. 2; Continuidad–A.3, p. 12]). Para todos $x, y \in X$: $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$. En consecuencia, $x \mapsto d(x, A)$ es uniformemente continua.

$$\begin{aligned} (\forall x, y \in X : |d(x, A) - d(y, A)| &\leq d(x, y); \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y : d(x, y) < \delta &\Rightarrow |d(x, A) - d(y, A)| < \varepsilon.) \end{aligned}$$

Demostración. Para todo $a \in A$: $d(x, A) \leq d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$. Tomando ínfimo sobre $a \in A$ en el miembro derecho, $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$, es decir $d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y)$. Intercambiando x y y se obtiene la otra desigualdad. Para la continuidad uniforme basta $\delta = \varepsilon$. $\square$




Figura 2. Para cualquier $a \in A$ el camino $x \rightarrow y \rightarrow a$ acota a $d(x, A)$. Como la cota vale para todo a , sobrevive al tomar ínfimo.

Intuición. La función $x \mapsto d(x, A)$ mide “a qué distancia estoy del conjunto A ”. La proposición dice que si me muevo 10 metros, mi distancia a A cambia a lo sumo 10 metros: no puede haber saltos. Ese es el contenido geométrico de *lipschitziana*, y la continuidad uniforme sale gratis porque el δ que sirve ($\delta = \varepsilon$) no depende del punto.

1.6 Bolas

Definición 1.25 ([GT 1.1.18, p. 8]). $B(x, \varepsilon) = \{y \in X : d(x, y) < \varepsilon\}$ (bola abierta), $B[x, \varepsilon] = \{y : d(x, y) \leq \varepsilon\}$ (bola cerrada).

$$(B(x, \varepsilon) = \{y \in X : d(x, y) < \varepsilon\}; \quad B[x, \varepsilon] = \{y \in X : d(x, y) \leq \varepsilon\}.)$$

Ejemplo 1.26 (Bolas de referencia [GT Ejs. 1.1.19–1.1.24, pp. 8–10]).

- En $(\mathbb{R}, |\cdot|)$: $B(x, \varepsilon) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ [GT 1.1.19].
- En $(\mathbb{R}^2, d_e)$: $B(0, \varepsilon) = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 < \varepsilon^2\}$, el disco sin su circunferencia [GT 1.1.20].
- En $(\mathbb{R}^2, d_{\text{taxi}})$: $B(0, \varepsilon) = \{|x_1| + |x_2| < \varepsilon\}$, el cuadrado girado (rombo) sin borde con vértices $(\pm\varepsilon, 0)$, $(0, \pm\varepsilon)$; se ve separando los cuatro cuadrantes, donde la condición es $\pm x_1 \pm x_2 < \varepsilon$ [GT 1.1.21].
- En $(\mathbb{R}^2, d_{\text{max}})$: $B(0, \varepsilon) = \{|x_1| < \varepsilon, |x_2| < \varepsilon\} = (-\varepsilon, \varepsilon)^2$, el cuadrado sin borde de lado 2ε y lados paralelos a los ejes [GT 1.1.22].
- En $(\ell^\infty(\mathbb{R}), d_\infty)$: $B_{d_\infty}(\theta, \varepsilon) = \{f : \sup |f| < \varepsilon\}$ son las funciones cuyo gráfico queda dentro de una franja $[-\varepsilon', \varepsilon']$ con $\varepsilon' < \varepsilon$ [GT 1.1.23].
- En $(\mathbb{R}^2, d_D)$ (discreta): $B(\theta, \varepsilon) = \{\theta\}$ si $\varepsilon \leq 1$ y $B(\theta, \varepsilon) = \mathbb{R}^2$ si $\varepsilon > 1$ [GT 1.1.24].

$$(B_{d_\infty}(\theta, \varepsilon) = \{f : \sup_x |f(x)| < \varepsilon\} \subsetneq \{f : \forall x |f(x)| < \varepsilon\}; \quad B_{d_D}(\theta, \varepsilon) = \begin{cases} \{\theta\} & \varepsilon \leq 1 \\ \mathbb{R}^2 & \varepsilon > 1. \end{cases})$$

Observación 1.27 (Erratas de GT 1.1.20 y 1.1.23). En 1.1.20 el paso intermedio dice $x_1^2 + x_2^2 < \varepsilon$; es $\sqrt{x_1^2 + x_2^2} < \varepsilon$, y el resultado final ($< \varepsilon^2$) es el correcto. En 1.1.23, **GT** identifica $B_{d_\infty}(\theta, \varepsilon)$ con “ $-\varepsilon < f(x) < \varepsilon$ para todo x ” (escrito allí con $|f(x)|$), que es un conjunto *más grande*: $f(x) = \varepsilon \frac{x^2}{1+x^2}$ cumple $|f(x)| < \varepsilon$ en todo punto, pero $\sup |f| = \varepsilon$, así que $f \notin B_{d_\infty}(\theta, \varepsilon)$. Pedir que el supremo sea $< \varepsilon$ es pedir un margen uniforme: el gráfico tiene que caber en una franja estrictamente más angosta.




Figura 3. Una f en la bola $B_{d_\infty}(\theta, \varepsilon)$: su gráfico no sólo queda entre $y = -\varepsilon$ e $y = \varepsilon$, sino dentro de una franja más angosta $[-\varepsilon', \varepsilon']$. Una función que se acerca a la recta $y = \varepsilon$ sin tocarla está a distancia exactamente ε de θ .

Proposición 1.28 (Propiedades de las bolas [GT 1.1.25, p. 10]). En (X, d) :

- $x \in B(x, \varepsilon)$;
- si $y \in B(x, \varepsilon)$, existe $\delta > 0$ con $B(y, \delta) \subseteq B(x, \varepsilon)$ (sirve $\delta = \varepsilon - d(x, y)$);
- $B(x, \varepsilon_1) \cap B(x, \varepsilon_2) = B(x, \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\})$.

$$\begin{aligned} & (x \in B(x, \varepsilon); \quad \forall y \in B(x, \varepsilon) \exists \delta > 0 : B(y, \delta) \subseteq B(x, \varepsilon); \\ & B(x, \varepsilon_1) \cap B(x, \varepsilon_2) = B(x, \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}).) \end{aligned}$$

Teorema 1.29 (Separación de Hausdorff en métricos [GT 1.1.26, p. 11; MS Teo. 2.13, p. 32]). Si (X, d) es métrico y $x \neq x'$, existe $\varepsilon > 0$ con $B(x, \varepsilon) \cap B(x', \varepsilon) = \emptyset$ (basta $\varepsilon = d(x, x')/2$).

$$(\forall x \neq x' \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap B(x', \varepsilon) = \emptyset \quad (\text{sirve } \varepsilon = \frac{d(x, x')}{2}).)$$

Ejemplo 1.30 (En un pseudométrico la separación puede fallar [GT Ej. 1.1.27, p. 11]). En $\mathbb{R}^2$, $d((x, x'), (y, y')) = |x - y|$ es una pseudodistancia (la inducida por la proyección p_1 , que no es inyectiva) y no una distancia: $d((0, 0), (0, 1)) = 0$. Por eso $(0, 1) \in B((0, 0), \varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$, y ninguna bola de $(0, 0)$ es disjunta de ninguna bola de $(0, 1)$: los dos puntos no se pueden separar. En general $B((a, b), \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \times \mathbb{R}$ es una franja vertical, que no distingue puntos de una misma recta vertical. El teorema anterior usa de verdad que $d(x, x') > 0$ para $x \neq x'$.

$$(d((0, 0), (0, 1)) = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : B((0, 0), \varepsilon) \cap B((0, 1), \varepsilon) \ni (0, 1).)$$

2 La topología de un espacio métrico

Definición 2.1 (Interior, abierto, entorno [GT 1.2.1, p. 12]). x es *punto interior* de A si existe $\varepsilon > 0$ con $B(x, \varepsilon) \subseteq A$; $\text{int } A$ es el conjunto de tales puntos. A es *abierto* si $A = \text{int } A$, y N es *entorno* de x si $x \in \text{int } N$.

$$\begin{aligned} & (x \in \text{int } A \iff \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \subseteq A; \\ & A \text{ abierto} \iff A = \text{int } A; \quad N \in \mathcal{N}_x \iff x \in \text{int } N.) \end{aligned}$$

Proposición 2.2 ([GT 1.2.2 y 1.2.6, pp. 12 y 15]). En (X, d) :

- $\text{int } A \subseteq A$;
- toda bola abierta es un conjunto abierto;
- A es abierto $\iff A$ es entorno de todos sus puntos;
- N es entorno de $x \iff$ existe un abierto G con $x \in G \subseteq N$;
- $x \in \text{int } A \iff$ existe un abierto G con $x \in G \subseteq A$.

$$\begin{aligned} & (\text{int } A \subseteq A; \quad B(x, \varepsilon) \text{ es abierto}; \quad A \text{ abierto} \iff \forall x \in A : A \in \mathcal{N}_x; \\ & N \in \mathcal{N}_x \iff \exists G \text{ abierto} : x \in G \subseteq N; \quad x \in \text{int } A \iff \exists G \text{ abierto} : x \in G \subseteq A.) \end{aligned}$$

Proposición 2.3 (Propiedades del interior [GT 1.2.7, p. 15]). Sea (X, d) y sean $A, B, A_1, \dots, A_n \subseteq X$:

- $\text{int } A \subseteq A$;
- si $A \subseteq B$ entonces $\text{int } A \subseteq \text{int } B$;
- $\text{int}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \text{int } A_1 \cap \dots \cap \text{int } A_n$;

- $\text{int}(\text{int } A) = \text{int } A$.

$$\left(\begin{array}{l} \text{int } A \subseteq A; \quad A \subseteq B \Rightarrow \text{int } A \subseteq \text{int } B; \\ \text{int} \left(\bigcap_{k=1}^n A_k \right) = \bigcap_{k=1}^n \text{int } A_k; \quad \text{int}(\text{int } A) = \text{int } A. \end{array} \right)$$

Teorema 2.4 (Propiedades básicas de los abiertos [GT 1.2.8, p. 16; GT Ej. 2.1.2, p. 18]). En (X, d) :

- $\emptyset$ y X son abiertos;
- la intersección finita de abiertos es abierta;
- la unión arbitraria de abiertos es abierta.

Estas tres propiedades son exactamente las que se axiomatizan al definir topología.

$$\left(\emptyset, X \in \tau_d; \quad G_1, \dots, G_n \in \tau_d \Rightarrow \bigcap_{k=1}^n G_k \in \tau_d; \quad \{G_i\}_{i \in I} \subseteq \tau_d \Rightarrow \bigcup_{i \in I} G_i \in \tau_d. \right)$$

Proposición 2.5 (Métricas equivalentes en $\mathbb{R}^n$ [GT 1.2.3–1.2.4, pp. 13–14; GT Nota 2.1.3, p. 19]). d_e , d_{taxi} y d_{max} tienen exactamente los mismos abiertos; la clave son las inclusiones entre bolas del tipo $B_{d_{\text{max}}}(x, \varepsilon/2) \subseteq B_{d_e}(x, \sqrt{2}\varepsilon/2) \subseteq B_{d_{\text{taxi}}}(x, \varepsilon)$. Por lo tanto $\tau_{d_e} = \tau_{d_{\text{taxi}}} = \tau_{d_{\text{max}}}$: distancias distintas pueden dar la misma topología, y esa es la observación que motiva todo el capítulo siguiente.

$$\left(\tau_{d_e} = \tau_{d_{\text{taxi}}} = \tau_{d_{\text{max}}} \right)$$

Proposición 2.6 (El caso de $\mathbb{R}^n$ [GT 1.2.3–1.2.4 y Nota 1.2.5, pp. 13–14]). En $\mathbb{R}^n$ las tres distancias se comparan así: la del máximo es la menor, la del taxi la mayor, y la del taxi no supera n veces la del máximo. En consecuencia las bolas encajan unas en otras, cada bola de una de las tres métricas es abierta para las otras dos, y las tres topologías coinciden.

$$\left(\begin{array}{l} d_{\text{max}} \leq d_e \leq d_{\text{taxi}} \leq n d_{\text{max}}; \\ B_{d_{\text{taxi}}}(x, \varepsilon) \subseteq B_{d_e}(x, \varepsilon) \subseteq B_{d_{\text{max}}}(x, \varepsilon) \subseteq B_{d_{\text{taxi}}}(x, n\varepsilon); \quad \tau_{d_e} = \tau_{d_{\text{taxi}}} = \tau_{d_{\text{max}}} \end{array} \right)$$

Demostración. Sea $u_i = |x_i - y_i|$ y $M = \max_i u_i$. Como M es uno de los u_i : $M^2 \leq \sum_i u_i^2$, o sea $d_{\text{max}} \leq d_e$. Desarrollando el cuadrado, $(\sum_i u_i)^2 = \sum_i u_i^2 + \sum_{i \neq j} u_i u_j \geq \sum_i u_i^2$, o sea $d_e \leq d_{\text{taxi}}$. Y $\sum_i u_i \leq nM$. Las inclusiones de bolas son estas desigualdades leídas al revés (si la distancia mayor es $< \varepsilon$, la menor también). Para las topologías: si A es abierto para una de las métricas y $x \in A$, hay una bola de esa métrica alrededor de x dentro de A , y la cadena de inclusiones mete dentro de ella una bola de cualquiera de las otras dos (achicando el radio a ε/n cuando hace falta). Luego x es interior a A en las tres. Como corolario, cada bola de una métrica, al ser abierta en ella, es abierta en las otras dos (GT 1.2.4). $\square$

2.1 Adherencia, frontera y cerrados en un espacio métrico

Estas nociones se definen en general para espacios topológicos (§3); en un espacio métrico todas se leen con bolas, y esa es la forma en que aparecen en los ejercicios y en los parciales. Cada enunciado de acá es el de §3 con “todo abierto que contiene a x ” reemplazado por “toda bola de centro x ”, que es lo mismo porque las bolas son base local.

Definición 2.7 (Punto adherente, clausura [GT 2.3.4 y 2.3.6, pp. 22–23, leídos con bolas]). x es *adherente* a A si toda bola de centro x corta a A . La *clausura* (o *adherencia*) $\overline{A}$ es el conjunto de los puntos adherentes a A .

$$(x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.)$$

Definición 2.8 (Punto de acumulación, punto aislado [GT 2.2.7 y 2.3.1, pp. 21–22, leídos con bolas]). x es de *acumulación* de A si toda bola de centro x corta a A en algún punto distinto de x ; el conjunto de todos ellos es el *derivado* A' . Un punto $x \in A$ es *aislado* si alguna bola de centro x no contiene otros puntos de A .

$$\begin{aligned} (x \in A' &\iff \forall \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset; \\ x \text{ aislado de } A &\iff x \in A \wedge \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap A = \{x\}.) \end{aligned}$$

Proposición 2.9 (En un métrico, acumular es tener infinitos puntos cerca [GT 2.3.2, pp. 21–22]). Sea (X, d) métrico, $A \subseteq X$ y $x \in X$. Entonces x es punto de acumulación de A si y sólo si todo abierto G que contiene a x contiene infinitos puntos de A (equivalentemente, toda bola de centro x contiene infinitos puntos de A).

$$(x \in A' \iff \forall G \in \tau_d (x \in G \Rightarrow G \cap A \text{ es infinito}).)$$

Demostración. ($\Leftarrow$) Si $G \ni x$ tiene infinitos puntos de A , al sacar x quedan infinitos, así que $(G - \{x\}) \cap A \neq \emptyset$. ($\Rightarrow$) Por el absurdo: sea $G \ni x$ abierto con $G \cap A$ finito. Entonces $F = (G \cap A) - \{x\}$ es finito. Tomo $r > 0$ con $B(x, r) \subseteq G$ y, si $F = \{a_1, \dots, a_k\} \neq \emptyset$, lo achico para que además $r \leq \min_i d(x, a_i)$, que es positivo porque cada $a_i \neq x$ y d es distancia. Entonces $(B(x, r) - \{x\}) \cap A \subseteq F$ y ningún a_i está en la bola (todos están a distancia $\geq r$): la intersección es vacía, contra $x \in A'$. $\square$

Observación 2.10 (Sobre el enunciado y la hipótesis). **GT** escribe “todo abierto G ” donde debe decir “todo abierto G que contiene a x ”; y demuestra ($\Rightarrow$) fabricando una sucesión de puntos distintos con radios que se van achicando a la mitad, que es la misma idea. Lo que se usa del espacio métrico es que $d(x, a) > 0$ si $a \neq x$ (en el fondo, que los finitos son cerrados). Sin eso falla: en $X = \{a, b\}$ indiscreto, $A = \{b\}$, el punto a es de acumulación de A y A es finito. De esta proposición sale el Cor. 2.3.3: en un métrico, un conjunto finito no tiene puntos de acumulación, y todos sus puntos son aislados.

Definición 2.11 (Frontera y exterior [GT 2.6.1 y 2.6.4, p. 29, leídos con bolas]). $x \in \text{fr } A$ si toda bola de centro x corta a la vez a A y a $X - A$. $x \in \text{ext } A$ si alguna bola de centro x no toca A .

$$\begin{aligned} (x \in \text{fr } A &\iff \forall \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset \wedge B(x, \varepsilon) \cap (X - A) \neq \emptyset; \\ x \in \text{ext } A &\iff \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap A = \emptyset.) \end{aligned}$$

Definición 2.12 (Conjunto cerrado, conjunto denso [GT 1.2.8 y 2.6.7, pp. 16 y 31]). $C \subseteq X$ es *cerrado* si $X - C$ es abierto. $D \subseteq X$ es *denso* si toda bola de X corta a D .

$$(C \text{ cerrado} \iff X - C \in \tau_d; \quad D \text{ denso} \iff \forall x \in X \forall \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap D \neq \emptyset \iff \overline{D} = X.)$$

Proposición 2.13 (La clausura, medida con la distancia [consecuencia de GT 1.1.18 y 2.3.4; parcial 2/10/2023, ej. 3]). En un espacio métrico (X, d) , para todo $\emptyset \neq A \subseteq X$:

$$\overline{A} = \{x \in X : d(x, A) = 0\}.$$

Equivalentemente, $x \notin \overline{A} \iff d(x, A) > 0$.

Demostración. $\subseteq$: si $x \in \overline{A}$, toda bola $B(x, \varepsilon)$ corta a A , luego existe $a \in A$ con $d(x, a) < \varepsilon$; entonces $d(x, A) < \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, o sea $d(x, A) = 0$. $\supseteq$: si $d(x, A) = 0$, dado $\varepsilon > 0$ el ínfimo no es cota inferior estricta, así que existe $a \in A$ con $d(x, a) < \varepsilon$; luego toda bola de centro x corta a A y x es adherente. La clave es que $d(x, A)$ es un *ínfimo*: vale 0 sin necesidad de que se alcance, y por eso x puede estar en $\overline{A}$ sin estar en A . $\square$

Corolario 2.14. Sea $\emptyset \neq A \subseteq (X, d)$. Entonces A es cerrado $\iff (d(x, A) = 0 \Rightarrow x \in A)$ para todo $x \in X$. Y $\overline{A} = f^{-1}(0)$ para la función continua $f(x) = d(x, A)$, lo que da otra prueba de que la clausura es cerrada.

Proposición 2.15 (Caracterizaciones de “cerrado” en un métrico [GT 2.4.2, p. 24; GT 2.5.6–2.5.7, p. 28]). Para $A \subseteq (X, d)$ son equivalentes:

- A es cerrado (su complemento es abierto);
- $A = \overline{A}$, es decir A contiene todos sus puntos adherentes;
- $A' \subseteq A$, es decir A contiene todos sus puntos de acumulación;
- toda sucesión de puntos de A que converge en X tiene su límite en A ;
- $d(x, A) = 0 \Rightarrow x \in A$.

$$\begin{aligned} & (A \text{ cerrado} \iff X - A \in \tau_d \iff A = \overline{A} \iff A' \subseteq A \\ & \iff \forall \{a_n\} \subseteq A (a_n \rightarrow x \Rightarrow x \in A) \iff \forall x (d(x, A) = 0 \Rightarrow x \in A).) \end{aligned}$$

Intuición. Las cinco versiones dicen lo mismo desde ángulos distintos, y en un parcial conviene elegir la que menos cuentas pida: si el conjunto viene dado por una condición con $\leq$ o $\geq$, sale por complemento abierto; si viene de un límite o de una sucesión, por (4); si aparece una distancia, por (5). En espacios topológicos generales sólo sobreviven (1), (2) y (3): la (4) y la (5) necesitan la métrica.

Proposición 2.16 (Supremo e ínfimo son adherentes [GT Ej. 2.3.7, p. 23]). Sea $\emptyset \neq A \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$. Si A está acotado inferiormente, su ínfimo es adherente a A ; si está acotado superiormente, su supremo es adherente a A . En particular, un cerrado no vacío y acotado de $\mathbb{R}$ tiene mínimo y máximo.

$$\begin{aligned} & (A \neq \emptyset \text{ acotado inferiormente} \Rightarrow \inf A \in \overline{A}; \quad A \neq \emptyset \text{ acotado superiormente} \Rightarrow \sup A \in \overline{A}; \\ & A \neq \emptyset \text{ cerrado y acotado} \Rightarrow \inf A = \min A \wedge \sup A = \max A.) \end{aligned}$$

Demostración. Sea $x_0 = \inf A$ y $\varepsilon > 0$. Como $x_0 + \varepsilon$ ya no es cota inferior, hay $a \in A$ con $x_0 \leq a < x_0 + \varepsilon$; entonces $a \in B(x_0, \varepsilon) \cap A$. Toda bola de centro x_0 corta a A , o sea $x_0 \in \overline{A}$. Con el supremo es igual, con $a \in A$ tal que $\sup A - \varepsilon < a \leq \sup A$. Si además A es cerrado, $\overline{A} = A$ y el ínfimo y el supremo son elementos de A , es decir, mínimo y máximo. $\square$

Observación 2.17. Es exactamente la segunda propiedad del ínfimo de la Observación “Por qué ínfimo y no mínimo”, leída como “toda bola corta a A ”. Se usa en la prueba de que $[a, b]$ es conexo (§10.6). La demostración de **GT** tiene dos descuidos de tipeo: escribe $a_{\varepsilon/2}$ donde va $a_{\varepsilon_0/2}$, y concluye “ $x_0 \in A$ ” donde va $x_0 \in \overline{A}$.

3 Espacios topológicos

Definición 3.1 (Topología [GT 2.1.1, p. 18; MS Def. 2.1, p. 23]). $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una *topología* si:

- $\emptyset, X \in \tau$;
- τ es cerrada por intersecciones finitas;
- τ es cerrada por uniones arbitrarias.

Los elementos de τ son los *abiertos*; $C \subseteq X$ es *cerrado* si $X - C \in \tau$.

$$\begin{aligned} (\tau \text{ topología} \iff \emptyset, X \in \tau \wedge \left(\{G_i\}_{i \in I} \subseteq \tau \Rightarrow \bigcup_{i \in I} G_i \in \tau \right) \wedge \left(G_1, \dots, G_n \in \tau \Rightarrow \bigcap_{k=1}^n G_k \in \tau \right); \\ C \text{ cerrado} \iff X - C \in \tau.) \end{aligned}$$

Lema 3.2 (Propiedades de los cerrados [MS Lema 2.1, p. 25; GT 2.4.4, p. 25]). Sea (X, τ) , sea $\{C_i\}_{i \in I}$ una familia de cerrados y $C_1, \dots, C_n$ cerrados:

- $\emptyset$ y X son cerrados;
- la unión finita de cerrados es cerrada;
- la intersección arbitraria de cerrados es cerrada.

Proposición 3.3 (La cofinita no es metrizable [GT 2.1.4–2.1.5, p. 19]). Sea $\tau_{cof} = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X : X - A \text{ es finito}\}$ la topología cofinita (o de Zariski) sobre X , cuyos cerrados son X y los subconjuntos finitos. Si X es infinito, no existe distancia d sobre X con $\tau_d = \tau_{cof}$.

Demostración. Por el absurdo: si existiera, dados $x \neq x'$ la separación de Hausdorff da $\varepsilon > 0$ con $B(x, \varepsilon) \cap B(x', \varepsilon) = \emptyset$. Pasando a complementos, $X = (X - B(x, \varepsilon)) \cup (X - B(x', \varepsilon))$ sería unión de dos conjuntos finitos (finitos por ser complementos de abiertos no vacíos de τ_{cof}), luego X sería finito. Contradicción. $\square$

Observación 3.4. Esta es la demostración modelo de *no metrizabilidad*: se exhibe una propiedad que todo espacio métrico tiene (Hausdorff) y que el espacio dado no tiene.

Proposición 3.5 (Tampoco con una pseudodistancia [GT Nota 2.1.6, p. 19]). Si X es infinito, tampoco existe una pseudodistancia d sobre X cuyos abiertos sean los de la topología cofinita.

$$(X \text{ infinito} \Rightarrow \neg \exists d \text{ pseudodistancia en } X : \tau_d = \tau_{cof}.)$$

Demostración. Supongamos $\tau_d = \tau_{cof}$. Si hubiera x, x' con $\lambda = d(x, x') > 0$, las bolas $B(x, \lambda/2)$ y $B(x', \lambda/2)$ serían disjuntas (la cuenta de la separación de Hausdorff sólo usa la triangular) y no vacías; como son abiertas, sus complementos serían finitos y, como en la proposición anterior, X sería finito. Luego $d(x, x') = 0$ para todos x, x' , cada bola es todo X y $\tau_d = \{\emptyset, X\}$. Pero, fijado $x_0 \in X$, el conjunto $X - \{x_0\}$ está en τ_{cof} y no es ni $\emptyset$ (porque X es infinito) ni X . Contradicción. $\square$

3.1 Interior, clausura, acumulación, frontera

Definición 3.6 (Interior y entorno [GT 2.2.1 y 2.2.5, pp. 20–21]). $x \in \text{int } A$ si existe $G \in \tau$ con $x \in G \subseteq A$. N es *entorno* de x si $x \in \text{int } N$; $\mathcal{N}_x$ denota el sistema de entornos de x .

Lema 3.7 ([MS Lema 3.1, p. 39; GT 2.2.3, p. 20]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$. Entonces $\text{int } A$ es abierto y es el mayor abierto contenido en A ; es decir $\text{int } A = \bigcup \{G \in \tau : G \subseteq A\}$. En particular $A \in \tau \iff A = \text{int } A$.

Proposición 3.8 (Abierto es ser entorno de todos sus puntos [GT 2.2.6, p. 21]). En (X, τ) , un conjunto A es abierto si y sólo si es entorno de cada uno de sus puntos.

$$(A \in \tau \iff \forall x \in A : A \in \mathcal{N}_x.)$$

Demostración. Ser entorno de x es $x \in \text{int } A$. Entonces “ A es entorno de todos sus puntos” dice $A \subseteq \text{int } A$, y como siempre $\text{int } A \subseteq A$, equivale a $A = \text{int } A$, que por el lema anterior equivale a $A \in \tau$. $\square$

Proposición 3.9 (Propiedades del interior [GT 2.2.4, p. 20; ítem 1: GT Nota 2.2.2, p. 20; MS Teo. 3.3, p. 40]). Sea (X, τ) y sean $A, B \subseteq X$:

- $\text{int } A \subseteq A$;
- $A \subseteq B \Rightarrow \text{int } A \subseteq \text{int } B$;
- $\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B$;
- $\text{int}(\text{int } A) = \text{int } A$;
- $\text{int } A \cup \text{int } B \subseteq \text{int}(A \cup B)$, con inclusión en general estricta.

Definición 3.10 (Punto aislado, de acumulación, adherente [GT 2.2.7, 2.3.1, 2.3.4, pp. 21–22]).

- $x \in A$ es *aislado* si existe $G \in \tau$ con $G \cap A = \{x\}$;
- x es de *acumulación* de A si todo abierto que contiene a x corta a $A - \{x\}$; el conjunto de todos ellos es el *derivado* A' ;
- x es *adherente* a A si todo abierto que contiene a x corta a A .

$$\begin{aligned} (x \text{ aislado de } A &\iff x \in A \wedge \exists G \in \tau : G \cap A = \{x\}; \\ x \in A' &\iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset); \\ x \text{ adherente a } A &\iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap A \neq \emptyset).) \end{aligned}$$

Definición 3.11 (Clausura [GT 2.3.6, p. 23]). $\overline{A} = \{x \in X : x \text{ es adherente a } A\}$.

$$(\overline{A} = \{x \in X : \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap A \neq \emptyset)\}.)$$

Lema 3.12 ([MS Lema 3.6, p. 41; GT Nota 2.3.5, p. 22]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$. Entonces $\overline{A}$ es cerrado y es el menor cerrado que contiene a A : $\overline{A} = \bigcap \{C \text{ cerrado} : A \subseteq C\}$. En particular A es cerrado $\iff A = \overline{A}$. Además $\overline{A} = A \cup A'$ [GT 2.3.8, p. 23].

Teorema 3.13 (Dualidad interior/clausura [GT 2.4.1, p. 24]). Para todo $A \subseteq X$:

$$\overline{A} = X - \text{int}(X - A), \quad \text{int } A = X - \overline{X - A}.$$

Demostración. $x \notin \text{int}(X - A) \iff$ ningún abierto G con $x \in G$ cumple $G \subseteq X - A \iff$ todo abierto que contiene a x corta a $A \iff x \in \overline{A}$. La segunda identidad es la primera aplicada a $X - A$. $\square$

Observación 3.14. Toda propiedad del interior tiene su dual para la clausura y viceversa; en el examen conviene explotar esto en vez de repetir demostraciones. Por ejemplo, de $\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B$ sale $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Proposición 3.15 (Propiedades de la clausura [GT 2.4.3, p. 24; MS Teo. 3.8, p. 41]). Sea (X, τ) y sean $A, B \subseteq X$:

- $A \subseteq \overline{A}$;
- $A \subseteq B \Rightarrow \overline{A} \subseteq \overline{B}$;
- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$;
- $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$;
- $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$, en general estricta.

Proposición 3.16 (Dualidad abierto/cerrado [GT 2.4.2, p. 24]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$. Entonces A es abierto $\iff X - A$ es cerrado.

Definición 3.17 (Frontera y exterior [GT 2.6.1 y 2.6.4, p. 29]). $x \in \text{fr } A$ si todo abierto que contiene a x corta a A y a $X - A$. $x \in \text{ext } A$ si $x \in \text{int}(X - A)$.

$$\begin{aligned} (x \in \text{fr } A &\iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap A \neq \emptyset \wedge G \cap (X - A) \neq \emptyset); \\ x \in \text{ext } A &\iff x \in \text{int}(X - A).) \end{aligned}$$

Teorema 3.18 (Propiedades de la frontera [GT 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, pp. 29–30; MS Teo. 3.14, p. 44]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$:

- $\text{fr } A = \overline{A} \cap \overline{X - A} = \overline{A} - \text{int } A$;
- $\text{fr } A$ es cerrado;
- $\text{fr } A = \text{fr}(X - A)$;
- $X = \text{int } A \dot{\cup} \text{fr } A \dot{\cup} \text{ext } A$ (unión disjunta);
- $\overline{A} = A \cup \text{fr } A = \text{int } A \cup \text{fr } A$.




Figura 4. X queda partido en tres pedazos disjuntos: interior, frontera y exterior. La frontera es el conjunto de puntos “indecisos”: por más chico que se tome el entorno, siempre se ve algo de adentro y algo de afuera.

Intuición. $\text{int } A$ = “estoy adentro con margen”; $\text{ext } A$ = “estoy afuera con margen”; $\text{fr } A$ = “estoy justo en el borde”. Un conjunto es abierto cuando no contiene nada de su borde, cerrado cuando lo contiene todo, y abierto-cerrado a la vez cuando directamente *no tiene* borde (Prop. 3.20). Ojo: la frontera no siempre es una curva fina; $\text{fr } \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ en la recta usual, porque ningún intervalo evita a los racionales ni a los irracionales.

Ejemplo 3.19 (Interior, clausura y frontera en la recta y en $C[-1, 1]$ [GT Ej. 2.6.6, pp. 30–31]).

- En $(\mathbb{R}, \tau_u)$: $\text{int } \mathbb{Z} = \emptyset$, porque todo intervalo alrededor de un entero tiene puntos no enteros; $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$, porque el complemento $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ es la unión de los intervalos abiertos $(n, n + 1)$; y $\text{fr } \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. Así $\mathbb{Z}$ es cerrado y no abierto.
- Si $a < b$, los cuatro intervalos $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$ tienen interior (a, b) , clausura $[a, b]$ y frontera $\{a, b\}$. Luego $[a, b]$ es cerrado y no abierto, (a, b) es abierto y no cerrado, y $[a, b)$, $(a, b]$ no son ni una cosa ni la otra.

- (c) El conjunto de Cantor $\mathcal{C} = \bigcap_{n \geq 1} A_n$, con $A_1 = [0, 1]$ y A_{n+1} obtenido de A_n quitando el tercio central abierto de cada uno de sus intervalos, es cerrado: cada A_n es unión finita de intervalos cerrados, y una intersección de cerrados es cerrada.
- (d) En $X = C[-1, 1]$ con d_∞ , el conjunto D de las funciones derivables no es cerrado: $f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n^2}$ es derivable, y $0 \leq f_n(x) - |x| \leq \frac{1}{n}$ da $d_\infty(f_n, |x|) \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, pero $|x| \notin D$. De hecho $\overline{D} = X$: toda continua es límite uniforme de derivables (se puede demostrar, por ejemplo con el teorema de aproximación de Weierstrass; no se hace en el curso).

$$\left(\begin{array}{l} \text{int } \mathbb{Z} = \emptyset, \overline{\mathbb{Z}} = \text{fr } \mathbb{Z} = \mathbb{Z}; \quad \text{int}[a, b] = (a, b), \overline{(a, b)} = [a, b], \text{fr}[a, b] = \{a, b\}; \\ f_n \in D, d_\infty(f_n, |x|) \leq \frac{1}{n}, |x| \notin D \Rightarrow D \neq \overline{D}. \end{array} \right)$$



Figura 5. Las primeras etapas del conjunto de Cantor. Cada A_n es unión finita de intervalos cerrados; $\mathcal{C}$ es lo que sobrevive a todas las etapas.

Proposición 3.20 (Caracterización de los abiertos-cerrados [EJ, Top-A.11, p. 7]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$. Entonces A es simultáneamente abierto y cerrado $\iff \text{fr } A = \emptyset$.

Demostración. Si A es abierto y cerrado, $\text{int } A = A = \overline{A}$, luego $\text{fr } A = \overline{A} - \text{int } A = \emptyset$. Recíprocamente, si $\text{fr } A = \emptyset$ entonces $\overline{A} = \text{int } A$; como siempre $\text{int } A \subseteq A \subseteq \overline{A}$, resulta $A = \text{int } A = \overline{A}$, o sea A abierto y cerrado. $\square$

Definición 3.21 (Denso [GT 2.6.7, p. 31]). A es denso en (X, τ) si $\overline{A} = X$.

Proposición 3.22 (Caracterización de la densidad [EJ, Top-A.13, p. 7; MS Lema 3.11, p. 42]). Sea (X, τ) y $A \subseteq X$. Entonces A es denso en $X \iff A \cap G \neq \emptyset$ para todo abierto $G \neq \emptyset \iff \text{int}(X - A) = \emptyset$.

Demostración. Si A es denso y $G \neq \emptyset$ es abierto, tomando $x \in G$ se tiene $x \in \overline{A}$, luego $G \cap A \neq \emptyset$ por definición de punto adherente. Recíprocamente, si todo abierto no vacío corta a A , entonces todo $x \in X$ está en $\overline{A}$. La segunda equivalencia es la dualidad: $\overline{A} = X \iff X - \text{int}(X - A) = X$. $\square$

Proposición 3.23 (La frontera de un abierto tiene interior vacío [parcial 2/10/2023, ej. 2b]). Si $A \in \tau$ (o si A es cerrado), entonces $\text{int}(\text{fr } A) = \emptyset$.

Demostración. Sea A abierto. Entonces $A \cap \text{fr } A = \emptyset$, porque $\text{fr } A = \overline{A} - \text{int } A = \overline{A} - A$. Si existiera $x \in \text{int}(\text{fr } A)$, habría un abierto G con $x \in G \subseteq \text{fr } A \subseteq \overline{A}$; como $x \in \overline{A}$ y G es un abierto que lo contiene, $G \cap A \neq \emptyset$, contra $\text{fr } A \cap A = \emptyset$. Para A cerrado se aplica lo anterior a $X - A$, usando $\text{fr } A = \text{fr}(X - A)$. $\square$

Observación 3.24 (Hace falta la hipótesis). Sin suponer A abierto o cerrado el enunciado es falso: en $(\mathbb{R}, \tau_u)$ con $A = \mathbb{Q}$ es $\text{fr } \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ y $\text{int}(\text{fr } \mathbb{Q}) = \mathbb{R} \neq \emptyset$.

Definición 3.25 (Operadores de Kuratowski [EJ, Top-D.2, p. 8]). $i(A) = \text{int}(\overline{A}) = (\overline{A})^\circ$ y $c(A) = \overline{\text{int } A} = \overline{A}^\circ$.

Observación 3.26 ($i(A)$ y $c(A)$ no coinciden). La igualdad $(\overline{A})^\circ = \overline{A}^\circ$ es falsa en general, y tampoco hay inclusión en ninguno de los dos sentidos: en $(\mathbb{R}, \tau_u)$, con $A = (0, 1) \cup (1, 2) \cup \{3\} \cup ([4, 5] \cap \mathbb{Q})$ resulta $i(A) = (0, 2) \cup (4, 5)$ y $c(A) = [0, 2]$, de modo que $0 \in c(A) - i(A)$ y $4, 5 \in i(A) - c(A)$. Sí valen $i \circ i = i$ y $c \circ c = c$, y las inclusiones $\text{int } A \subseteq c(A)$ e $i(A) \subseteq \overline{A}$.

Proposición 3.27 (Puntos y cerrados en métricos [EJ, Top-A.12, p. 7; GT Cor. 2.3.3, p. 22]). En (X, d) , todo conjunto unitario (y por ende todo conjunto finito) es cerrado; equivalentemente, $X - \{x\}$ es abierto. En particular, en un espacio métrico todos los puntos de un conjunto finito son aislados.

Demostración. Si $y \neq x$, la bola $B(y, d(x, y))$ está contenida en $X - \{x\}$; luego $X - \{x\}$ es entorno de todos sus puntos, o sea abierto. $\square$

4 Bases, subbases y comparación de topologías

Definición 4.1 (Comparación [EJ, Ej. teórico N° 2, p. 9; Munkres §13]). Dadas τ, τ' sobre X , se dice que τ' es más fina que τ si $\tau \subseteq \tau'$. Es un orden parcial: hay topologías no comparables.

Definición 4.2 (Base de una topología dada [MS Def. 2.4, p. 25]). Sea (X, τ) un espacio topológico. $\beta \subseteq \tau$ es base de τ si

$$\forall U \in \tau \forall x \in U \exists B \in \beta : x \in B \subseteq U.$$

Definición 4.3 (Base para una topología, y topología generada [MS Def. 2.4, p. 25; EJ p. 9]). Sea X un conjunto (sin topología dada todavía). $\beta \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una base si cumple:

- (B1) todo $x \in X$ pertenece a algún $B \in \beta$;
- (B2) si $x \in B_1 \cap B_2$ con $B_1, B_2 \in \beta$, existe $B_3 \in \beta$ con $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

En ese caso se define la topología generada por β como

$$\tau_\beta = \{U \subseteq X : \forall x \in U \exists B \in \beta, x \in B \subseteq U\}.$$

Teorema 4.4 (Criterio de base [MS Teo. 2.3, p. 26; EJ Ej. teórico N° 2.1–2.2, p. 9]). Sea X un conjunto y $\beta \subseteq \mathcal{P}(X)$. Entonces β es base de alguna topología sobre X si y sólo si cumple (B1) y (B2); en ese caso τ_β es efectivamente una topología, β es base de τ_β en el sentido de la Definición anterior, y

$$\tau_\beta = \left\{ \bigcup_{i \in I} B_i : \{B_i\}_{i \in I} \subseteq \beta \right\},$$

es decir, la topología generada coincide con la colección de todas las uniones de elementos de β [MS Lema 2.2, p. 25].

Idea de la demostración. Que τ_β es topología: $\emptyset$ y X salen de (B1); la unión es inmediata de la definición puntual; para $U_1 \cap U_2$, dado x en la intersección hay B_1, B_2 con $x \in B_i \subseteq U_i$, y (B2) provee $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2 \subseteq U_1 \cap U_2$. La igualdad con las uniones: todo $U \in \tau_\beta$ es $U = \bigcup_{x \in U} B_x$; recíprocamente toda unión de básicos está en τ_β . $\square$

Teorema 4.5 (Reconocer una base dentro de una topología [EJ, Ej. teórico N° 2.3, p. 10; MS Lema 2.11, p. 30; Munkres Lema 13.2]). Sea (X, τ) y $\mathcal{C} \subseteq \tau$ una colección de abiertos tal que para todo $U \in \tau$ y todo $x \in U$ existe $C \in \mathcal{C}$ con $x \in C \subseteq U$. Entonces $\mathcal{C}$ es base de τ .

Intuición. Una base es una “lista de piezas de repuesto”: en lugar de describir todos los abiertos, se describen unos pocos con los que se pueden armar todos los demás por unión. Como en el armado solo importa poder encajar una pieza chica alrededor de cada punto, dos listas de piezas de formas totalmente distintas pueden armar exactamente los mismos objetos.



$$\forall U \text{ abierto}, \forall x \in U, \exists B \in \beta : x \in B \subseteq U \qquad \text{bola} \supseteq \text{cuadrado} \supseteq \text{bola}$$

Figura 6. Izquierda: qué pide ser base. Derecha: por qué bolas y cuadrados generan la misma topología en $\mathbb{R}^2$ — cada básico de un tipo contiene, alrededor de cada uno de sus puntos, un básico del otro tipo. Ese es literalmente el criterio de comparación (Teo. 4.7) aplicado en las dos direcciones.

Ejemplo 4.6. Con este criterio se ve de inmediato que en $\mathbb{R}^2$ las bolas euclídeas, los cuadrados abiertos y los rombos abiertos son todos bases de la *misma* topología usual: a diferencia del álgebra lineal, las bases no son únicas ni tienen “dimensión” [EJ p. 10].

Teorema 4.7 (Comparación mediante bases [MS Teo. 2.4 y Cor. 2.5, p. 27; EJ Ej. teórico N° 2.4, p. 10]). Sean β y β' bases de τ y τ' . Entonces $\tau \subseteq \tau'$ (τ' más fina) si y sólo si

$$\forall x \in X, \forall B \in \beta \text{ con } x \in B, \exists B' \in \beta' \text{ tal que } x \in B' \subseteq B.$$

En consecuencia $\tau = \tau'$ si y sólo si vale la condición en ambas direcciones.

Demostración. ($\Rightarrow$) Si $B \in \beta \subseteq \tau \subseteq \tau'$ y $x \in B$, como β' es base de τ' existe $B' \in \beta'$ con $x \in B' \subseteq B$. ($\Leftarrow$) Sea $U \in \tau$ y $x \in U$; hay $B \in \beta$ con $x \in B \subseteq U$ y, por hipótesis, $B' \in \beta'$ con $x \in B' \subseteq B \subseteq U$; luego $U \in \tau'$. $\square$

Definición 4.8 (Subbase [MS Lema 2.6, p. 27]). $\sigma \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una *subbase* si $\bigcup_{S \in \sigma} S = X$. La topología generada por la subbase σ es la generada por la base del lema siguiente.

Lema 4.9 (Una subbase genera una base [MS Lema 2.6, p. 27; EJ Ej. teórico N° 2.6, p. 10]). Si σ es una subbase, la colección de intersecciones finitas de elementos de σ cumple (B1) y (B2), luego es base de una topología, y esa topología es la menos fina que contiene a σ .

$$\left(\sigma \text{ subbase} \Rightarrow \left\{ \bigcap_{k=1}^n S_k : S_k \in \sigma, n \in \mathbb{N} \right\} \text{ es base}; \right. \\ \left. \tau_\sigma = \min\{\tau : \sigma \subseteq \tau\}. \right)$$

Ejemplo 4.10 (Sorgenfrey [MS Ejemplos 2.4(7), p. 26]). $\beta_{\text{sor}} = \{[a, b) : a < b\}$ genera la recta de Sorgenfrey, también estrictamente más fina que la usual, y en la que cada $[a, b)$ es a la vez abierto y cerrado.

4.1 Entornos y bases de entornos

Teorema 4.11 (Axiomas de entorno [MS Teo. 2.7, p. 28]). Sea (X, τ) y $x \in X$. El sistema de entornos $\mathcal{N}_x = \{N \subseteq X : x \in \text{int } N\}$ verifica:

- (N1) si $N \in \mathcal{N}_x$ entonces $x \in N$;
- (N2) si $N \in \mathcal{N}_x$ y $N \subseteq M$ entonces $M \in \mathcal{N}_x$;
- (N3) $\mathcal{N}_x$ es cerrado por intersecciones finitas;
- (N4) si $N \in \mathcal{N}_x$, existe $M \in \mathcal{N}_x$ con $M \subseteq N$ tal que $N \in \mathcal{N}_y$ para todo $y \in M$.

Definición 4.12 (Base local [MS Teo. 2.8, p. 29]). $\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{N}_x$ es *base de entornos* (o *base local*) en x si todo entorno de x contiene algún elemento de $\mathcal{B}_x$.

$$(\mathcal{B}_x \text{ base local en } x \iff \forall N \in \mathcal{N}_x \exists B \in \mathcal{B}_x : B \subseteq N.)$$

Proposición 4.13 (Bases locales que siempre sirven [MS Lema 2.9, p. 30]). Sea (X, τ) y $x \in X$:

- la familia de los entornos abiertos de x es base local en x , en cualquier espacio topológico;
- en un espacio métrico, $\{B(x, 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$ es base local en x (base local numerable).

Teorema 4.14 (La familia de bolas es base [MS Teo. 2.14, p. 32]). En (X, d) , $\{B(x, r) : x \in X, r > 0\}$ es base de una topología sobre X , llamada topología métrica τ_d . Un espacio (X, τ) es metrizable si existe d con $\tau = \tau_d$.

5 Axiomas de separación T_0, T_1, T_2

Definición 5.1 ([EJ, Ejercicios teóricos T_0, T_1 , Hausdorff, p. 11; GT 2.5.3, p. 27]). Sea (X, τ) y $x \neq y$ en X .

- X es T_0 si existe un abierto que contiene a uno de los dos y no al otro.
- X es T_1 si existe un abierto U con $x \in U, y \notin U$ y un abierto V con $y \in V, x \notin V$.
- X es T_2 (Hausdorff) si existen abiertos disjuntos $U \ni x, V \ni y$.

$$\begin{aligned} (T_0 : \forall x \neq y \exists U \in \tau : (x \in U \wedge y \notin U) \vee (y \in U \wedge x \notin U); \\ T_1 : \forall x \neq y \exists U, V \in \tau : (x \in U \wedge y \notin U) \wedge (y \in V \wedge x \notin V); \\ T_2 : \forall x \neq y \exists U, V \in \tau : x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \emptyset.) \end{aligned}$$




Figura 7. Los tres niveles de separación. Cada uno pide un poco más que el anterior: $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$.

Intuición. La pregunta de fondo es “¿cuánto puede la topología distinguir dos puntos distintos?”. En la cofinita se pueden aislar puntos (T_1) pero los abiertos son tan enormes que dos cualesquiera se cortan, así que no hay T_2 ; ahí es donde se rompe la unicidad del límite de una sucesión. En un espacio métrico las bolas de radio $d(x, y)/2$ hacen el trabajo automáticamente, y por eso todo métrico es T_2 .

Proposición 5.2 (Jerarquía [EJ, Ej. teórico 3, p. 11]). Para todo espacio topológico (X, τ) : $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$, y ninguna recíproca vale.

Ejemplo 5.3 (Contraejemplos de las recíprocas). • T_1 pero no T_2 : (X, τ_{cof}) con X infinito. Los cerrados son los finitos, luego los puntos son cerrados y el espacio es T_1 ; pero dos abiertos no vacíos cualesquiera se cortan (sus complementos son finitos y X es infinito), luego no es T_2 .

- T_0 pero no T_1 : el espacio de Sierpiński $X = \{a, b\}$, $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}\}$; o el espacio del ejercicio 2 de la guía, $X = \{a, b, c\}$ con $\tau = \{\emptyset, X, \{a, b\}, \{a\}\}$, en el cual $\{a\}$ no es cerrado [EJ, Ej. teórico 2 y 3d, p. 11].

Teorema 5.4 (Caracterización de T_1 [EJ, Ej. teórico 4, p. 11]). Sea (X, τ) un espacio topológico. Entonces (X, τ) es $T_1 \iff \{x\}$ es cerrado para todo $x \in X$.

Demostración. $\{x\}$ es cerrado $\iff X - \{x\}$ es abierto $\iff X - \{x\}$ es entorno de todos sus puntos $\iff$ para cada $y \neq x$ existe un abierto V con $y \in V \subseteq X - \{x\}$, es decir $y \in V$ y $x \notin V$. Esto, para todo par $x \neq y$, es exactamente T_1 . $\square$

Teorema 5.5 (Todo métrico es Hausdorff [GT 1.1.26, p. 11; MS Teo. 2.13, p. 32]). Todo espacio métrico es T_2 (y por lo tanto T_1 y T_0). En consecuencia, cualquier espacio no Hausdorff no es metrizable.

6 Sucesiones y convergencia

Definición 6.1 ([GT 2.5.1, p. 26]). $\{x_n\}_{n \geq 1}$ converge a x_0 en (X, τ) si para todo abierto G con $x_0 \in G$ existe n_0 tal que $x_n \in G$ para todo $n \geq n_0$. En un espacio métrico esto equivale a $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$.

$$(x_n \rightarrow x_0 \iff \forall G \in \tau (x_0 \in G \Rightarrow \exists n_0 \forall n \geq n_0 : x_n \in G).)$$

Teorema 6.2 (Unicidad del límite [GT 2.5.2, p. 26; GT Nota 2.5.4, p. 27; EJ Ej. teórico 5, p. 11]). En un espacio de Hausdorff (en particular, en todo espacio métrico), toda sucesión convergente tiene un único límite.

$$(X \text{ es } T_2 \Rightarrow (x_n \rightarrow x \wedge x_n \rightarrow y \Rightarrow x = y).)$$

Demostración. Si $x_n \rightarrow x$ y $x_n \rightarrow y$ con $x \neq y$, tomo abiertos disjuntos $U \ni x$, $V \ni y$. Existen n_1, n_2 con $x_n \in U$ para $n \geq n_1$ y $x_n \in V$ para $n \geq n_2$; para $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ resulta $x_n \in U \cap V = \emptyset$, absurdo. $\square$


Ejemplo 6.3 (Sin Hausdorff, infinitos límites [GT Ej. 2.5.5, p. 27]). En $\mathbb{R}^2$ con la pseudodistancia $d((x, y), (x', y')) = |x - x'|$ (Ej. 1.30), la sucesión $(1/n, 0)$ converge a todos los puntos $(0, y)$ del eje vertical: si G es abierto y $(0, y) \in G$, hay $\varepsilon > 0$ con $B((0, y), \varepsilon) \subseteq G$, y para $n \geq n_0 > 1/\varepsilon$ se tiene $d((1/n, 0), (0, y)) = 1/n < \varepsilon$. Por el teorema anterior (contrarrecíproco), el espacio no es de Hausdorff.

$$(\forall y \in \mathbb{R} : (1/n, 0) \rightarrow (0, y) \text{ en } (\mathbb{R}^2, \tau_d) \Rightarrow (\mathbb{R}^2, \tau_d) \text{ no es } T_2.)$$

Teorema 6.4 (Clausura por sucesiones (solo en métricos) [GT 2.5.6 y Cor. 2.5.7, p. 28; MS Teo. 4.14, p. 55]). Sea (X, d) métrico y $A \subseteq X$. Entonces $x \in \overline{A} \iff$ existe $\{a_n\} \subseteq A$ con $a_n \rightarrow x$. En consecuencia, A es cerrado $\iff A$ contiene el límite de toda sucesión de puntos de A que converja en X .

$$\begin{aligned} ((X, d) : x \in \overline{A} &\iff \exists \{a_n\}_{n \geq 1} \subseteq A : a_n \rightarrow x; \\ A \text{ cerrado} &\iff \forall \{a_n\} \subseteq A (a_n \rightarrow x \Rightarrow x \in A).) \end{aligned}$$

Observación 6.5. La equivalencia usa de manera esencial la base local numerable $\{B(x, 1/n)\}$ y por eso no se generaliza a espacios topológicos arbitrarios. Es la razón por la que en topología general se reemplazan las sucesiones por redes o filtros.



a partir de cierto n la sucesión debería estar *a la vez*
en U y en V , que son disjuntos: imposible

Figura 8. Por qué en un Hausdorff el límite es único. Si el espacio no separa (indiscreta, cofinita), esta contradicción desaparece y una misma sucesión puede converger a todos lados.

7 Continuidad

7.1 Continuidad en un punto

Definición 7.1 (Continuidad en un punto [MS Def. 4.1, p. 51]). $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ es *continua en* $a \in X$ si para todo entorno M de $f(a)$ existe un entorno N de a con $f(N) \subseteq M$. Equivalentemente: $f^{-1}(M) \in \mathcal{N}_a$ para todo $M \in \mathcal{N}_{f(a)}$. f es *continua en* A si lo es en cada punto de A , y *continua* (a secas) si lo es en todo X .

$$(f \text{ continua en } a \iff \forall M \in \mathcal{N}_{f(a)} \exists N \in \mathcal{N}_a : f(N) \subseteq M \iff \forall M \in \mathcal{N}_{f(a)} : f^{-1}(M) \in \mathcal{N}_a.)$$

Proposición 7.2 (Versión ε - δ local [MS Def. 4.1, p. 51 (con la base local de bolas); GT 2.8.4, p. 36]). Entre espacios métricos, $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ es continua en $a \iff$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d(x, a) < \delta \implies \rho(f(x), f(a)) < \varepsilon,$$

es decir $f(B(a, \delta)) \subseteq B(f(a), \varepsilon)$. Y f es continua en $a \iff$ para toda sucesión $x_n \rightarrow a$ vale $f(x_n) \rightarrow f(a)$ (continuidad secuencial en a).

Observación 7.3 (Alcanza con entornos básicos). Si $\mathcal{B}_{f(a)}$ es una base local en $f(a)$, basta verificar la condición para los $M \in \mathcal{B}_{f(a)}$: cualquier otro entorno contiene uno de ellos, y la preimagen de un conjunto mayor sigue siendo entorno. Por eso en un métrico alcanza con las bolas, y hacia $\mathbb{R}$ alcanza con los intervalos.

Observación 7.4 (Cómo se prueba una discontinuidad). Negando la definición: f *no* es continua en a si existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que *toda* bola $B(a, \delta)$ contiene algún x con $\rho(f(x), f(a)) \geq \varepsilon_0$. En la práctica lo más rápido es exhibir dos sucesiones $x_n \rightarrow a$ e $y_n \rightarrow a$ con $\lim f(x_n) \neq \lim f(y_n)$.




Figura 9. Continuidad en a : dado el objetivo ε (la bola de llegada), hay una tolerancia δ (la bola de salida) cuya imagen entra completa. Primero se fija ε , después se busca δ — nunca al revés.

Intuición. La versión topológica “ f^{-1} (abierto) es abierto” es la misma idea sin números: un abierto es un conjunto que contiene un margen alrededor de cada punto suyo, y la continuidad dice que ese margen se puede *tirar hacia atrás* por f . Por eso se trabaja con preimágenes y no con imágenes: la preimagen respeta uniones, intersecciones y complementos; la imagen, no.

7.2 Continuidad global

Definición 7.5 (Continuidad [GT 2.8.1, p. 34]). $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ es *continua* si $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ para todo $A \subseteq X$ (“la imagen de lo adherido queda adherida”).

Teorema 7.6 (Caracterización por abiertos y cerrados [GT 2.8.2, p. 34; MS Prop. 4.1, p. 51]). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ una función cualquiera y sea β' una base (o una subbase) fijada de τ' . Son equivalentes:

- (1) f es continua, es decir $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ para todo $A \subseteq X$;
- (2) $f^{-1}(F)$ es cerrado en X , para todo cerrado F de Y ;
- (3) $f^{-1}(G)$ es abierto en X , para todo abierto G de Y ;
- (4) $f^{-1}(B)$ es abierto en X , para todo $B \in \beta'$ (alcanza con los básicos, no hace falta recorrer todos los abiertos de Y);
- (5) $f^{-1}(M)$ es entorno de x , para cada $x \in X$ y cada entorno $M \in \mathcal{N}_{f(x)}$;
- (6) $f^{-1}(\overline{B}) \supseteq \overline{f^{-1}(B)}$ y $f^{-1}(\text{int } B) \subseteq \text{int } (f^{-1}(B))$, para todo $B \subseteq Y$.

Demostración de (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1). (1) $\Rightarrow$ (2): sea F cerrado y $A = f^{-1}(F)$. Por (1), $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq \overline{F} = F$, luego $\overline{A} \subseteq f^{-1}(F) = A$; como siempre $A \subseteq \overline{A}$, resulta A cerrado. (2) $\Rightarrow$ (3): $f^{-1}(Y - G) = X - f^{-1}(G)$. (3) $\Rightarrow$ (1): sea $y \in f(\overline{A})$, digamos $y = f(x)$ con $x \in \overline{A}$, y sea G abierto con $y \in G$. Entonces $f^{-1}(G)$ es abierto y contiene a $x \in \overline{A}$, luego $f^{-1}(G) \cap A \neq \emptyset$; tomando a en esa intersección, $f(a) \in G \cap f(A)$. Por lo tanto $y \in \overline{f(A)}$. $\square$

Observación 7.7. El punto (4) es el que más se usa en la práctica: para probar continuidad hacia $\mathbb{R}$ basta ver que las preimágenes de (a, b) (o incluso de (a, ∞) y $(-\infty, b)$, que forman subbase) son abiertas.

Teorema 7.8 (Caracterización ε - δ [GT 2.8.4, p. 36]). Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos y $f : X \rightarrow Y$. Entonces f es continua $\iff$ para todo $x \in X$ y todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ con $f(B(x, \delta)) \subseteq B(f(x), \varepsilon)$.

Teorema 7.9 (Caracterización por sucesiones [GT 2.8.5, p. 36; MS Teo. 4.15, p. 56]). Entre espacios métricos, f es continua $\iff x_n \rightarrow x_0$ implica $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ (continuidad secuencial).

Observación 7.10 (Dónde vale cada dirección [clase 8, balance de la Prop. 2.8.5]). La dirección $\Rightarrow$ vale en cualquier espacio topológico: dado G abierto con $f(x_0) \in G$, la preimagen $f^{-1}(G)$ es un abierto que contiene a x_0 , la cola de $\{x_n\}$ entra ahí, y por definición de preimagen la cola de $\{f(x_n)\}$ entra en G . La dirección $\Leftarrow$ es la que necesita métrica, porque usa la caracterización de la clausura por sucesiones (Teo. 6.4) para *fabricar* una sucesión $a_n \rightarrow x$ dentro de A ; esa caracterización solo vale en (seudo)métricos. Moraleja: en un espacio topológico general, ser secuencialmente continua no implica ser continua.

Definición 7.11 (Inclusión, restricción y correstricción [GT 2.8.6d y 2.8.7, pp. 37–38; TS Obs. 3.1.4]). Sea $f : X \rightarrow Y$ una función y $A \subseteq X$.

- La *inclusión* de A en X es la función $i : A \rightarrow X$ dada por $i(a) = a$ para todo $a \in A$. Es la identidad de X mirada sólo sobre A : no mueve ningún punto, lo único que cambia es el conjunto de partida. Su preimagen es la traza: $i^{-1}(U) = U \cap A$ para todo $U \subseteq X$.
- La *restricción* de f a A es $f|_A : A \rightarrow Y$, $f|_A(a) = f(a)$. Restringir es componer con la inclusión: $f|_A = f \circ i$.

- Si $f(X) \subseteq B \subseteq Y$, la *correstricción* de f a B es $f|_B : X \rightarrow B$ con la misma fórmula, cambiando sólo el codominio. El caso $B = f(X)$ es la *correstricción a la imagen*, que se nota $\tilde{f} : X \rightarrow f(X)$ y es sobreyectiva por construcción.

Cuando se habla de continuidad de i , de $f|_A$ o de $\tilde{f}$, el subconjunto lleva siempre la topología relativa (§8).

$$\begin{aligned} (i : A \rightarrow X, i(a) = a \quad \forall a \in A; \quad i^{-1}(U) = U \cap A; \quad f|_A = f \circ i; \\ f|_B : X \rightarrow B \text{ con } f|_B(x) = f(x); \quad \tilde{f} = f|_{f(X)}.) \end{aligned}$$

Intuición. Las tres operaciones no tocan la fórmula de la función: cambian el dominio, el codominio, o ambos. Eso es justo lo que las vuelve delicadas en topología, porque “abierto” depende del espacio en el que se mira: una función puede ser continua como $f : X \rightarrow Y$ y su correstricción serlo por razones distintas. La identidad $i^{-1}(U) = U \cap A$ es la que conecta todo esto con la topología de subespacio: pedir que i sea continua es pedir que las trazas $U \cap A$ sean abiertas en A .

Proposición 7.12 (Propiedades generales [GT 2.8.6, p. 37; MS Prop. 4.2, p. 52]). *Entre espacios topológicos (X, τ) , (Y, τ') , (Z, τ'') y para $A \subseteq X$ con la topología relativa τ_A :*

- las constantes son continuas;
- la identidad es continua;
- la composición de continuas es continua;
- la restricción de una continua a un subespacio es continua;
- en particular, la inclusión $i : (A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau)$ es continua.

Proposición 7.13 (Criterio de Hausdorff de comparación [MS Prop. 4.3, p. 52; AP Ej. 2.8.8 (clase 8)]). *Sean τ_1 y τ_2 dos topologías sobre el mismo conjunto X , y sea 1_X la identidad. Entonces $\tau_2 \subseteq \tau_1 \iff 1_X : (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$ es continua. (Toda comparación de topologías puede leerse como una afirmación de continuidad.)*

Demostración, en una línea. La identidad no mueve los puntos, así que $1_X^{-1}(G) = G$ para todo $G \subseteq X$. Entonces “ 1_X continua” significa “todo $G \in \tau_2$ está en τ_1 ”, que es $\tau_2 \subseteq \tau_1$. $\square$

Ejemplo 7.14 (La identidad entre topologías concretas [AP Ejs. 2.8.8 y 2.8.10 (clase 8)]). • $1_{\mathbb{R}} : (\mathbb{R}, \tau_u) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_{dis})$ no es continua: $\tau_{dis} \not\subseteq \tau_u$. Vía sucesiones (Teo. 7.9): $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ en la euclídea, pero $B_{d_D}(0, \varepsilon) = \{0\}$ es un abierto que contiene al límite y a ningún término, así que $1_{\mathbb{R}}(\frac{1}{n}) \not\rightarrow 0$ en la discreta.

- $1_{\mathbb{R}} : (\mathbb{R}, \tau_{dis}) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u)$ sí es continua, porque $\tau_u \subseteq \tau_{dis}$. Conclusión: la identidad es biyectiva y continua en un sentido, pero no es homeomorfismo — otro contraejemplo válido para Continuidad–B.3.
- $1_{\mathbb{R}^2} : (\mathbb{R}^2, d_e) \rightarrow (\mathbb{R}^2, d_{taxi})$ y su inversa son ambas continuas, porque las dos métricas dan la misma topología (Prop. 2.5). Acá la identidad sí es homeomorfismo, con distancias distintas en salida y llegada.

7.3 Álgebra de funciones continuas a valores reales

Proposición 7.15 (Continuidad hacia $\mathbb{R}^n$ [GT 2.8.11–2.8.12, pp. 38–39] [demostrada en general en el Teo. 9.12]). *Las proyecciones $p_i : (\mathbb{R}^n, eucl.) \rightarrow (\mathbb{R}, eucl.)$ son continuas, y $f : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}^n, eucl.)$ es continua $\iff p_i \circ f$ es continua para todo i . Esto reduce ejercicios como $f(x, y) = (x, x+y, x-y)$ o $f(x, y, z) = (x+y+z, xyz)$ a la continuidad de funciones a valores reales [EJ, Continuidad–A.4, p. 12].*

$$\begin{aligned} & (p_i : (\mathbb{R}^n, \text{eucl.}) \rightarrow (\mathbb{R}, \text{eucl.}) \text{ continua;} \\ f : (X, \tau) \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ continua} & \iff \forall i \in \{1, \dots, n\} : p_i \circ f \text{ continua.} \end{aligned}$$

Teorema 7.16 (Operaciones [*consecuencia estándar de GT 2.8.6 y 2.8.12, pp. 37–39; MS §4.1, p. 51*]). Sean $f, g : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u)$ continuas y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces son continuas:

$$f + g, \quad \lambda f, \quad f \cdot g, \quad |f|, \quad \max\{f, g\}, \quad \min\{f, g\},$$

y f/g en el abierto $\{x : g(x) \neq 0\}$.

Esquema. La ruta corta usa dos ingredientes ya disponibles: (i) $F = (f, g) : X \rightarrow \mathbb{R}^2$ es continua porque sus dos coordenadas lo son (Prop. 7.15); (ii) las operaciones $s(u, v) = u + v$ y $m(u, v) = uv$ son continuas de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$ — para s vale la estimación $|s(u, v) - s(u_0, v_0)| \leq |u - u_0| + |v - v_0| \leq 2d_{\max}$, o sea s es lipschitziana; para m se acota $|uv - u_0v_0| \leq |u||v - v_0| + |v_0||u - u_0|$ y se usa que $|u|$ está acotado cerca de u_0 . Entonces $f + g = s \circ F$ y $fg = m \circ F$ son composición de continuas. Para $|f|$: $||f(x)| - |f(a)|| \leq |f(x) - f(a)|$. Finalmente

$$\max\{f, g\} = \frac{f+g+|f-g|}{2}, \quad \min\{f, g\} = \frac{f+g-|f-g|}{2}.$$

□

7.4 Continuidad uniforme y métricas producto

Intuición. La continuidad uniforme es una noción analítica (que el mismo ε sirva para todos los puntos a la vez), mientras que el enfoque del curso es topológico: **GT** la define recién en el capítulo de compacidad (Def. 3.6.7, p. 56; ver §11). Se incluye acá porque el enunciado del ejercicio Métricos–A.7 la nombra y hace falta la definición para leerlo. Las métricas producto, en cambio, son las que responden el ejercicio Continuidad–A.7.

Definición 7.17 (Continuidad uniforme [*GT 3.6.7, p. 56; usada en EJ, Métricos–A.7, p. 2*]). $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ es *uniformemente continua* si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in X, \quad d(x, x') < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(x')) < \varepsilon.$$

La diferencia con la continuidad es el orden de los cuantificadores: acá el δ sirve *para todos los puntos a la vez*. f es *lipschitziana* si existe $K \geq 0$ con $\rho(f(x), f(x')) \leq K d(x, x')$ para todos x, x' .

$$(f \text{ lipschitziana} \iff \exists K \geq 0 \forall x, x' \in X : \rho(f(x), f(x')) \leq K d(x, x')).$$

Proposición 7.18 (Jerarquía, y que es estricta). Entre espacios métricos:

- *lipschitziana* $\Rightarrow$ *uniformemente continua* (sirve $\delta = \varepsilon/K$);
- *uniformemente continua* $\Rightarrow$ *continua*;
- ninguna de las dos recíprocas vale: $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$ es continua y no uniformemente continua; $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 1]$ es uniformemente continua y no lipschitziana.

Ejemplo 7.19. $x \mapsto d(x, A)$ es lipschitziana con $K = 1$ (Prop. 1.24), luego uniformemente continua. Es el ejercicio Métricos–A.7.

Proposición 7.20 (Métricas sobre el producto [EJ, Continuidad–A.7, p. 12]). Dado (X, d) , sobre $X \times X$ se definen

$$d_{\max}((x_1, x_2), (x'_1, x'_2)) = \max\{d(x_1, x'_1), d(x_2, x'_2)\},$$

$$d_{\text{sum}} = d(x_1, x'_1) + d(x_2, x'_2), \quad d_e = \sqrt{d(x_1, x'_1)^2 + d(x_2, x'_2)^2}.$$

Las tres son distancias y verifican

$$d_{\max} \leq d_e \leq d_{\text{sum}} \leq 2 d_{\max},$$

de modo que inducen la misma topología sobre $X \times X$ (mismo argumento de encaje de bolas que en la Prop. 2.5). En consecuencia, una función definida sobre $X \times X$ es continua para una de las tres si y sólo si lo es para las otras dos: en el ejercicio A.7 la respuesta es que no cambia nada.

Lema 7.21 (Desigualdad del cuadrilátero [curso; video de cátedra La distancia es continua; resuelto en Macho Stadler, Topología de espacios métricos]). En (X, d) , para todos $x, y, z, w \in X$, la diferencia entre $d(x, y)$ y $d(z, w)$ está acotada por lo que se mueven los extremos: x hasta z e y hasta w .

$$(\forall x, y, z, w \in X : |d(x, y) - d(z, w)| \leq d(x, z) + d(y, w).)$$

Demostración. Por la triangular dos veces, $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, w) + d(w, y)$, es decir $d(x, y) - d(z, w) \leq d(x, z) + d(y, w)$. Intercambiando los papeles de (x, y) y (z, w) sale la otra desigualdad. $\square$

Proposición 7.22 (La distancia es una función continua [EJ, Continuidad–A.7, p. 12; video de cátedra La distancia es continua]). Sea (X, d) métrico. Entonces $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, con cualquiera de las tres métricas producto (y por lo tanto con la topología producto, Obs. 9.7). Más aún, es lipschitziana: con d_{sum} sirve $\delta = \varepsilon$, con $d_{\max}$ sirve $\delta = \varepsilon/2$, y con d_e sirve $\delta = \varepsilon/\sqrt{2}$.

$$(|d(x, y) - d(x_0, y_0)| \leq d_{\text{sum}}((x, y), (x_0, y_0)) \leq 2 d_{\max}((x, y), (x_0, y_0));$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d_{\max}((x, y), (x_0, y_0)) < \delta \Rightarrow |d(x, y) - d(x_0, y_0)| < \varepsilon \quad (\delta = \frac{\varepsilon}{2}).)$$

Demostración. Con la del máximo, como en el video: dado $\varepsilon > 0$, si $d_{\max}((x, y), (x_0, y_0)) < \delta$, por el Lema 7.21

$$|d(x, y) - d(x_0, y_0)| \leq d(x, x_0) + d(y, y_0) \leq 2 d_{\max}((x, y), (x_0, y_0)) < 2\delta,$$

porque cada sumando es uno de los dos “cachitos” cuyo máximo es $d_{\max}$. Basta $\delta = \varepsilon/2$. Con d_{sum} la cuenta termina un renglón antes ($\delta = \varepsilon$); con d_e , se usa $d(x, x_0) + d(y, y_0) \leq \sqrt{2} d_e$ (Cauchy–Schwarz en $\mathbb{R}^2$). Como las tres métricas producto dan los mismos abiertos, probarlo con una alcanza. $\square$

Observación 7.23 (Cuándo volver al ε – δ [video de cátedra]). Aunque la continuidad se caracteriza por preimágenes de abiertos, cuando la función está definida con una distancia (como d o $d(\cdot, A)$) conviene el “viejo método” ε – δ : la herramienta natural para acotar es la triangular. Es el mismo mecanismo que en la Prop. 1.24 ($d(\cdot, A)$ es 1-lipschitziana, Métricos–A.7 y Continuidad–A.3): la profesora dejó los dos ejercicios duplicados a propósito para que uno recuerde al otro.

Proposición 7.24 (Lema del pegado [EJ, Continuidad–B.7, p. 13; MS §5.2, p. 65]). Sea $f : X \rightarrow Y$ y $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ con $X = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} F$, tal que $f|_F$ es continua para todo $F \in \mathcal{F}$. Entonces:

(a) si todos los F son abiertos, f es continua;

(b) si todos los F son cerrados y $\mathcal{F}$ es finita, f es continua.

$$\left(X = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} F \wedge \forall F \in \mathcal{F} : f|_F \text{ continua} \wedge \mathcal{F} \subseteq \tau \Rightarrow f \text{ continua}; \right. \\ \left. X = \bigcup_{k=1}^n F_k \wedge \forall k : F_k \text{ cerrado} \wedge f|_{F_k} \text{ continua} \Rightarrow f \text{ continua}. \right)$$

Demostración. (a) Si G es abierto en Y , $f^{-1}(G) = \bigcup_F (f|_F)^{-1}(G)$; cada $(f|_F)^{-1}(G)$ es abierto en F , y como F es abierto en X , es abierto en X ; unión arbitraria de abiertos es abierta. (b) Igual con cerrados, usando preimágenes de cerrados; ahora la unión debe ser *finita* porque solo las uniones finitas de cerrados son cerradas. La finitud es esencial: cubriendo $\mathbb{R}$ por los cerrados $\{x\}$, toda función tiene restricciones continuas. $\square$

7.5 Homeomorfismos

Definición 7.25 ([GT 2.8.9, p. 38; MS Def. 4.2, p. 52]). $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ es *homeomorfismo* si es biyectiva, continua y con inversa continua. f es *abierta* (resp. *cerrada*) si lleva abiertos en abiertos (resp. cerrados en cerrados) [GT 2.8.14, p. 39].

$$\left(f \text{ homeomorfismo} \iff f \text{ biyectiva} \wedge f \text{ continua} \wedge f^{-1} \text{ continua}; \right. \\ \left. f \text{ abierta} \iff \forall G \in \tau : f(G) \in \tau'; \quad f \text{ cerrada} \iff \forall F \text{ cerrado de } X : f(F) \text{ cerrado de } Y. \right)$$

Teorema 7.26 (Caracterizaciones [GT 2.8.15, p. 39; MS Prop. 4.6, p. 52]). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ biyectiva y continua. Son equivalentes:

- f es homeomorfismo;
- f es abierta;
- f es cerrada;
- $U \in \tau \iff f(U) \in \tau'$;
- $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ para todo $A \subseteq X$;
- $f(\text{int } A) = \text{int}(f(A))$ para todo $A \subseteq X$.

Contraejemplo 7.27 (Biyectiva y continua pero no homeomorfismo [GT Ejemplo 2.8.16.2, pp. 40-41]). $f : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$, es continua e inyectiva, y biyectiva sobre la circunferencia S^1 ; pero f^{-1} no es continua en $(1, 0)$: puntos de S^1 arbitrariamente cercanos a $(1, 0)$ tienen preimágenes cercanas a 2π . Otro ejemplo del mismo tipo: la identidad $(X, \tau_{dis}) \rightarrow (X, \tau_u)$ con X infinito, continua y biyectiva pero no homeomorfismo. La guía pide exhibir uno distinto [EJ, Continuidad-B.3, p. 13].

Definición 7.28 (Propiedad topológica [MS Def. 4.3, p. 52]). Una propiedad P de espacios topológicos es *topológica* si se conserva por homeomorfismos.

$$\left(P \text{ topológica} \iff (X \cong Y \wedge X \text{ cumple } P \Rightarrow Y \text{ cumple } P). \right)$$

Proposición 7.29 (Cuáles lo son [MS Prop. 4.7 y Contraejemplo 4.1, p. 52]). Sean (X, τ) e (Y, τ') espacios topológicos. Son propiedades topológicas T_1 , T_2 , la separabilidad y la metrizabilidad. No lo es la acotación: $(0, 1) \cong \mathbb{R}$ y sólo uno de los dos es acotado.

Proposición 7.30 (Todos los intervalos abiertos son homeomorfos [GT Ej. 2.8.16(3), (5), (6) y Prop. 2.8.17, pp. 41-42]). Todos los intervalos abiertos de $(\mathbb{R}, \tau_u)$, acotados o no, incluida la recta, son homeomorfos entre sí.

$$(\forall a < b, \forall c \in \mathbb{R} : (a, b) \cong (c, +\infty) \cong (-\infty, c) \cong \mathbb{R}.)$$

Demostración. Como “ser homeomorfos” es transitivo (la composición de homeomorfismos es homeomorfismo) basta ver que cada tipo es homeomorfo a $\mathbb{R}$. En cada caso la función es biyectiva, continua y con inversa continua por ser funciones del análisis:

- $(a, b) \rightarrow (a', b'), x \mapsto \frac{b'-a'}{b-a}(x-a) + a'$ (afín creciente), con inversa también afín: dos intervalos acotados abiertos cualesquiera son homeomorfos;
- $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \tan x$, con inversa $\arctan$; junto con lo anterior, $(a, b) \cong \mathbb{R}$;
- $\mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty), x \mapsto e^x$, con inversa $\log$;
- $(0, +\infty) \rightarrow (c, +\infty), x \mapsto x + c$, y $(c, +\infty) \rightarrow (-\infty, -c), x \mapsto -x$.

□

Definición 7.31 (Gráfica [GT Def. 2.8.18, p. 42]). Dada $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, su gráfica es $\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n+1}$, con la topología relativa de la euclídea. Se llama $\varphi_f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ a $\varphi_f(x) = (x, f(x))$, y $\tilde{\varphi}_f : \mathbb{R} \rightarrow \Gamma_f$ a su correstricción a la imagen. (GT lo hace con $n = 1$ y, en el Ej. 2.8.21, con $n = 2$.)

$$(\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}; \quad \varphi_f(x) = (x, f(x)); \quad \tilde{\varphi}_f = \varphi_f|_{\Gamma_f}.)$$

Definición 7.32 (Inmersión [GT Def. 2.8.19, p. 42]). Una *inmersión* es una función $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ continua e inyectiva cuya correstricción a la imagen $\tilde{f} : (X, \tau) \rightarrow (f(X), \tau'_{f(X)})$ es un homeomorfismo. Es decir: f mete una copia exacta de X adentro de Y . (En otros textos se dice *embebimiento* o *encaje*; “inmersión” en geometría diferencial significa otra cosa.)

$$(f \text{ inmersión} \iff f \text{ continua} \wedge f \text{ inyectiva} \wedge \tilde{f} : X \rightarrow f(X) \text{ homeomorfismo.})$$

Proposición 7.33 (La gráfica de una continua es una copia de la recta [GT Def. 2.8.18 y Prop. 2.8.20, p. 42]). Sea $f : (\mathbb{R}, \tau_u) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \tau_u)$. Entonces f es continua si y sólo si φ_f es una inmersión de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}^{n+1}$, es decir, si y sólo si $\tilde{\varphi}_f : \mathbb{R} \rightarrow \Gamma_f$ es un homeomorfismo.

$$(f \text{ continua} \iff \varphi_f \text{ inmersión} \iff \tilde{\varphi}_f : \mathbb{R} \rightarrow \Gamma_f \text{ homeomorfismo.})$$

Demostración. φ_f es inyectiva (si $(x, f(x)) = (x', f(x'))$, mirando la primera coordenada, $x = x'$), así que $\tilde{\varphi}_f$ es biyectiva, y su inversa es $(x, y) \mapsto x$, la restricción de la proyección p_1 a Γ_f : continua siempre (restricción de una continua). Por la Prop. 7.15, φ_f es continua sii sus coordenadas, $1_{\mathbb{R}}$ y las de f , lo son, es decir sii f es continua. Y φ_f es continua sii $\tilde{\varphi}_f$ lo es (Prop. 8.5(ii) en un sentido; componer con la inclusión en el otro). Juntando: $f \text{ continua} \iff \tilde{\varphi}_f \text{ biyectiva, continua y con inversa continua.}$ □

Ejemplo 7.34 (La hélice [GT Ej. 2.8.21, p. 42]). Con $f(x) = (\cos x, \sin x)$, $\Gamma_f = \{(x, \cos x, \sin x) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^3$ es una hélice, y φ_f es una inmersión de la recta en $\mathbb{R}^3$: la hélice es homeomorfa a $\mathbb{R}$. Contrasta con el contraejemplo de $[0, 2\pi) \rightarrow S^1$: allí la curva se cierra sobre sí misma y la inversa se rompe; acá el primer eje “desenrolla” la circunferencia y la inversa es una proyección.

Observación 7.35 (Erratas de GT 2.8.18–2.8.21, y la versión general). En **GT**: la inversa de $\tilde{\varphi}_f$ es la restricción de p_1 (no “ p_i ”); en 2.8.20 la gráfica de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ es $\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2\}$ y la hélice es $\{(x, \cos x, \sin x)\}$ (no “ $\sin y$ ”); y lo que se prueba no es que “toda hélice es una inmersión”, sino que φ_f es una inmersión cuya imagen es la hélice. La misma demostración, con el Teorema 9.12 en lugar de la Prop. 7.15, prueba en general: si $f : X \rightarrow Y$ es continua entre espacios topológicos, $x \mapsto (x, f(x))$ es una inmersión de X en $X \times Y$.

8 Topología de subespacio

Definición 8.1 ([GT 2.7.1, p. 31; EJ p. 14 (Cap. 3, p. 17)]). Dado (X, τ) y $A \subseteq X$, la *topología relativa* o *de subespacio* es

$$\tau_A = \{A \cap G : G \in \tau\}.$$

(A, τ_A) es un *subespacio topológico*.

Proposición 8.2 (Cerrados del subespacio [GT 2.7.1, p. 31; TS Obs. 3.1.5]). Sea $A \subseteq (X, \tau)$ con la topología relativa τ_A , y sea $C \subseteq A$. Entonces C es cerrado en (A, τ_A) si y sólo si es la traza de un cerrado de X .

$$(C \text{ cerrado en } (A, \tau_A) \iff \exists F \text{ cerrado de } (X, \tau) : C = A \cap F.)$$




Figura 10. El semidisco $G \cap A$ es abierto en el subespacio A (es la traza de un abierto de $\mathbb{R}^2$), pero no es abierto en $\mathbb{R}^2$: los puntos del borde inferior no tienen ninguna bola de $\mathbb{R}^2$ contenida en él.

Intuición. “Abierto” no es una propiedad del conjunto solo: es una propiedad *relativa al espacio en el que se lo mira*. $[0, 1)$ no es abierto en $\mathbb{R}$, pero sí lo es en el subespacio $[0, 2]$. Por eso siempre hay que decir “abierto en”. La Prop. 8.5(iii) da la única situación en la que se puede olvidar la distinción: cuando A mismo es abierto en X .

Teorema 8.3 (Caracterizaciones equivalentes [EJ, Cap. 3, Prop. 3.1.2–3.1.3, pp. 14–15 (impresas 17–18)]). Sea (X, τ) , $A \subseteq X$ e $i : A \rightarrow X$ la inclusión. Las tres descripciones siguientes definen la misma topología sobre A :

- (1) $\tau_A = \{U \cap A : U \in \tau\}$;
- (2) τ_A es la topología menos fina sobre A que hace continua la inclusión $i : A \rightarrow X$;
- (3) τ_A es la única topología sobre A que satisface la propiedad universal

$$(\star) \quad \forall Z \text{ espacio topológico, } \forall f : Z \rightarrow A : \quad f \text{ es continua} \iff i \circ f : Z \rightarrow X \text{ es continua.}$$

Demostración de $(\star)$ y de la unicidad. $(\star)$: si f es continua, $i \circ f$ lo es por composición. Recíprocamente, si $i \circ f$ es continua y $V \in \tau_A$, escribimos $V = U \cap A = i^{-1}(U)$ con $U \in \tau$; entonces $f^{-1}(V) = f^{-1}(i^{-1}(U)) = (i \circ f)^{-1}(U)$ es abierto, luego f es continua.

Unicidad: sea τ^* otra topología en A con $(\star)$. Aplicando $(\star)$ a $Z = (A, \tau^*)$ y $f = 1_A$ (continua), se obtiene que $i : (A, \tau^*) \rightarrow X$ es continua. Ahora aplicando $(\star)$ para τ_A con $Z = (A, \tau^*)$ y $f = 1_A$, la continuidad de $i : (A, \tau^*) \rightarrow X$ da que $1_A : (A, \tau^*) \rightarrow (A, \tau_A)$ es continua, es decir $\tau_A \subseteq \tau^*$. Intercambiando los roles se obtiene $\tau^* \subseteq \tau_A$. $\square$

Observación 8.4. El esquema de esta demostración (“una construcción caracterizada por una propiedad universal es única salvo isomorfismo, y se prueba aplicando la propiedad a la identidad en ambas direcciones”) es el mismo que reaparece en topología producto y cociente.

Proposición 8.5 (Propiedades básicas [GT 2.7.2–2.7.5, pp. 32–33; EJ Obs. 3.1.4, p. 14]). Sea $A \subseteq X$ subespacio.

- (i) Si $g : X \rightarrow Y$ es continua, $g|_A = g \circ i$ es continua.
- (ii) Si $h : Z \rightarrow X$ es continua con $h(Z) \subseteq A$, la correstricción $h|_A : Z \rightarrow A$ es continua (consecuencia de $(\star)$).
- (iii) Si A es abierto en X , todo abierto de (A, τ_A) es abierto de X ; ídem con cerrados. En general esto es falso: $A = \{(x, y) : y \geq 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$ y $G \cap A$ con G una bola centrada en el origen. [GT Ej. 2.7.3, p. 32]
- (iv) Si $B \subseteq A \subseteq X$: $\overline{B}^A = \overline{B}^X \cap A$.
- (v) Si (X, d) es métrico, la topología de la métrica restringida coincide con la topología relativa, pues $B_{d|_A}(a, \varepsilon) = B(a, \varepsilon) \cap A$.

$$\begin{aligned} (g : X \rightarrow Y \text{ continua} \Rightarrow g|_A = g \circ i \text{ continua}; \quad h : Z \rightarrow X \text{ continua} \wedge h(Z) \subseteq A \Rightarrow h|_A \text{ continua}; \\ A \in \tau \Rightarrow (V \in \tau_A \Rightarrow V \in \tau); \quad B \subseteq A : \overline{B}^A = \overline{B}^X \cap A; \quad B_{d|_A}(a, \varepsilon) = B(a, \varepsilon) \cap A.) \end{aligned}$$

Proposición 8.6 (Intervalos: no hay abiertos-cerrados propios [GT 2.7.6, p. 33] [demostrada en §10.6, clase 11]). Si $J \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo de cualquier tipo (incluida la recta), los únicos subconjuntos de $(J, \text{eucl.})$ simultáneamente abiertos y cerrados son $\emptyset$ y J . (Es la conexión de los intervalos, anticipada.)

$$(J \subseteq \mathbb{R} \text{ intervalo} \wedge C \subseteq J \text{ abierto y cerrado en } J \Rightarrow C = \emptyset \vee C = J.)$$

Teorema 8.7 (Bolzano topológico [GT 2.8.3, p. 35] [demostrada en §10.6, clase 11]). Para (X, τ) son equivalentes:

- (a) los únicos abiertos-cerrados de X son $\emptyset$ y X ;
- (b) si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $a, b \in f(X)$ con $a \leq b$, entonces $[a, b] \subseteq f(X)$;
- (c) si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y toma un valor negativo y otro positivo, entonces se anula.

Combinado con la proposición anterior, se recupera el teorema de Bolzano clásico para intervalos.

$$\begin{aligned} & ([\forall C \subseteq X (C \text{ abierto y cerrado} \Rightarrow C \in \{\emptyset, X\})] \\ \iff & [\forall f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : a, b \in f(X) \wedge a \leq b \Rightarrow [a, b] \subseteq f(X)] \\ \iff & [\forall f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : \exists x_1, x_2 f(x_1) < 0 < f(x_2) \Rightarrow \exists x_0 f(x_0) = 0].) \end{aligned}$$

Observación 8.8 (Cómo se usa). La implicación (c) $\Rightarrow$ (a) se prueba con χ -tipo: si existiera $A \neq \emptyset, X$ abierto y cerrado, la función que vale +1 en A y −1 fuera es continua (sus preimágenes son $\emptyset, A, X - A, X$) y no se anula. Es el mismo cálculo que en el ejercicio sobre χ_A (guía de continuidad, A.1).

9 Topología producto

Tema de la clase 9 (10/9/2026). No entró en el primer parcial: se evalúa en el segundo, junto con conexidad o compacidad. **GT** sólo trabaja productos de $\mathbb{R}^n$ con las distancias suma, euclídea y del máximo (§7.4 y Prop. 7.15); acá se hace el producto de dos espacios topológicos *cualesquiera*, siguiendo el apunte **TP** de la cátedra y **MS** §5.4. Todo lo que se dice para dos factores vale igual para una cantidad finita de factores.

Proposición 9.1 (Continuidad chequeada en una base del codominio [TP p. 4; clase 9, Prop. 2.1]). Sea $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ una función y sea β una base de τ_Y fijada. Si la preimagen de cada elemento de β es abierta en X , entonces f es continua. (Es la caracterización (4) del Teorema 7.6; la recíproca es inmediata porque $\beta \subseteq \tau_Y$.)

$$(\beta \text{ base de } \tau_Y \wedge \forall B \in \beta : f^{-1}(B) \in \tau_X \implies \forall G \in \tau_Y : f^{-1}(G) \in \tau_X.)$$

Demostración. Sea $G \in \tau_Y$ y sea $x \in f^{-1}(G)$, es decir $f(x) \in G$. Como β es base, existe $B \in \beta$ con $f(x) \in B \subseteq G$. Entonces $x \in f^{-1}(B)$ (definición de preimagen), $f^{-1}(B) \subseteq f^{-1}(G)$ (la preimagen respeta inclusiones) y $f^{-1}(B)$ es abierto (hipótesis). Luego $x \in \text{int } f^{-1}(G)$. Como x era cualquiera, $f^{-1}(G) = \text{int } f^{-1}(G)$ es abierto. $\square$

Observación 9.2 (Caso particular: bolas [TP p. 4]). Si Y es métrico, alcanza con que $f^{-1}(B(y, r))$ sea abierto para toda bola. No hace falta que la preimagen de una bola sea una bola: basta que sea *abierto*.

9.1 La base de rectángulos y la topología producto

Definición 9.3 (Rectángulos abiertos [TP p. 1; MS §5.4, p. 66]). Sean (X, τ_X) e (Y, τ_Y) espacios topológicos. Sobre el conjunto $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$ se considera la familia de los *rectángulos abiertos* (“abierto por abierto”)

$$\beta_{X \times Y} = \{U \times V : U \in \tau_X, V \in \tau_Y\}.$$

$$(W \in \beta_{X \times Y} \iff \exists U \in \tau_X \exists V \in \tau_Y : W = U \times V.)$$

Proposición 9.4 (Los rectángulos son base [TP p. 1; MS §5.4, p. 66; clase 9, Prop. 3.2]). $\beta_{X \times Y}$ cumple (B1) y (B2); por lo tanto es base de una topología sobre $X \times Y$.

$$\begin{aligned} & \text{(B1)} \quad \forall (x, y) \in X \times Y : (x, y) \in X \times Y \in \beta_{X \times Y}; \\ & \text{(B2)} \quad (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) \in \beta_{X \times Y}. \end{aligned}$$

Demostración. (B1): el propio $X \times Y$ es un rectángulo abierto, porque $X \in \tau_X$ e $Y \in \tau_Y$ (el todo es abierto en cualquier topología). (B2): si $(x, y) \in (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2)$, se propone $B_3 = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2)$. Es básico porque $U_1 \cap U_2 \in \tau_X$ y $V_1 \cap V_2 \in \tau_Y$ (intersección finita de abiertos); contiene a (x, y) porque $x \in U_1 \cap U_2$ e $y \in V_1 \cap V_2$; y está contenido en $B_1 \cap B_2$ (de hecho es igual). $\square$

Definición 9.5 (Topología producto [TP pp. 1–2; MS §5.4, p. 66, “de Tychonov”]). La *topología producto* $\tau_{X \times Y}$ (también τ_{prod} ; en **MS**, $\tau_X \times \tau_Y$ o τ_{Tyc}) es la generada por la base $\beta_{X \times Y}$. Por el criterio de base (§4) tiene dos lecturas: G es abierto si es *unión* de rectángulos abiertos, o si *cada punto* de G tiene un rectángulo abierto alrededor metido en G .

$$\begin{aligned} (G \in \tau_{X \times Y} &\iff G = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \times V_\alpha \text{ con } U_\alpha \in \tau_X, V_\alpha \in \tau_Y \\ &\iff \forall (x, y) \in G \exists U \in \tau_X \exists V \in \tau_Y : (x, y) \in U \times V \subseteq G.) \end{aligned}$$

Salvo aviso, todo producto de este apunte lleva la topología producto.

Observación 9.6 (El error frecuente [TP p. 2; clase 9, Obs. 3.4 y 4.2]). Es *falso* que todo abierto de $X \times Y$ sea de la forma $U \times V$: en $\mathbb{R}^2$ un disco es abierto y no es un rectángulo. Tampoco vale $G = \pi_X(G) \times \pi_Y(G)$ (ver la definición de proyección abajo): el producto de las “sombras” de G sobre los ejes es un rectángulo en general mucho más grande que G . Lo único que se puede asegurar es lo de la definición. Por eso el método de trabajo de toda la sección es: *lo que haya que probar sobre un abierto cualquiera del producto, se prueba sobre los rectángulos y se arrastra por uniones* (o se usa la Prop. 9.1).




Figura 11. Un abierto G de $X \times Y$ no es un rectángulo, ni es el producto $\pi_X(G) \times \pi_Y(G)$ de sus sombras (el rectángulo gris, que agrega puntos que no están en G). Lo único seguro: cada punto de G tiene un rectángulo básico $U \times V$ alrededor, dentro de G .

Observación 9.7 (Finitos factores, $\mathbb{R}^n$, y por qué no infinitos [TP p. 2; MS Ejemplos 5.3, p. 66; clase 9, Obs. 3.5–3.6] **[se enuncia, no se demuestra]**).

- La misma construcción da la topología producto de $X_1 \times \cdots \times X_n$, con base los $U_1 \times \cdots \times U_n$; y $(X \times Y) \times Z$ y $X \times (Y \times Z)$ resultan la misma.
- La topología usual de $\mathbb{R}^n$ es la producto de n copias de $(\mathbb{R}, \tau_u)$. Más en general, si (X, d) e (Y, ρ) son métricos, las distancias del máximo, de la suma y euclídea sobre $X \times Y$ inducen *la topología producto* (compárese con la Prop. de métricas sobre el producto en §7.4).
- $\tau_{dis} \times \tau_{dis} = \tau_{dis}$ (los $\{x\} \times \{y\}$ son abiertos) e $\tau_{ind} \times \tau_{ind} = \tau_{ind}$ (los únicos rectángulos son $\emptyset$ y $X \times Y$).
- En (B2) se usó que $U_1 \cap U_2$ es abierto. Con infinitos factores habría que intersectar infinitos abiertos, y ahí se rompe: el producto infinito es otra teoría, fuera del curso.

9.2 Proyecciones

Definición 9.8 (Proyecciones [TP p. 1; MS Prop. 5.9, p. 66]). Las *proyecciones* de $X \times Y$ son $\pi_X : X \times Y \rightarrow X$, $\pi_X(x, y) = x$, y $\pi_Y : X \times Y \rightarrow Y$, $\pi_Y(x, y) = y$. (En **TP**: Π_X, Π_Y ; en **MS**: p_X, p_Y ; en **GT**, para $\mathbb{R}^n$: p_i .)

$$(\pi_X(x, y) = x; \quad \pi_Y(x, y) = y.)$$

Proposición 9.9 (Tubos [TP pp. 1–2; clase 9, Teo. 4.3]). Para $U \subseteq X$ y $V \subseteq Y$, la preimagen de U por π_X es el tubo vertical $U \times Y$, la de V por π_Y es el tubo horizontal $X \times V$, y todo rectángulo es la intersección de sus dos tubos. Además, proyectar un rectángulo con lados no vacíos devuelve el lado.

$$\begin{aligned} & \left(\pi_X^{-1}(U) = U \times Y; \quad \pi_Y^{-1}(V) = X \times V; \quad U \times V = \pi_X^{-1}(U) \cap \pi_Y^{-1}(V); \right. \\ & \quad \left. V \neq \emptyset \Rightarrow \pi_X(U \times V) = U; \quad U \neq \emptyset \Rightarrow \pi_Y(U \times V) = V. \right) \end{aligned}$$

Demostración. $\pi_X^{-1}(U) = \{(x, y) : \pi_X(x, y) \in U\} = \{(x, y) : x \in U\} = U \times Y$, e igual con π_Y . Luego $(U \times Y) \cap (X \times V) = (U \cap X) \times (Y \cap V) = U \times V$. Si $V \neq \emptyset$, para cada $x \in U$ se elige $y \in V$ y resulta $x = \pi_X(x, y)$. $\square$




Figura 12. Los tubos del pizarrón. La preimagen por una proyección es un tubo; un rectángulo es la intersección de dos tubos. Esta cuenta es la que mueve todas las demostraciones de la sección.

Teorema 9.10 (La menos fina con proyecciones continuas [TP p. 2; clase 9, Teo. 4.3; GT 2.8.11, p. 38]). (i)

$\pi_X : (X \times Y, \tau_{X \times Y}) \rightarrow (X, \tau_X)$ y $\pi_Y : (X \times Y, \tau_{X \times Y}) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ son continuas;

(ii) si σ es otra topología en $X \times Y$ que hace continuas a π_X y π_Y , entonces $\tau_{X \times Y} \subseteq \sigma$.

$$\begin{aligned} & \left(\pi_X, \pi_Y \text{ continuas en } \tau_{X \times Y}; \quad (\pi_X, \pi_Y \text{ continuas en } \sigma) \Rightarrow \tau_{X \times Y} \subseteq \sigma; \right. \\ & \quad \left. \tau_{X \times Y} = \min \{ \sigma \text{ topología en } X \times Y : \pi_X, \pi_Y \text{ continuas} \}. \right) \end{aligned}$$

Demostración. (i) Si $U \in \tau_X$, $\pi_X^{-1}(U) = U \times Y$ es un rectángulo abierto (Prop. 9.9), luego abierto. Igual para π_Y . (ii) Sea $G \in \tau_{X \times Y}$; se escribe $G = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \times V_{\alpha}$ y, como σ es cerrada por uniones, basta ver cada $U_{\alpha} \times V_{\alpha} \in \sigma$ (truco: bajar el problema a la base). Pero $U_{\alpha} \times V_{\alpha} = \pi_X^{-1}(U_{\alpha}) \cap \pi_Y^{-1}(V_{\alpha})$ es intersección de dos abiertos de σ , por ser las proyecciones continuas en σ . $\square$

Observación 9.11 (Subbase de tubos, y la analogía con el subespacio [TP p. 1; clase 9, Obs. 4.4]). Los tubos $\{\pi_X^{-1}(U)\} \cup \{\pi_Y^{-1}(V)\}$ forman una subbase de $\tau_{X \times Y}$ cuyas intersecciones finitas son los rectángulos. Es el mismo esquema que la topología de subespacio (§8): allí, la menos fina que hace continua a la inclusión $i : A \rightarrow X$; acá, la menos fina que hace continuas a las proyecciones. La discreta sobre $X \times Y$ también las hace continuas, pero “no conserva información” de X y Y .

Teorema 9.12 (Continuidad hacia un producto [TP p. 3; MS Prop. 5.10, p. 66; GT 2.8.12, p. 39]). Sea Z un espacio topológico y $f : Z \rightarrow X \times Y$. Entonces f es continua si y sólo si sus dos coordenadas $\pi_X \circ f : Z \rightarrow X$ y $\pi_Y \circ f : Z \rightarrow Y$ son continuas.

$$(f : Z \rightarrow X \times Y \text{ continua} \iff \pi_X \circ f \text{ continua} \wedge \pi_Y \circ f \text{ continua.})$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Composición de continuas: f lo es por hipótesis y π_X, π_Y por el Teo. 9.10(i).
($\Leftarrow$) Por la Prop. 9.1 basta ver que la preimagen de cada rectángulo $U \times V$ ($U \in \tau_X, V \in \tau_Y$) es abierta en Z :

$$f^{-1}(U \times V) = f^{-1}(\pi_X^{-1}(U) \cap \pi_Y^{-1}(V)) = f^{-1}(\pi_X^{-1}(U)) \cap f^{-1}(\pi_Y^{-1}(V)) = (\pi_X \circ f)^{-1}(U) \cap (\pi_Y \circ f)^{-1}(V),$$

usando los tubos, que la preimagen respeta intersecciones, y que $f^{-1}(\pi_X^{-1}(U)) = (\pi_X \circ f)^{-1}(U)$ (ambos son $\{z : \pi_X(f(z)) \in U\}$). Los dos últimos conjuntos son abiertos por hipótesis, y su intersección también. $\square$




Figura 13. Una función hacia un producto es continua exactamente cuando sus dos coordenadas lo son. Es la propiedad universal del subespacio (§8) “para el otro lado”: allá la flecha auxiliar era la inclusión, que entra a X ; acá son las proyecciones, que salen del producto.

Intuición. Para ver que algo cae adentro de un rectángulo alcanza con mirar por separado las dos coordenadas: $(a, b) \in U \times V$ sii $a \in U$ y $b \in V$. La continuidad hacia un producto es esa misma frase dicha para entornos: estar cerca de (x, y) en el producto es estar cerca de x y cerca de y . Por eso la Prop. 7.15 de GT (continuidad hacia $\mathbb{R}^n$ coordenada a coordenada) es un caso particular.

Corolario 9.13 (Funciones armadas coordenada a coordenada [TP p.4, ejercicio 3]). Sean $f : X \rightarrow Z, g : Y \rightarrow W$ y $h : X \rightarrow Y'$ funciones continuas. Entonces son continuas

- $(f, h) : X \rightarrow Z \times Y', (f, h)(x) = (f(x), h(x))$;
- $f \times g : X \times Y \rightarrow Z \times W, (f \times g)(x, y) = (f(x), g(y))$;
- las “inclusiones a la altura y_0 ” $x \mapsto (x, y_0)$ de X en $X \times Y$, y las $y \mapsto (x_0, y)$ de Y en $X \times Y$.

$$(f, h \text{ continuas} \Rightarrow (f, h) \text{ continua}; \quad f, g \text{ continuas} \Rightarrow f \times g \text{ continua}; \\ x \mapsto (x, y_0) \text{ y } y \mapsto (x_0, y) \text{ continuas.})$$

Demostración. Por el Teo. 9.12, basta mirar coordenadas: las de (f, h) son f y h ; las de $f \times g$ son $f \circ \pi_X$ y $g \circ \pi_Y$ (composiciones de continuas); las de $x \mapsto (x, y_0)$ son la identidad de X y la constante y_0 . $\square$

Proposición 9.14 (Las proyecciones son abiertas [TP p.3; MS Prop. 5.9, p.66; versión general de GT Ej. 2.8.16, p.40]). π_X y π_Y son aplicaciones abiertas: la imagen de un abierto del producto es abierta en el factor.

$$(\forall G \in \tau_{X \times Y} : \pi_X(G) \in \tau_X \wedge \pi_Y(G) \in \tau_Y.)$$

Demostración. Sea $G = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \times V_{\alpha}$. La imagen de una unión es la unión de las imágenes (vale para cualquier función), así que $\pi_X(G) = \bigcup_{\alpha} \pi_X(U_{\alpha} \times V_{\alpha})$. Cada $\pi_X(U_{\alpha} \times V_{\alpha})$ es U_{α} si $V_{\alpha} \neq \emptyset$, y $\emptyset$ si no (Prop. 9.9): en ambos casos, abierto. Una unión de abiertos es abierta. $\square$

Contraejemplo 9.15 (Las proyecciones no son cerradas [*GT Ej. 2.8.16(1)*, p. 40; *TP p. 4*; *MS Obs. 5.4*, p. 66]). En $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (usual = producto), la rama de hipérbola $F = \{(x, y) : y = \frac{1}{x}, x > 0\}$ es cerrada, pero $\pi_X(F) = (0, +\infty)$ no es cerrado en $\mathbb{R}$: el 0 es adherente y no está. “No cerrada” no quiere decir que nunca dé cerrado (un rectángulo cerrado se proyecta en un cerrado), sino que *no siempre*. En **MS** el mismo ejemplo con la hipérbola completa: $\pi_X(\{xy = 1\}) = \mathbb{R} - \{0\}$.

Observación 9.16 (Dos formas de ver que F es cerrado). Por complemento (**GT**: $\mathbb{R}^2 - F$ es abierto) o por clausura (clase: $\overline{F} = F$, porque la curva se acerca al eje y pero nunca llega a $x = 0$); son la misma afirmación por la dualidad de §3. En un métrico, la forma más cómoda de escribirlo es con sucesiones (Teo. 6.4): si $(x_n, 1/x_n) \rightarrow (a, b)$, entonces $x_n \rightarrow a$ y $1/x_n \rightarrow b$; como $x_n \cdot \frac{1}{x_n} = 1$, pasando al límite $ab = 1$, luego $a \neq 0$, y $a \geq 0$ por ser límite de positivos: $a > 0$ y $b = 1/a$. El límite está en F .

9.3 Propiedades del producto (guía de productos)

La docente pidió tenerlas demostradas o al menos conocidas (“guárdenselas”, clase 9): se usan en conexidad y compacidad.

Proposición 9.17 (Clausura e interior de un producto [*TP p. 4, ejercicio 1*; *MS Prop. 5.11*, p. 66]). Sean $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$. Entonces la clausura del producto es el producto de las clausuras, y el interior del producto es el producto de los interiores.

$$(\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}; \quad \text{int}(A \times B) = \text{int } A \times \text{int } B.)$$

Demostración. Clausura, $\subseteq$: $\overline{A} \times \overline{B} = \pi_X^{-1}(\overline{A}) \cap \pi_Y^{-1}(\overline{B})$ es cerrado (preimágenes de cerrados por continuas) y contiene a $A \times B$; como $\overline{A \times B}$ es el menor cerrado que lo contiene, está incluido. $\supseteq$: sea (x, y) con $x \in \overline{A}$, $y \in \overline{B}$. Alcanza con ver que todo rectángulo básico $U \times V \ni (x, y)$ corta a $A \times B$ (todo abierto que contiene al punto contiene un básico que lo contiene). Como $x \in \overline{A}$ y $U \ni x$ es abierto, hay $a \in U \cap A$; igual hay $b \in V \cap B$; y $(a, b) \in (U \times V) \cap (A \times B)$.

Interior, $\supseteq$: $\text{int } A \times \text{int } B$ es un rectángulo abierto contenido en $A \times B$. $\subseteq$: si $(x, y) \in \text{int}(A \times B)$, hay un básico con $(x, y) \in U \times V \subseteq A \times B$; como $V \ni y$ no es vacío, $U \subseteq A$, luego $x \in \text{int } A$; igual $y \in \text{int } B$. $\square$

Corolario 9.18. El producto de dos cerrados es cerrado, y el producto de dos abiertos es abierto. $A \times B$ es denso en $X \times Y$ si A y B son densos (por ejemplo, $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}^2$).

Proposición 9.19 (Hausdorff por Hausdorff es Hausdorff [*TP p. 4, ejercicio 2*; *MS Prop. 5.12*, p. 67]). Si X e Y son T_2 , entonces $X \times Y$ es T_2 . (**MS**: lo mismo vale para T_1 , y también la recíproca, si los factores son no vacíos.)

$$(X, Y \text{ son } T_2 \Rightarrow X \times Y \text{ es } T_2.)$$

Demostración. Sean $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$; entonces difieren en alguna coordenada, digamos $x_1 \neq x_2$. Por T_2 en X hay $U_1 \ni x_1$, $U_2 \ni x_2$ abiertos disjuntos. Los tubos $U_1 \times Y$ y $U_2 \times Y$ son abiertos, contienen a cada punto respectivamente y son disjuntos, porque $(U_1 \times Y) \cap (U_2 \times Y) = (U_1 \cap U_2) \times Y = \emptyset$. Si difieren en la segunda coordenada, se usan tubos horizontales. $\square$

10 Conexidad

Tema de la clase 10 (24/9/2026), la primera de la segunda mitad. Sigue **GT** cap. 4, §§4.4–4.5 (conexión topológica), saltando por ahora la conexión por caminos (§§4.1–4.3), los intervalos de $\mathbb{R}$ y Bolzano (§10.6) y las componentes conexas (§4.6). Esos temas se dieron en las clases 11 (28/9: intervalos, Bolzano, caminos), 12 (1/10: relación “estar conectados”, componentes arcoconexas, conexión local por caminos) y 13 (5/10: puntos de corte, componentes conexas, conexión local); con la clase 13 el capítulo 4 de **GT** queda completo. “Esta unidad no la doy en el orden del apunte, pero antes o después termino dando todo” (la docente). El producto de conexos se hace con la topología producto de §9, no con la versión métrica de **GT**.

Definición 10.1 (Disconexo, conexo, subconjunto conexo [*GT* 4.4.1, p. 78; *MS Defs.* 7.1–7.2, p. 87]). (X, τ) es *disconexo* (en clase: *no conexo*) si existen dos abiertos U y V no vacíos, disjuntos, que entre los dos cubren X ; el par (U, V) es una *desconexión* de X (en **MS**: separación no trivial). X es *conexo* si no es desconexo. Un subconjunto $A \subseteq X$ es *conexo* si el subespacio (A, τ_A) es conexo: se lo mira como espacio en sí mismo, olvidando lo que hay afuera.

$$\begin{aligned} (X \text{ desconexo} &\iff \exists U, V \in \tau : U \neq \emptyset \wedge V \neq \emptyset \wedge U \cap V = \emptyset \wedge U \cup V = X; \\ X \text{ conexo} &\iff \neg(X \text{ desconexo}); \quad A \subseteq X \text{ conexo} \iff (A, \tau_A) \text{ conexo.}) \end{aligned}$$

Intuición. Conexo quiere decir “de una sola pieza”. Pero la definición es *negativa*: lo que se define es romperse en dos. Por eso probar que algo *no* es conexo es fácil (se exhibe la desconexión), y probar que *sí* lo es requiere herramientas: “lo busqué un rato y no lo encontré” no es argumento. Casi todas las demostraciones de esta sección son por el contrarrecíproco: se supone una desconexión y se fabrica otra donde no puede haberla.

Ejemplo 10.2 (Ejemplos de referencia [*GT* Ej. 4.4.3 y Prop. 4.5.4, pp. 78 y 81; *MS Ejemplos* 7.1, p. 88; *clase 10, Ejs.* 2.2 y 3.2]).

- $\emptyset$ y los unitarios son conexos en cualquier espacio: no admiten dos abiertos no vacíos y disjuntos.
- Un espacio discreto con más de un punto es desconexo: $(\{x\}, X - \{x\})$ es una desconexión. Más aún, en un discreto los únicos subconjuntos conexos no vacíos son los unitarios.
- En la indiscreta todo subconjunto es conexo.
- Si dos abiertos no vacíos de X siempre se cortan, X es conexo: la cofinita sobre un X infinito, la conumerable sobre $\mathbb{R}$, las de punto incluido y punto añadido.
- $\mathbb{R} - \{0\}$ (subespacio de $\mathbb{R}$) es desconexo: $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$ son abiertos en él y lo desconectan. En $(\mathbb{R}, \tau_u)$ los conexos son exactamente los intervalos (§10.6).

Proposición 10.3 (Desconectar un subconjunto con abiertos del espacio grande [*clase 10, Obs.* 2.3; *forma de trabajo de la cátedra, no figura en GT*]). Sea $A \subseteq (X, \tau)$. Entonces A es no conexo si y sólo si existen G, H abiertos de X tales que: los dos cortan a A , no se cortan dentro de A , y entre los dos cubren a A .

$$(A \text{ no conexo} \iff \exists G, H \in \tau : \underbrace{G \cap A \neq \emptyset \wedge H \cap A \neq \emptyset}_{(1)} \wedge \underbrace{G \cap H \cap A = \emptyset}_{(2)} \wedge \underbrace{A \subseteq G \cup H}_{(3)}.)$$

Demostración. Por definición, A es no conexo sii hay $U, V \in \tau_A$ no vacíos, disjuntos, con $U \cup V = A$; y los abiertos de A son $U = G \cap A$, $V = H \cap A$ con $G, H \in \tau$. Se traduce cada condición: $U \neq \emptyset \iff G \cap A \neq \emptyset$ (ídem V); $U \cap V = (G \cap A) \cap (H \cap A) = G \cap H \cap A$; y $U \cup V = (G \cup H) \cap A$, que es igual a A sii $A \subseteq G \cup H$. $\square$

Observación 10.4. G y H pueden cortarse entre sí, siempre que no lo hagan sobre A ; y pueden salirse de A . Así, dos cuadrados separados en $\mathbb{R}^2$ se desconectan con dos discos que se superponen en el medio, fuera de los cuadrados (Figura 14). Esta proposición es la herramienta de todas las demostraciones de la sección: una vez que se tienen G y H uno se olvida del subespacio.




Figura 14. La desconexión con abiertos del espacio grande: G y H se superponen en el medio, pero no sobre A ; cada uno se lleva un cuadrado y entre los dos cubren A .

Proposición 10.5 (Conexo $\iff$ no hay abiertos-cerrados propios [GT 4.4.2, p. 78; MS Lema 7.1, p. 87]). (X, τ) es conexo si y sólo si los únicos subconjuntos simultáneamente abiertos y cerrados son $\emptyset$ y X . Equivalentemente (contrarrecíproco, como se dictó): X es no conexo si existe un abierto y cerrado que no es ni vacío ni todo. Por la Prop. 3.20, también: X es conexo si ningún subconjunto propio no vacío tiene frontera vacía.

$$\begin{aligned} (X \text{ conexo} &\iff \forall U \subseteq X (U \in \tau \wedge U \text{ cerrado} \Rightarrow U = \emptyset \vee U = X); \\ X \text{ no conexo} &\iff \exists U \in \tau : U \text{ cerrado} \wedge U \neq \emptyset \wedge U \neq X.) \end{aligned}$$

Demostración. ($\Rightarrow$ del contrarrecíproco) Si (U, V) es una desconexión, $V = X - U$ (unión todo e intersección vacía). Entonces U es abierto (hipótesis) y cerrado ($X - U = V$ es abierto), no vacío, y distinto de X porque $X - U = V \neq \emptyset$. ($\Leftarrow$) Si U es abierto y cerrado con $U \neq \emptyset, X$, sea $V = X - U$: es abierto porque U es cerrado, $U \cup V = X$, $U \cap V = \emptyset$, $U \neq \emptyset$ y $V \neq \emptyset$ porque $U \neq X$. Luego (U, V) desconecta a X . $\square$

Observación 10.6 (Erratas de GT [clase 10, Obs. 3.3]). La demostración impresa en GT p. 78 escribe $X = (X - A) \cup A$ donde va $\cup$, y cierra la segunda parte con “por tanto (X, T) es conexo” cuando lo que se probó es que existe un abierto-cerrado propio. El contenido es el de arriba.

Proposición 10.7 (Un conexo no puede partirse por un abierto-cerrado [MS Prop. 7.4, p. 88]). Si $C \subseteq X$ es conexo y $A \subseteq X$ es abierto y cerrado, entonces C queda entero de un lado: $C \subseteq A$ o $C \subseteq X - A$.

$$(C \text{ conexo} \wedge A \in \tau \wedge A \text{ cerrado} \Rightarrow C \subseteq A \vee C \subseteq X - A.)$$

Demostración. Si C cortara a A y a $X - A$, los abiertos $G = A$ y $H = X - A$ cumplirían (1), (2) y (3) de la Prop. 10.3 y desconectarían a C . $\square$

10.1 Imagen continua y funciones a un discreto

Proposición 10.8 (La imagen continua de un conexo es conexa [GT 4.4.7, p. 79; MS Teo. 7.5, p. 88]). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ continua y $A \subseteq X$ conexo. Entonces $f(A)$ es conexo. En particular, si X es conexo y f es sobreyectiva, Y es conexo; y la conexidad es una propiedad topológica (MS Cor. 7.6).

$$(f \text{ continua} \wedge A \text{ conexo} \Rightarrow f(A) \text{ conexo}; \quad X \cong Y \Rightarrow (X \text{ conexo} \iff Y \text{ conexo}).)$$

Demostración. Por el contrarrecíproco: si $f(A)$ no es conexo, A tampoco. Por la Prop. 10.3 en Y hay $G, H \in \tau'$ con $G \cap f(A) \neq \emptyset$, $H \cap f(A) \neq \emptyset$, $G \cap H \cap f(A) = \emptyset$ y $f(A) \subseteq G \cup H$. Por continuidad $f^{-1}(G), f^{-1}(H) \in \tau$; se verifica que desconectan a A :

- (1) si $y \in G \cap f(A)$, es $y = f(a)$ con $a \in A$, y $a \in f^{-1}(G) \cap A$. Igual con H .
- (2) $f^{-1}(G) \cap f^{-1}(H) \cap A \subseteq f^{-1}(G) \cap f^{-1}(H) \cap f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(G \cap H \cap f(A)) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$, usando $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ y que la preimagen respeta intersecciones.
- (3) $A \subseteq f^{-1}(f(A)) \subseteq f^{-1}(G \cup H) = f^{-1}(G) \cup f^{-1}(H)$.

□




Figura 15. Si G y H desconectan a $f(A)$, sus preimágenes (abiertas por continuidad) desconectan a A . Las continuas tiran abiertos para atrás: una desconexión arriba produce una desconexión abajo.

Corolario 10.9 (Topología menos fina [MS Lema 7.2, p. 88]). Si (X, τ_1) es conexo y $\tau_2 \subseteq \tau_1$, entonces (X, τ_2) es conexo: es la imagen de $1_X : (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$, continua por la Prop. 7.13. (Con menos abiertos, cuesta más desconectar.)

Definición 10.10 (Espacio discreto [GT 4.5.2 y Ej. 4.5.3, p. 81]). (X, τ) es *discreto* si todos los unitarios $\{x\}$ son abiertos; equivalentemente, $\tau = \mathcal{P}(X)$ y todo subconjunto es abierto y cerrado. Todo (X, d_D) es discreto, pues $B_{d_D}(x, 1) = \{x\}$.

$$((X, \tau) \text{ discreto} \iff \forall x \in X : \{x\} \in \tau \iff \tau = \mathcal{P}(X).)$$

Proposición 10.11 (Conexo $\iff$ toda continua a un discreto es constante [GT 4.5.5, p. 81; MS Lema 7.1(v), p. 87]). Para (X, τ) son equivalentes: (a) X es conexo; (b) toda función continua $f : X \rightarrow Y$ con Y discreto es constante. Basta tomar $Y = \{0, 1\}$ con la discreta.

$$(X \text{ conexo} \iff \forall (Y, \tau') \text{ discreto} \forall f : X \rightarrow Y \text{ continua} : f \text{ es constante.})$$

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): $f(X)$ es conexo (Prop. 10.8) y está en un discreto, luego tiene un solo punto (Ej. 10.2): si tuviera dos, $y \neq y'$, el par $(\{y\}, f(X) - \{y\})$ lo desconectaría. O sea f es constante. (b) $\Rightarrow$ (a), por el absurdo: si (U, V) desconecta a X , sea $Y = \{y_0, y_1\}$ discreto y $f = y_0$ en U , $f = y_1$ en V (bien definida porque U, V son disjuntos y cubren X). Es continua: las preimágenes de los cuatro abiertos de Y son $\emptyset, X, U, V$, todos abiertos (o: lema del pegado con U, V abiertos). Y no es constante porque $U, V \neq \emptyset$. Contradicción. □

Observación 10.12. Es la misma idea que la función característica: $\chi_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua sii A es abierto y cerrado (guía de continuidad A.1), y en un conexo eso sólo pasa con $A = \emptyset$ o $A = X$.

10.2 La herramienta principal: dos puntos en un conexo

Proposición 10.13 (Conexo $\iff$ dos puntos cualesquiera caben en un conexo [GT 4.5.6, pp. 81–82; MS Cor. 7.10(ii), p. 89]). Para (X, τ) son equivalentes: (a) X es conexo; (b) para todos $a, b \in X$ existe un conexo $C \subseteq X$ con $a, b \in C$. Para un subconjunto: $B \subseteq X$ es conexo sii para todos $a, b \in B$ existe un conexo C con $a, b \in C \subseteq B$ (es la misma proposición aplicada al espacio (B, τ_B)).

$$\begin{aligned} (X \text{ conexo} &\iff \forall a, b \in X \exists C \subseteq X : C \text{ conexo} \wedge a, b \in C; \\ B \text{ conexo} &\iff \forall a, b \in B \exists C : C \text{ conexo} \wedge a, b \in C \subseteq B.) \end{aligned}$$

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b): $C = X$. (b) $\Rightarrow$ (a), por el contrarrecíproco: si (U, V) desconecta a X , se eligen $a \in U$ y $b \in V$, uno en cada pata. Sea C cualquiera con $a, b \in C$. Entonces $U \cap C \ni a$, $V \cap C \ni b$, $U \cap V \cap C = \emptyset$ y $C \subseteq U \cup V = X$: por la Prop. 10.3, los mismos U, V desconectan a C . Ningún conjunto que contenga a a y b es conexo. $\square$

Intuición. Para la docente es “la proposición más útil de toda esta parte”: para probar que algo es conexo, en lugar de pelear contra todas las desconexiones posibles, alcanza con conectar dos puntos cualesquiera *con un conexo que ya se conoce* (una recta, una copia de un factor, una imagen continua...). Es el reemplazo topológico de “unir dos puntos con un camino”.

10.3 Unión, intersección y clausura de conexos

Proposición 10.14 (Unión de dos conexos que se cortan [GT 4.5.7, p. 82 (caso de dos); MS Teo. 7.9, p. 89]). Si $A, B \subseteq X$ son conexos y $A \cap B \neq \emptyset$, entonces $A \cup B$ es conexo.

$$(A, B \text{ conexos} \wedge A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B \text{ conexo.})$$

Demostración. Por la Prop. 10.11, basta ver que toda $f : A \cup B \rightarrow Y$ continua con Y discreto es constante. La restricción $f|_A$ es continua y A es conexo, luego $f \equiv y_1$ en A ; igual $f \equiv y_2$ en B . Tomando $z \in A \cap B$: $y_1 = f(z) = y_2$. Luego f es constante en $A \cup B$. $\square$

Proposición 10.15 (Uniones de familias [GT 4.5.7–4.5.9, pp. 82–83; MS Teo. 7.9 y Cor. 7.10, p. 89; CX 5–7]). Sea $\{C_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ una familia de conexos de X . Su unión es conexa en cualquiera de estos casos:

- (a) hay uno fijo C_{α_0} que corta a todos (el “osito”: todas las orejas tocan la cabeza);
- (b) se cortan dos a dos; en particular, si $\bigcap_\alpha C_\alpha \neq \emptyset$;
- (c) la familia es una sucesión $C_1, C_2, \dots$ en la que cada uno corta al siguiente (el “gusano”).

$$\begin{aligned} ((a) \exists \alpha_0 \forall \alpha : C_\alpha \cap C_{\alpha_0} \neq \emptyset; \quad (b) \forall \alpha, \beta : C_\alpha \cap C_\beta \neq \emptyset; \quad (c) \forall n : C_n \cap C_{n+1} \neq \emptyset \\ \implies \bigcup C_\alpha \text{ conexo.}) \end{aligned}$$

Idea (la indicada en clase). Siempre con la Prop. 10.13 para subconjuntos: dados x, y en la unión, hay que meterlos en un conexo contenido en la unión, armado con la Prop. 10.14. (a): $x \in C_\alpha$, $y \in C_\beta$; $C_\alpha \cup C_{\alpha_0}$ es conexo, y ese bloque corta a C_β (porque C_β corta a C_{α_0}), luego $C_\alpha \cup C_{\alpha_0} \cup C_\beta$ es conexo y contiene a x, y . (b): directamente $C_\alpha \cup C_\beta$. (c): $x \in C_i$, $y \in C_j$ con $i \leq j$; por inducción $C_i \cup \dots \cup C_k$ es conexo para cada $k \geq i$ (se agrega C_{k+1} , que corta a C_k), y con $k = j$ se tiene el conexo buscado. En (c) hace falta el orden: de x a y se llega en una cantidad finita de pasos. $\square$

Observación 10.16 (La intersección de conexos no es conexa en general [*clase 10, Obs. 7.3*]). En $\mathbb{R}^2$, la circunferencia S^1 y el eje x son conexos, pero se cortan en $\{(-1, 0), (1, 0)\}$, que no es conexo (dos puntos en un métrico: es discreto). Lo mismo con dos arcos que se cruzan dos veces. No quiere decir que nunca sea conexa; quiere decir que no se puede afirmar.

Proposición 10.17 (Sándwich: lo que está entre un conexo y su clausura es conexo [*GT 4.4.8, p. 80; MS Teo. 7.11, p. 89*]). Si $A \subseteq X$ es conexo y $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$, entonces B es conexo. En particular, la clausura de un conexo es conexa.

$$(A \text{ conexo} \wedge A \subseteq B \subseteq \overline{A} \Rightarrow B \text{ conexo}; \quad A \text{ conexo} \Rightarrow \overline{A} \text{ conexo.})$$

Demostración. Por el contrarrecíproco: si G, H desconectan a B (Prop. 10.3), desconectan también a A . (3) y (2) se heredan porque $A \subseteq B$: $A \subseteq B \subseteq G \cup H$ y $G \cap H \cap A \subseteq G \cap H \cap B = \emptyset$. Lo único que hay que ganar es (1): como $G \cap B \neq \emptyset$, hay $x \in G \cap B$; como $x \in B \subseteq \overline{A}$ y G es un abierto que contiene a x , por definición de clausura $G \cap A \neq \emptyset$. Igual $H \cap A \neq \emptyset$. $\square$

Observación 10.18 (Frontera e interior de un conexo [*clase 10, Obs. 7.6*]). Ninguno de los dos hereda la conexidad. La frontera de $[1, 2]$ es $\{1, 2\}$, no conexa. Para el interior (quedó de tarea en clase): en $\mathbb{R}^2$, dos discos cerrados tangentes $A = B[(-1, 0), 1] \cup B[(1, 0), 1]$ forman un conexo (se cortan en el origen), pero $\text{int } A = B((-1, 0), 1) \cup B((1, 0), 1)$ es desconexo: el origen no es interior. (En $\mathbb{R}$ no hay contraejemplo: el interior de un intervalo es un intervalo.) Las herencias (2) y (3) de la demostración anterior van en contra cuando el conjunto se *achica*.

Ejemplo 10.19 (Usos típicos [*MS Ejemplo 7.1, p. 89*]). $\mathbb{R}^n$ es conexo: es la unión de las rectas por el origen, cada una homeomorfa a $\mathbb{R}$ y todas cortándose en 0 (Prop. 10.15(b)). Una bola abierta de $\mathbb{R}^n$ es conexa (homeomorfa a $\mathbb{R}^n$), luego la bola cerrada y todo lo que está entre ambas también (sándwich). Estos ejemplos usan que $\mathbb{R}$ es conexo, que se prueba con los intervalos (§10.6).

10.4 Más consecuencias (guía de conexidad)

Resultados que la guía **CX** pide probar y que salen en pocas líneas de lo anterior. Las demostraciones completas están en los ejercicios resueltos.

Proposición 10.20 (Basta que uno toque la clausura del otro [*CX 2*]). Si A y B son conexos y la clausura de A corta a B , entonces $A \cup B$ es conexo.

$$(A, B \text{ conexos} \wedge \overline{A} \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B \text{ conexo.})$$

Demostración. $C = A \cup (\overline{A} \cap B)$ está entre A y $\overline{A}$, luego es conexo (sándwich); C corta a B , luego $C \cup B = A \cup B$ es conexo (Prop. 10.14). $\square$

Observación 10.21. No alcanza con $\overline{A} \cap \overline{B} \neq \emptyset$: $(0, 1)$ y $(1, 2)$.

Proposición 10.22 (Un conexo denso conecta todo lo que lo contiene [*CX 1*]). Si $A \subseteq B \subseteq X$ con A conexo y denso en X , entonces B es conexo (sándwich con $\overline{A} = X$).

$$(A \text{ conexo} \wedge \overline{A} = X \wedge A \subseteq B \Rightarrow B \text{ conexo.})$$

Proposición 10.23 (Para salir de B hay que cruzar su frontera [CX 14]). Si A es conexo y tiene puntos dentro y fuera de B , entonces A corta a la frontera de B .

$$(A \text{ conexo} \wedge A \cap B \neq \emptyset \wedge A \cap (X - B) \neq \emptyset \Rightarrow A \cap \text{fr } B \neq \emptyset.)$$

Demostración. Si $A \cap \text{fr } B = \emptyset$, entonces $A \subseteq \text{int } B \cup \text{ext } B$ (partición de X en interior, frontera y exterior). Un punto de $A \cap B$ no está en $\text{ext } B$, luego está en $\text{int } B$; un punto de $A - B$ no está en $\text{int } B$, luego está en $\text{ext } B$. Así $G = \text{int } B$ y $H = \text{ext } B$ desconectan a A (Prop. 10.3). $\square$

Proposición 10.24 (El gráfico de una continua [CX 8]). Si X es conexo y $f : X \rightarrow Y$ es continua, su gráfico $\{(x, f(x)) : x \in X\}$ es conexo en $X \times Y$: es la imagen de $x \mapsto (x, f(x))$, continua por tener coordenadas 1_X y f (Teo. 9.12).

$$(X \text{ conexo} \wedge f \text{ continua} \Rightarrow \{(x, f(x)) : x \in X\} \text{ conexo.})$$

Definición 10.25 (Totalmente desconexo [CX, p. 2; MS Def. 7.3, p. 88]). X es *totalmente desconexo* si dos puntos distintos cualesquiera se pueden separar con una desconexión del espacio: abiertos disjuntos que cubren X , uno con cada punto. (MS lo define como “sus únicos conexos son $\emptyset$ y los puntos”; con la definición de **CX**, esa es la Prop. siguiente.)

$$(X \text{ totalmente desconexo} \iff \forall x \neq y \exists U, V \in \tau : x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \emptyset \wedge U \cup V = X.)$$

Proposición 10.26 ([CX 12 y 13]). Si X es totalmente desconexo, entonces es Hausdorff, y sus únicos conexos no vacíos son los unitarios.

$$(X \text{ totalmente desconexo} \Rightarrow X \text{ es } T_2 \wedge (C \neq \emptyset \text{ conexo} \Rightarrow |C| = 1).)$$

Demostración. T_2 es parte de la definición. Si C tuviera dos puntos, la desconexión (U, V) que los separa también desconectaría a C (Prop. 10.3). $\square$

Ejemplo 10.27 (Totalmente desconexos no discretos [CX 11; MS Ejemplos 7.2, p. 88]). $\mathbb{Q}$ usual: entre $x < y$ hay un irracional r , y $(-\infty, r) \cap \mathbb{Q}$, $(r, \infty) \cap \mathbb{Q}$ los separan. Sorgenfrey: $(-\infty, y)$ y $[y, \infty)$ son abiertos. También el conjunto de Cantor.

Ejemplo 10.28 (Peine del topólogo [Peine-del-Topologo.pdf] [usa que $[0, 1]$ es conexo]). Sea $K = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ y $E = (K \times [0, 1]) \cup ([0, 1] \times \{0\})$: dientes verticales sobre una base. E es conexo (cada diente corta a la base, Prop. 10.15(a)), y su clausura es el *peine* $P = E \cup (\{0\} \times [0, 1])$. Por el sándwich son conexos P y el *peine reducido* $R = E \cup \{(0, 1)\}$. En la clase 11 se agregó: P es “alevosamente” arcoconexo (se baja por un diente, se recorre la base y se sube) pero *no es localmente arcoconexo* (“guárdenlo”). R es el ejemplo estándar de conexo que *no* es arcoconexo: ningún camino llega a $(0, 1)$ (se verá con arcoconexidad, GT §4.1; GT Ej. 4.2.8(4) da otro espacio con la misma propiedad).

$$(E \subseteq R \subseteq P = \overline{E} \wedge E \text{ conexo} \Rightarrow R, P \text{ conexos.})$$




Figura 16. El peine: dientes en $x = 1/n$ sobre la base $[0, 1] \times \{0\}$ (azul). La clausura agrega el segmento $\{0\} \times [0, 1]$ (rayado); el peine reducido agrega sólo el punto $(0, 1)$. Todo lo que está entre E y $\bar{E}$ es conexo.

10.5 Producto de conexos

Proposición 10.29 (Producto de conexos [clase 10, Prop. 8.1; MS Teo. 7.12, pp. 89–90; reemplaza a GT 4.5.10, p. 83]). Si X e Y son conexos, $X \times Y$ (con la topología producto) es conexo. Recíprocamente, si $X \times Y \neq \emptyset$ es conexo, X e Y lo son.

$$(X, Y \text{ conexos} \Rightarrow X \times Y \text{ conexo}; \quad X \times Y \neq \emptyset \text{ conexo} \Rightarrow X, Y \text{ conexos.})$$

Demostración. Por la Prop. 10.13, dados $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ hay que meterlos en un conexo. La función $y \mapsto (x_2, y)$ de Y en $X \times Y$ es continua (coordenadas: constante e identidad, Cor. 9.13), así que su imagen $\{x_2\} \times Y$ es conexa (Prop. 10.8); igual $X \times \{y_1\}$, imagen de $x \mapsto (x, y_1)$. Las dos se cortan en (x_2, y_1) , luego la “cruz” $C = (X \times \{y_1\}) \cup (\{x_2\} \times Y)$ es conexa (Prop. 10.14), y contiene a (x_1, y_1) y a (x_2, y_2) . Recíproca: si $X \times Y \neq \emptyset$, π_X es continua y sobreyectiva, así que $X = \pi_X(X \times Y)$ es conexo. $\square$




Figura 17. La cruz del pizarrón: una copia de X (horizontal) y una de Y (vertical), conexas por ser imágenes continuas, que se cruzan en (x_2, y_1) . Hay que tomar una coordenada de cada punto para que las dos rayas se crucen.

Observación 10.30. GT 4.5.10 prueba lo mismo sólo para métricos con $\delta_2^{\max}$, usando que $x_2 \mapsto (x_1^0, x_2)$ es una isometría. La versión de clase no necesita métricas: sólo el Teorema 9.12.

Proposición 10.31 (El producto menos un rectángulo propio [Producto-de-Conexos.pdf, p. 2]). Si X, Y son conexos, $A \subsetneq X$ y $B \subsetneq Y$, entonces $(X \times Y) - (A \times B)$ es conexo.

$$(X, Y \text{ conexos} \wedge A \neq X \wedge B \neq Y \Rightarrow (X \times Y) - (A \times B) \text{ conexo.})$$

Demostración. Con $a_0 \notin A$ y $b_0 \notin B$, la cruz $(\{a_0\} \times Y) \cup (X \times \{b_0\})$ queda dentro del conjunto y es conexa. Todo punto (x, y) del conjunto tiene $x \notin A$ o $y \notin B$, así que su vertical $\{x\} \times Y$ o su horizontal $X \times \{y\}$ queda dentro y corta a la cruz. Se concluye con la Prop. 10.15(a). $\square$

Observación 10.32 (Arcoconexos [*Producto-de-Conexos.pdf*, p. 2]). El mismo apunte prueba que el producto de arcoconexos es arcoconexo (Teorema 10.65, dictado en la clase 11).

10.6 Intervalos de $\mathbb{R}$ y Bolzano

Dictado en la clase 11 (28/9/2026), que retoma los postergados GT 2.7.6 y 2.8.3 de §8 “con el bagaje nuevo”. En clase: la definición de intervalo por la propiedad del segmento, el teorema *intervalo* $\iff$ *conexo* con una prueba propia por supremo, Bolzano como caracterización de los conexos (con $f(X)$ intervalo) y la versión completa de los conexos de la recta (GT 4.4.4). Después de esas pruebas se conserva la demostración tipo GT de que $[a, b]$ es conexo, como alternativa.

Definición 10.33 (Intervalo [*clase 11*, Def. 2.1; GT 2.7.6 y 4.4.4, pp. 33 y 79, la dan por extensión]). $I \subseteq \mathbb{R}$ es un *intervalo* si cada vez que contiene a dos puntos contiene a todos los reales que están entre ellos. Esto engloba todos los tipos: (a, b) , $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$, las semirrectas abiertas y cerradas y la recta entera (también $\emptyset$ y los unitarios). GT los define por extensión (“un intervalo de cualquier tipo”); con esta definición es inmediato probar que algo *no* es un intervalo: se exhiben $a < c < b$ con $a, b \in I$ y $c \notin I$.

(I intervalo $\iff \forall a, b \in I \forall c \in \mathbb{R} (a < c < b \Rightarrow c \in I)$; I no intervalo $\iff \exists a, b \in I \exists c \notin I : a < c < b$.)

Teorema 10.34 (En $\mathbb{R}$, intervalo $\iff$ conexo [*clase 11*, Teo. 2.2; versión de la docente de GT 2.7.6, p. 33]). Un subconjunto $I \subseteq \mathbb{R}$, con la topología usual, es conexo si y sólo si es un intervalo. En consecuencia, los únicos conexos de la recta son los intervalos.

$$(I \subseteq (\mathbb{R}, \tau_u) : I \text{ intervalo} \iff I \text{ conexo.})$$

Demostración de clase, por los dos contrarrecíprocos. (Conexo $\Rightarrow$ intervalo.) Si I no es un intervalo, hay $a < c < b$ con $a, b \in I$ y $c \notin I$. Los rayos $U = (-\infty, c)$ y $V = (c, +\infty)$ son abiertos, $I \subseteq U \cup V = \mathbb{R} - \{c\}$, $U \cap V = \emptyset$, $a \in U \cap I$ y $b \in V \cap I$: por la Prop. 10.3, I no es conexo.

(Intervalo $\Rightarrow$ conexo.) Si I no es conexo, hay U, V abiertos de $\mathbb{R}$ con $U \cap I \neq \emptyset$, $V \cap I \neq \emptyset$, $U \cap V \cap I = \emptyset$ e $I \subseteq U \cup V$. Se eligen $x_1 \in U \cap I$, $x_2 \in V \cap I$; son distintos, y sin pérdida de generalidad $x_1 < x_2$ (si no, se intercambian U y V). Sea

$$H = \{x \in U \cap I : x_1 \leq x \leq x_2\},$$

no vacío ($x_1 \in H$) y acotado por x_2 ; sea $s = \sup H$, con $x_1 \leq s \leq x_2$. Se ve que s “vive en el agujero”:

- $s \notin V \cap I$. Si $s \in V$, como V es abierto hay $\delta > 0$ con $(s - \delta, s + \delta) \subseteq V$. Por ser s el supremo, hay $h \in H$ con $s - \delta < h \leq s$; entonces $h \in U \cap I$ y $h \in V$: absurdo con $U \cap V \cap I = \emptyset$. (En particular $s \neq x_2$, y $s < x_2$.)
- Si $s \in I$, entonces I no es intervalo. Como $s \in I \subseteq U \cup V$ y $s \notin V$, es $s \in U$; hay $\delta > 0$ con $(s - \delta, s + \delta) \subseteq U$, y sea $\delta' = \min\{\delta, x_2 - s\}$. Si algún $t \in (s, s + \delta')$ estuviera en I , sería $t \in U \cap I$ con $x_1 \leq t \leq x_2$, o sea $t \in H$ y $t > s$: absurdo. Luego ningún punto de $(s, s + \delta')$ está en I , y cualquiera de ellos es un c con $s < c < x_2$, $s, x_2 \in I$, $c \notin I$.
- Si $s \notin I$: como $s \neq x_1$ (está en I) y $s \neq x_2$, es $x_1 < s < x_2$ con $s \notin I$.

En todos los casos I falla la definición de intervalo. $\square$

Observación 10.35 (La letra chica de la prueba dictada [*clase 11*, Obs. 2.3]). En clase se tomó $H = \{x \in U : x_1 \leq x \leq x_2\}$, sin pedir $x \in I$. Como U y V pueden cortarse *fuera* de I , con esa H el paso “ $s \in V$ es absurdo” no cierra: el h que aparece está en $U \cap V$, pero no necesariamente en I . Con $H \subseteq U \cap I$ (como arriba) la prueba es completa. La idea es la de la docente: “si algo no es conexo es porque tiene un agujero, y el elemento que falla es el del medio”; las cuentas con el supremo sólo lo hacen formal.




Figura 18. Intervalo $\Rightarrow$ conexo, por el contrarrecíproco (dibujo de la pizarra de la clase 11): U y V desconectan a I (verde); H son los puntos de $U \cap I$ entre x_1 y x_2 , y su supremo s marca dónde se termina U : a su derecha, antes de llegar a x_2 , hay un agujero de I .

Corolario 10.36 (Otra forma de decirlo). Si $I \subseteq \mathbb{R}$ es conexo y $a \leq b$ están en I , entonces $[a, b] \subseteq I$. Si $A \subseteq \mathbb{R}$ tiene un “agujero” (un real que falta entre dos de sus puntos), no es conexo: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R} - \{0\}$, $[0, 1] \cup [2, 3]$.

$$(I \subseteq \mathbb{R} \text{ conexo} \wedge a, b \in I \wedge a \leq b \Rightarrow [a, b] \subseteq I.)$$

Teorema 10.37 ($[a, b]$ es conexo: la prueba tipo GT [GT 2.7.6, p. 33, para $J = [a, b]$; MS Ejemplos 7.1(11), p. 88]). Si $a \leq b$, el intervalo cerrado $[a, b]$ con la topología usual es conexo: sus únicos subconjuntos abiertos y cerrados a la vez son $\emptyset$ y $[a, b]$.

$$(a \leq b \wedge C \subseteq [a, b] \text{ abierto y cerrado en } [a, b] \Rightarrow C = \emptyset \vee C = [a, b].)$$

Demostración. Si $a = b$ es un punto. Sea $a < b$ y sea C abierto y cerrado en $[a, b]$. Alcanza con probar:

$$(*) \quad a \in C \implies C = [a, b].$$

En efecto, si $a \in C$, $(*)$ da $C = [a, b]$; si $a \notin C$, entonces $[a, b] - C$ también es abierto y cerrado en $[a, b]$ y contiene a a , así que $(*)$ da $[a, b] - C = [a, b]$, o sea $C = \emptyset$. Por la Prop. 10.5, $[a, b]$ es conexo.

Prueba de $()$.* Se considera el conjunto de los t hasta los cuales C llega “sin cortes”:

$$S = \{t \in [a, b] : [a, t] \subseteq C\}.$$

$S \neq \emptyset$ porque $a \in S$ (es $[a, a] = \{a\} \subseteq C$), y S está acotado por b . Por el axioma del supremo existe $s = \sup S$, y $a \leq s \leq b$.

Paso 1: $[a, s] \subseteq C$. Si $a \leq u < s$, como u no es cota superior de S hay $t \in S$ con $u < t$; entonces $u \in [a, t] \subseteq C$.

Paso 2: $s \in C$, luego $s \in S$ (uso de “cerrado”). Cada $t \in S$ está en C (porque $t \in [a, t] \subseteq C$), o sea $S \subseteq C$. Por la Prop. 2.16, el supremo es adherente: $s \in \overline{S} \subseteq \overline{C}$ (clausuras en $\mathbb{R}$). Como $s \in [a, b]$, resulta $s \in \overline{C} \cap [a, b] = \overline{C}^{[a, b]}$ (Prop. 8.5(iv)), que es C porque C es cerrado en $[a, b]$. Con el paso 1, $[a, s] \subseteq C$, es decir $s \in S$.

Paso 3: $s = b$ (uso de “abierto”). Supongamos $s < b$. Como C es abierto en $[a, b]$, es $C = G \cap [a, b]$ con G abierto de $\mathbb{R}$; como $s \in G$, hay $\delta > 0$ con $(s - \delta, s + \delta) \subseteq G$, luego $(s - \delta, s + \delta) \cap [a, b] \subseteq C$. Sea $s' = \min\{s + \delta/2, b\}$; es $s < s' \leq b$ y $(s, s'] \subseteq (s - \delta, s + \delta) \cap [a, b] \subseteq C$. Junto con el paso 2, $[a, s'] = [a, s] \cup (s, s'] \subseteq C$, o sea $s' \in S$ con $s' > s = \sup S$. Absurdo.

Por los pasos 2 y 3, $b = s \in S$, es decir $[a, b] \subseteq C$, y $C = [a, b]$. $\square$

Intuición. Es la versión rigurosa de “para salir de C habría que saltar”: se avanza desde a tanto como se pueda sin salir de C ; el punto al que se llega no puede ser un borde de C ni por la izquierda (porque C es cerrado) ni por la derecha (porque C es abierto). Lo único de $\mathbb{R}$ que se usa es que todo conjunto no vacío y acotado tiene supremo: en $\mathbb{Q}$ la misma prueba falla, y de hecho $\mathbb{Q}$ es totalmente desconexo.




Figura 19. La prueba por supremo. “Cerrado” asegura que C contiene al punto s al que llega; “abierto” asegura que, si $s < b$, desde s se puede seguir un poco más. Las dos cosas juntas sólo son compatibles con $s = b$.

Corolario 10.38 (Todo intervalo es conexo; en particular $\mathbb{R}$ [GT 2.7.6, p. 33]). *Todo intervalo $J \subseteq \mathbb{R}$ (de cualquier tipo, incluida la recta) es conexo: sus únicos abiertos y cerrados relativos son $\emptyset$ y J . En particular $(\mathbb{R}, \tau_u)$ es conexo, y quedan justificados los usos de “ $\mathbb{R}$ es conexo” de §10.*

$$(J \subseteq \mathbb{R} \text{ intervalo} \Rightarrow J \text{ conexo}; \quad (\mathbb{R}, \tau_u) \text{ conexo.})$$

Demostración. Dados $x \leq y$ en J , el segmento $[x, y]$ está contenido en J y es conexo (Teo. 10.37). Por la Prop. 10.13 (versión para subconjuntos), J es conexo. $\square$

Observación 10.39 (La demostración de GT 2.7.6 y sus erratas). **GT** prueba el corolario directamente para J , con la misma idea: elige $t_0 \in J - A$, toma $A_0 = A \cap (-\infty, t_0)$ y su supremo a , y usa el Ej. 2.3.7 (acá Prop. 2.16) y la Nota 2.7.4 para ver que $a \in A_0$. Hay tres descuidos: escribe (∞, t_0) por $(-\infty, t_0)$; el entorno que usa al final es $\{t \in J : |t - t_0| < \delta\}$, cuando debe ser alrededor de a , $\{t \in J : |t - a| < \delta\} \subseteq A_0$ (con $\delta \leq t_0 - a$); y sólo trata el caso $A_0 \neq \emptyset$ (si $A_0 = \emptyset$ se hace lo mismo con $A_1 = A \cap (t_0, \infty)$ y su ínfimo). La prueba de arriba evita esos casos pasando por $[a, b]$.

Proposición 10.40 (Los conexos de la recta [GT 4.4.4, p. 79 y 4.1.5, pp. 62–63; MS Ejemplos 7.1(11), p. 88]). *Para $A \subseteq (\mathbb{R}, \tau_u)$ son equivalentes:*

- (1) *A es conexo por caminos: para todos $x, y \in A$ hay un camino en A de x a y , es decir, una $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$ continua con $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$ [GT Defs. 4.1.1–4.1.2, p. 61];*
- (2) *A es conexo;*
- (3) *si $a \leq b$ están en A , entonces $[a, b] \subseteq A$;*
- (4) *A es un intervalo.*

$$\begin{aligned} & (A \subseteq \mathbb{R} : \quad A \text{ conexo por caminos} \iff A \text{ conexo} \\ & \iff \forall a, b \in A \ (a \leq b \Rightarrow [a, b] \subseteq A) \iff A \text{ intervalo.}) \end{aligned}$$

Demostración. En clase (clase 11, Prop. 7.1) la prueba fue “tirar números”: (1) $\Rightarrow$ (2) es arcoconexo $\Rightarrow$ conexo (Prop. 10.52); (2) $\Rightarrow$ (4) es el Teorema 10.34; (3) $\iff$ (4) es la definición de intervalo; y (4) $\Rightarrow$ (1) es el Ejemplo 10.50. Con detalle:

(1) $\Rightarrow$ (2): dados $x, y \in A$, la imagen $\gamma([0, 1])$ de un camino entre ellos es conexa (imagen continua del conexo $[0, 1]$, Prop. 10.8 y Teo. 10.37), está contenida en A y contiene a x y y . Por la Prop. 10.13, A es conexo.

(2) $\Rightarrow$ (3), por el contrarrecíproco: si $a < t < b$ con $a, b \in A$ y $t \notin A$, los abiertos $G = (-\infty, t)$ y $H = (t, +\infty)$ de $\mathbb{R}$ cumplen $a \in G \cap A$, $b \in H \cap A$, $G \cap H = \emptyset$ y $A \subseteq G \cup H$ (porque $t \notin A$). Por la Prop. 10.3, A no es conexo.

(3) $\Rightarrow$ (4): si $A = \emptyset$ es un intervalo. Si no, sean $\alpha = \inf A \in [-\infty, +\infty)$ y $\beta = \sup A \in (-\infty, +\infty]$ (valen $\mp\infty$ si A no está acotado de ese lado). Si $\alpha < t < \beta$, como t no es cota inferior

ni superior de A , hay $a, b \in A$ con $a < t < b$, y por (3) $t \in [a, b] \subseteq A$. Así $(\alpha, \beta) \subseteq A \subseteq [\alpha, \beta] \cap \mathbb{R}$, y A es (α, β) con o sin cada extremo finito: un intervalo.

(4) $\Rightarrow$ (1): dados $x \leq y$ en el intervalo A , $\gamma(t) = (1-t)x + ty$ es continua, $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$, y toma valores en $[x, y] \subseteq A$ [GT Ej. 4.1.3(1), p. 61]. (Para $x > y$ se usa el camino recorrido al revés.) $\square$

Observación 10.41. La implicación (2) $\Rightarrow$ (3) es la que más se usa en los ejercicios, casi siempre en su forma contrarrecíproca: *si a un subconjunto de $\mathbb{R}$ le falta un punto entre dos de los suyos, se desconecta cortando en ese punto*. Por ejemplo, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R} - \{0\}$ y $[0, 1] \cup [2, 3]$ no son conexos.

Teorema 10.42 (Bolzano [GT 2.8.3, p. 35 = GT 4.5.1, p. 80]). *Para un espacio topológico (X, τ) son equivalentes:*

- (a) X es conexo, es decir (Prop. 10.5), sus únicos abiertos y cerrados son $\emptyset$ y X ;
- (b) (valor intermedio) si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $a \leq b$ son valores de f , entonces f toma todos los valores entre a y b ;
- (c) (Bolzano) si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y toma un valor negativo y uno positivo, entonces se anula en algún punto.

$$\begin{aligned} (X \text{ conexo}) &\iff [\forall f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : a, b \in f(X) \wedge a \leq b \Rightarrow [a, b] \subseteq f(X)] \\ &\iff [\forall f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : \exists x_1, x_2 f(x_1) < 0 < f(x_2) \Rightarrow \exists x_0 f(x_0) = 0]. \end{aligned}$$

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b), por el absurdo. Sean $a = f(x_1) < b = f(x_2)$ (si $a = b$ no hay nada que probar) y supongamos que hay $t \in (a, b)$ con $t \notin f(X)$. Sea $A = f^{-1}((t, +\infty))$. Es abierto porque f es continua. Como f no toma el valor t , también $A = f^{-1}([t, +\infty))$, que es cerrado (preimagen de un cerrado). Además $x_2 \in A$ porque $f(x_2) = b > t$, y $x_1 \notin A$ porque $f(x_1) = a < t$. Entonces A es abierto y cerrado, con $A \neq \emptyset$ y $A \neq X$: contradice (a).

(b) $\Rightarrow$ (c): si $f(x_1) < 0 < f(x_2)$, por (b) con $a = f(x_1)$ y $b = f(x_2)$ es $0 \in [a, b] \subseteq f(X)$, o sea $f(x_0) = 0$ para algún x_0 .

(c) $\Rightarrow$ (a), por el contrarrecíproco. Si $A \neq \emptyset$, X es abierto y cerrado, sea $f = 1$ en A y $f = -1$ en $X - A$. Es continua: la preimagen de cualquier $G \subseteq \mathbb{R}$ es $\emptyset$, A , $X - A$ o X según cuáles de ± 1 estén en G , y los cuatro son abiertos. Toma el valor $-1 < 0$ (en $X - A \neq \emptyset$) y el valor $1 > 0$ (en $A \neq \emptyset$), pero no se anula: falla (c). $\square$

Observación 10.43 (Errata de GT 4.5.1 [clase 11]). En la p. 80, el ítem (b) de GT 4.5.1 está impreso sin la hipótesis “ f continua”; sin ella es falso (una función cualquiera de un conexo puede tener imagen $\{0, 1\}$). En la versión de la p. 35 (GT 2.8.3) la palabra sí está; la docente la agregó a mano en clase.

Observación 10.44 (La prueba de (a) $\Rightarrow$ (b) que se dictó [clase 11, Prop. 3.1]). En clase la docente no siguió a GT: “Bolzano visto de esta manera sale en un renglón”. $f(X)$ es conexo (imagen continua de un conexo, Prop. 10.8), luego es un intervalo (Prop. 10.40), luego contiene a $[a, b]$ si contiene a a y a b . La prueba de GT de arriba tiene la ventaja de no usar la caracterización de los conexos de $\mathbb{R}$, que en GT viene recién en el cap. 4. Para (c) $\Rightarrow$ (a) se usó la misma $f = \pm 1$, con la continuidad por el lema del pegado (U y V abiertos, f constante en cada uno).

Corolario 10.45 (Bolzano y valor intermedio clásicos [GT 2.8.3, “Consecuencia”, p. 36]). *Sea $J \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces $f(J)$ es un intervalo. En particular, si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $f(a) < 0 < f(b)$ (o $f(a) > 0 > f(b)$), existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$; y f toma todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$.*

$$\begin{aligned} & (J \text{ intervalo} \wedge f : J \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} \Rightarrow f(J) \text{ intervalo}; \\ & f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} \wedge f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0.) \end{aligned}$$

Demostración. J es conexo (Cor. 10.38), luego $f(J)$ es conexo (Prop. 10.8) y, por la Prop. 10.40, un intervalo. Para la segunda parte se aplica el Teorema 10.42(c) a $X = [a, b]$ (a $-f$ si $f(a) > 0 > f(b)$); el cero no está en a ni en b porque ahí $f \neq 0$. $\square$

Observación 10.46 (Cómo se usa). Para probar que una ecuación $g(x) = h(x)$ tiene solución en un intervalo, se aplica el corolario a $f = g - h$ y se buscan dos puntos con signos opuestos. Para probar que *un espacio no es conexo*, alcanza con exhibir una continua a $\mathbb{R}$ que cambie de signo sin anularse; y para probar que *dos espacios no son homeomorfos*, sirve comparar qué pasa al sacar un punto: $\mathbb{R} - \{0\}$ no es conexo (le falta el 0 entre -1 y 1), mientras que $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ sí lo es (unión de los rayos abiertos que salen del origen, todos cortando a la circunferencia unidad, Prop. 10.15(a)). Como un homeomorfismo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ se restringiría a un homeomorfismo entre $\mathbb{R} - \{0\}$ y $\mathbb{R}^2 - \{f(0)\}$, resulta $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^2$.

10.7 Conexión por caminos (arcoconexión)

Dictado en la clase 11 hasta el producto de arcoconexos: definiciones, ejemplos, arcoconexo $\Rightarrow$ conexo, seno y peine del topólogo, imagen continua y producto. Desde la yuxtaposición en adelante, en la clase 12 (1/10/2026): la relación “estar conectados por un camino” y las uniones de arcoconexos; los ejemplos de GT 4.1.13 quedaron como lectura. Sigue GT §4.1 y MS §7.3; la docente dice *arcoconexo*. En la guía CX se dice *arcoconexo* para lo que GT llama *conexo por caminos*; acá se usan las dos palabras como sinónimos (no se pide que el camino sea inyectivo). A diferencia de la conexión, es una propiedad *positiva*: para probarla se exhibe algo (un camino), en lugar de descartar todas las desconexiones.

Definición 10.47 (Camino [GT 4.1.1, p. 61; MS Def. 7.6, p. 90]). Sea (X, τ) un espacio topológico y $x, y \in X$. Un *camino de x a y* en X es una función continua $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ (con $[0, 1]$ con la topología usual) que empieza en x y termina en y . Los puntos x e y son el *origen* y el *extremo* del camino.

$$(\alpha \text{ camino de } x \text{ a } y \text{ en } X \iff \alpha : ([0, 1], \tau_u) \rightarrow (X, \tau) \text{ continua} \wedge \alpha(0) = x \wedge \alpha(1) = y.)$$

Definición 10.48 (Conexo por caminos, arcoconexo [GT 4.1.2, p. 61; MS Def. 7.7, p. 91]). (X, τ) es *conexo por caminos* (o *arcoconexo*) si para cualquier par de puntos $x, y \in X$ existe un camino en X de x a y . Un subconjunto $A \subseteq X$ es conexo por caminos si lo es el subespacio (A, τ_A) , es decir, si dos puntos cualesquiera de A se unen con un camino *que no sale de A* .

$$\begin{aligned} & (X \text{ arcoconexo} \iff \forall x, y \in X \exists \alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continua} : \alpha(0) = x \wedge \alpha(1) = y; \\ & A \subseteq X \text{ arcoconexo} \iff \forall x, y \in A \exists \alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continua} : \alpha([0, 1]) \subseteq A \wedge \alpha(0) = x \wedge \alpha(1) = y.) \end{aligned}$$

Observación 10.49. En la versión para subconjuntos se usa que una $\alpha : [0, 1] \rightarrow A$ es continua hacia (A, τ_A) si y sólo si es continua hacia X (la topología de subespacio es la que hace continua a la inclusión y a las restricciones, §8). Por eso se puede pensar el camino “dentro de X ” y sólo pedir que su imagen quede en A .

Ejemplo 10.50 (Intervalos y espacios normados [GT Ej. 4.1.3, p. 61; MS Ejemplos 7.3(1), (4), p. 91]).

- Todo intervalo $J \subseteq \mathbb{R}$ (de cualquier tipo, incluida la recta) es arcoconexo: si $x \leq y$ están en J , entonces $[x, y] \subseteq J$, y el camino $\alpha(t) = (1-t)x + ty$ recorre $[x, y]$ de x a y .
- Todo espacio normado $(V, \|\cdot\|)$ con su distancia $d(u, v) = \|u - v\|$ es arcoconexo: el segmento $\alpha(t) = (1-t)x + ty$ es continuo, porque $\|\alpha(t) - \alpha(s)\| = \|(t-s)(y-x)\| = |t-s| \|y-x\|$, es decir, α es lipschitziana. En particular $(\mathbb{R}^n, d_2)$ es arcoconexo.
- Más en general, todo subconjunto *convexo* de un normado (bolas abiertas o cerradas, cubos, semiespacios...) es arcoconexo: el segmento entre dos de sus puntos no sale del conjunto. La recíproca es falsa [clase 11]: una “L” gruesa o un anillo son arcoconexos y no convexos; para algunos pares de puntos el segmento se sale y hay que “dar la vuelta”.
- Todo espacio indiscreto es arcoconexo: toda función hacia un indiscreto es continua, así que cualquier α con $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = y$ sirve.

Observación 10.51 (Errata menor de GT). En GT 4.1.3(2) se propone $\delta \leq \varepsilon/(\|x\| + \|y\|)$, que no está definido si $x = y = 0$. La cuenta de arriba, con $\|y - x\|$, evita el problema (y si $x = y$ el camino es constante).

Proposición 10.52 (Arcoconexo $\Rightarrow$ conexo [GT 4.1.4, p. 62; MS Prop. 7.17, p. 91]). Si (X, τ) es conexo por caminos, entonces es conexo; equivalentemente (Prop. 10.5), sus únicos abiertos-cerrados son $\emptyset$ y X . Lo mismo para subconjuntos: un $A \subseteq X$ arcoconexo es conexo.

$$(X \text{ arcoconexo} \Rightarrow X \text{ conexo}; \quad A \subseteq X \text{ arcoconexo} \Rightarrow A \text{ conexo.})$$

Demostración. Por el absurdo: sea (U, V) una desconexión de X , y $x \in U$, $y \in V$. Sea α un camino de x a y . Por continuidad $\alpha^{-1}(U)$ y $\alpha^{-1}(V)$ son abiertos de $[0, 1]$; son disjuntos y cubren $[0, 1]$ (porque U, V lo hacen con X), y no son vacíos: $0 \in \alpha^{-1}(U)$, $1 \in \alpha^{-1}(V)$. Entonces $\alpha^{-1}(U)$ sería un abierto-cerrado propio de $[0, 1]$, que es conexo por ser un intervalo (Teorema 10.34). Es la prueba dictada en clase: “un camino de U a V arrastraría la desconexión del espacio a una desconexión del $[0, 1]$ ”. Otra forma, con las herramientas de la sección: $\alpha([0, 1])$ es conexo (imagen continua del conexo $[0, 1]$, Prop. 10.8) y contiene a x e y ; se concluye con la Prop. 10.13. $\square$

Observación 10.53 (Errata de GT 4.1.4 [clase 11]). En la demostración impresa (p. 62) se eligen $x_0 \in A$, $x_1 \notin A$ y a continuación el camino cumple “ $\alpha(0) = x_1$, $\alpha(1) = x_2$ ”; debe ser $\alpha(0) = x_0$, $\alpha(1) = x_1$.

Observación 10.54. La recíproca es falsa: el peine reducido del Ejemplo 10.28 es conexo y no es arcoconexo (se prueba en el Ejemplo 10.83); también la curva seno del topólogo $\{(x, \sin \frac{1}{x}) : x > 0\} \cup ((-\infty, 0] \times \{0\})$ [MS Ej. 7.2, p. 91] y el espacio de GT Ej. 4.2.8(4) (Ejemplo 10.85). En $\mathbb{R}$ las dos nociones coinciden: es la proposición “Los conexos de la recta” de §10.6, que en GT aparece primero en versión por caminos (GT 4.1.5, p. 62) y después con conexión (GT 4.4.4).

Ejemplo 10.55 (Seno del topólogo [clase 11, Ej. 6.1; MS Ej. 7.2, p. 91]). $S = \{(x, \sin \frac{1}{x}) : x > 0\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]) \subseteq \mathbb{R}^2$ es conexo y no es arcoconexo. Conexo: la curva $C = \{(x, \sin \frac{1}{x}) : x > 0\}$ es imagen continua del intervalo $(0, \infty)$, y $C \subseteq S \subseteq \overline{C}$ (cada punto $(0, y)$ con $|y| \leq 1$ es límite de puntos de la curva, porque $\sin \frac{1}{x}$ oscila entre -1 y 1 infinitas veces cerca de 0); por el sándwich, S es conexo. No arcoconexo: ningún camino va de la curva al segmento vertical (la idea es la misma que en el peine reducido, Ejemplo 10.83). La docente prefiere el peine. (MS usa la variante con $(-\infty, 0] \times \{0\}$ en lugar del segmento vertical.)

$$(C = \{(x, \sin \frac{1}{x}) : x > 0\} \text{ conexo} \wedge C \subseteq S \subseteq \overline{C} \Rightarrow S \text{ conexo}; \quad S \text{ no arcoconexo.})$$




Figura 20. El seno del topólogo: la curva oscila infinitas veces al acercarse al eje y . El segmento rojo está en su clausura (por eso el conjunto es conexo), pero ningún camino llega a él desde la curva.

Proposición 10.56 (La imagen continua de un arcoconexo es arcoconexa [GT 4.1.6, p. 64; MS Teo. 7.19 y Cor. 7.20, pp. 91–92]). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ continua y $A \subseteq X$ conexo por caminos. Entonces $f(A)$ es conexo por caminos. En particular, si X es arcoconexo y f es sobreyectiva, Y es arcoconexo; y la arcoconexión es una propiedad topológica.

$$(f \text{ continua} \wedge A \text{ arcoconexo} \Rightarrow f(A) \text{ arcoconexo}; \quad X \cong Y \Rightarrow (X \text{ arcoconexo} \iff Y \text{ arcoconexo}).)$$

Demostración. Como se dictó: se trabaja con la correstricción $\tilde{f} : A \rightarrow f(A)$, continua. Dados $p, q \in f(A)$, se eligen $x, y \in A$ con $f(x) = p$, $f(y) = q$, y un camino α de x a y dentro de A . Entonces $f \circ \alpha : [0, 1] \rightarrow Y$ es continua (composición de continuas), $(f \circ \alpha)(0) = p$, $(f \circ \alpha)(1) = q$, y su imagen $f(\alpha([0, 1]))$ está en $f(A)$. $\square$

Definición 10.57 (Camino inverso y yuxtaposición [GT 4.1.9, pp. 65–66; clase 12, Prop. 2.1]). Sean α un camino de x a y y β un camino de y a z en X (el extremo de α es el origen de β). El *camino inverso* de α es α^- (la docente escribe $\bar{\alpha}$: “ α^{-1} no me gusta, no es una inversa”), que recorre α al revés; la *yuxtaposición* (o *concatenación*: “empalmo una con la otra”) $\alpha * \beta$ recorre α a doble velocidad en la primera mitad del tiempo y β en la segunda:

$$(\alpha^-(t) = \alpha(1-t); \quad (\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \beta(2t-1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases})$$

Proposición 10.58 (“Estar unidos por un camino” es de equivalencia [GT 4.1.9, pp. 65–66; MS Def. 7.9, p. 92; clase 12, Prop. 2.1]). En (X, τ) , la relación $x \sim y$ si existe un camino en X de x a y es reflexiva, simétrica y transitiva. Más precisamente: los caminos constantes son caminos; si α es un camino de x a y , α^- es un camino de y a x ; y si además β es un camino de y a z , $\alpha * \beta$ es un camino de x a z .

$$(x \sim y \iff \exists \alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continua} : \alpha(0) = x \wedge \alpha(1) = y; \\ x \sim x; \quad x \sim y \Rightarrow y \sim x; \quad x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z.)$$

Demostración. Reflexiva: el camino constante $\alpha(t) = x$ es continuo. Simétrica: $\alpha^- = \alpha \circ \rho$ con $\rho(t) = 1 - t$ continua de $[0, 1]$ en $[0, 1]$, y $\alpha^-(0) = \alpha(1) = y$, $\alpha^-(1) = \alpha(0) = x$. Transitiva: $\alpha * \beta$ está bien definida porque en $t = \frac{1}{2}$ las dos fórmulas dan $\alpha(1) = y = \beta(0)$. Su restricción a $[0, \frac{1}{2}]$ es $\alpha \circ (t \mapsto 2t)$ y su restricción a $[\frac{1}{2}, 1]$ es $\beta \circ (t \mapsto 2t - 1)$, ambas continuas; como $[0, \frac{1}{2}]$ y $[\frac{1}{2}, 1]$ son dos cerrados que cubren $[0, 1]$, el Lema del pegado (versión (b), con finitos cerrados; §7.4) da que $\alpha * \beta$ es continua. Además $(\alpha * \beta)(0) = \alpha(0) = x$ y $(\alpha * \beta)(1) = \beta(1) = z$. $\square$




Figura 21. Yuxtaposición: en la primera mitad del tiempo se recorre α (azul) a doble velocidad, en la segunda β (rojo). Pega bien porque las dos fórmulas coinciden en $t = \frac{1}{2}$; la continuidad sale del lema del pegado con dos cerrados.

Observación 10.59 (Cómo se dictó [clase 12, §2]). “Es un trámite”, pero con dos detalles. *Simétrica*: dibujado parece obvio, pero en grafos no es cierto que si hay un camino de x a y haya uno de y a x ; acá vale porque el mismo camino se recorre “otra vez, el que vuelve”. *Transitiva*: no se puede hacer un camino “del doble de largo”, porque por definición todo camino va de 0 a 1; por eso se recorre cada tramo a doble velocidad, restando 1 en el segundo para volver a caer en $[0, 1]$ ($2 \cdot \frac{3}{4}$ se pasa, $2 \cdot \frac{3}{4} - 1$ no). La docente no compone con funciones auxiliares $\eta(t) = 2t$, $\xi(t) = 2t - 1$ como **GT**, sino que escribe la función partida y usa directamente el lema del pegado en cerrados. Eso obliga a tomar *los dos intervalos cerrados* y repetir el punto $t = \frac{1}{2}$: “la obligación de repetir el punto es como la obligación de que el límite por derecha sea igual al límite por izquierda”; el chequeo de que la función partida esté bien definida es justamente $\alpha(1) = y = \beta(0)$. **GT** prueba la continuidad “del modo analógico”: para F cerrado, $\gamma^{-1}(F) = \tilde{\alpha}^{-1}(F) \cup \tilde{\beta}^{-1}(F)$ es unión de dos cerrados, que es exactamente la prueba del lema del pegado.

Observación 10.60. Gracias a la transitividad, para probar que X es arcoconexo alcanza con fijar un punto x_0 y unir *cada* x con x_0 : si α_x va de x_0 a x , entonces $\alpha_x^- * \alpha_y$ va de x a y . Es el análogo por caminos de la Prop. 10.13.

Proposición 10.61 (Uniones de arcoconexos [GT 4.1.10–4.1.12, pp. 67–68; clase 12, Props. 3.1–3.6]). Sea $\{C_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ una familia de subconjuntos arcoconexos de X . Su unión es arcoconexa en cualquiera de estos casos (los mismos tres de la Prop. 10.15, ahora con caminos):

- (a) hay un C_{α_0} que corta a todos (**GT** 4.1.10);
- (b) se cortan dos a dos, en particular si $\bigcap_\alpha C_\alpha \neq \emptyset$ (**GT** 4.1.11);
- (c) es una sucesión $C_1, C_2, \dots$ en la que cada uno corta al siguiente (**GT** 4.1.12).

En particular, la unión de dos arcoconexos que se cortan es arcoconexa.

$$\left((a) \exists \alpha_0 \forall \alpha : C_\alpha \cap C_{\alpha_0} \neq \emptyset; \quad (b) \forall \alpha, \beta : C_\alpha \cap C_\beta \neq \emptyset; \quad (c) \forall n : C_n \cap C_{n+1} \neq \emptyset \right) \\ \implies \bigcup C_\alpha \text{ arcoconexo. })$$

Demostración. (a) Sean $x \in C_\alpha$ y $x' \in C_{\alpha'}$. Se eligen $x_0 \in C_\alpha \cap C_{\alpha_0}$ y $x'_0 \in C_{\alpha'} \cap C_{\alpha_0}$. Hay caminos de x a x_0 dentro de C_α , de x_0 a x'_0 dentro de C_{α_0} y de x'_0 a x' dentro de $C_{\alpha'}$, todos dentro de la unión; su yuxtaposición (Prop. 10.58) une x con x' sin salir de la unión. (b) Es (a) con α_0 cualquiera. (c) Por inducción $D_n = C_1 \cup \dots \cup C_n$ es arcoconexo: $D_n = D_{n-1} \cup C_n$ y $D_{n-1} \cap C_n \supseteq C_{n-1} \cap C_n \neq \emptyset$ (caso de dos, que es (b)). Los D_n son arcoconexos y todos contienen a $D_1 = C_1 \neq \emptyset$, así que por (b) su unión, que es $\bigcup_n C_n$, es arcoconexa. $\square$

Observación 10.62 (El orden de la clase [clase 12, §3]). La docente empezó por el caso de *dos*: si A, B son arcoconexos y $A \cap B \neq \emptyset$, se toma $y \in A \cap B$, un camino de $x \in A$ a y dentro de A y uno de y a $z \in B$ dentro de B , y la transitividad (la concatenación) da uno de x a z dentro de $A \cup B$. Si $A \cap B = \emptyset$ no hay forma de “saltar” de uno al otro. Para familias, la hipótesis de (a) es “un poquitito más débil” que pedir $\bigcap_\alpha C_\alpha \neq \emptyset$: no se pide que se crucen todos con todos, sino

que haya uno, C_{α_0} , con el que se crucen todos. La prueba de (a) son tres caminos concatenados, “plim, plim, plim”: de x a $z_x \in C_{\alpha_x} \cap C_{\alpha_0}$, de z_x a z_y dentro de C_{α_0} , y de z_y a y (Figura 22); un alumno observó que es aplicar dos veces el caso de dos, “lo que todo buen matemático hace: escribir menos”. Para (c) la docente eligió la prueba “del gusano” de arriba (los D_n encajados “todos tienen a C_1 , el buzón que empieza”), en lugar de concatenar h caminitos de C_n a C_{n+h} : “otras veces se usa esto de crear conjuntos más grandes”.




Figura 22. Uniones de arcoconexos, caso (a), como en el pizarrón de la clase 12 (coincide con GT Fig. 4.3): para ir de x a y se pasa por C_{α_0} , con el que todos se cruzan, concatenando tres caminos.

Ejemplo 10.63 (Rectas por el origen [clase 12, Ej. 3.5; CX 15]). Cada recta $\{(x, mx) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ es arcoconexa (imagen continua de $\mathbb{R}$ por $x \mapsto (x, mx)$). Cualquier unión de ellas (con m en $\mathbb{N}$, en $\mathbb{R}$, en el conjunto de índices que se quiera) es arcoconexa por la Prop. 10.61(b): todas pasan por el origen. Para ir de p a q se baja por una recta hasta el origen y se sube por la otra; “el punto de intersección es el que hace la diferencia”.

$$\left(\bigcup_{m \in \Lambda} \{(x, mx) : x \in \mathbb{R}\} \text{ arcoconexo, para cualquier } \Lambda \subseteq \mathbb{R}. \right)$$

Observación 10.64 (Tarea: ¿la intersección de dos arcoconexos que se cortan es arcoconexa? [clase 12, Obs. 3.2]). Pregunta dejada en clase (“cuando me pregunto por la unión, la primera pregunta que me hago es por la intersección”), con el aviso de que la respuesta es la misma que para conexos y de no fiarse de ejemplos inocentes como $(0, 2) \cap (1, 3) = (1, 2)$. Respuesta: no. Las dos semicircunferencias cerradas $A = S^1 \cap \{y \geq 0\}$ y $B = S^1 \cap \{y \leq 0\}$ son arcoconexas (imágenes de $[0, \pi]$ y $[\pi, 2\pi]$ por $t \mapsto (\cos t, \sin t)$) y $A \cap B = \{(-1, 0), (1, 0)\}$ no es conexo, luego tampoco arcoconexo. Es el mismo contraejemplo de la clase 10 para conexos ($S^1 \cap \{y = 0\}$).

Teorema 10.65 (Producto de arcoconexos [clase 11, Teo. 9.2; Producto-de-Conexos.pdf, p. 2; versión topológica de GT 4.1.7, p. 64]). Si X e Y son arcoconexos, $X \times Y$ (con la topología producto) es arcoconexo: el camino de (x_0, y_0) a (x_1, y_1) se arma coordenada a coordenada.

$$\left(X, Y \text{ arcoconexos} \Rightarrow X \times Y \text{ arcoconexo}; \quad \gamma(t) = (\alpha(t), \beta(t)). \right)$$

Demostración. Sean α un camino de x_0 a x_1 en X y β uno de y_0 a y_1 en Y . El camino $\gamma(t) = (\alpha(t), \beta(t))$ es continuo porque sus dos coordenadas lo son (Cor. 9.13: es la función (α, β) , que Producto-de-Conexos.pdf escribe $\alpha \times \beta$), y $\gamma(0) = (x_0, y_0)$, $\gamma(1) = (x_1, y_1)$. “Es un camino según la velocidad que haya avanzado cada uno; no piensen en linealidad” (la docente). $\square$

Observación 10.66 (Productos [GT Nota 4.1.8, p. 65 y Prop. 4.1.7, p. 64; MS Teo. 7.21, p. 92]). GT 4.1.7 prueba que el producto de dos (seudo)métricos arcoconexos es arcoconexo con $\delta_2^{\max}$, y la Nota 4.1.8 aclara que vale igual con δ_2^{taxi} , con δ_2^{eucl} , con la topología producto general y con finitos factores. La versión con topología producto es el Teorema 10.65. La recíproca también vale, como para conexos (MS Teo. 7.21): si $X \times Y \neq \emptyset$ es arcoconexo, $X = \pi_X(X \times Y)$ e $Y = \pi_Y(X \times Y)$ lo son por la Prop. 10.56.

Ejemplo 10.67 (Espacios arcoconexos conocidos [GT Ej. 4.1.13, pp. 68–69; MS Ejemplos 7.3, p. 91]). La única idea que la docente resaltó: “ f de arcoconexo es arcoconexo y los intervalos son arcoconexos, entonces cualquier parametrización (la hélice, la circunferencia) es un arcoconexo”.

- Un “paralelepípedo” $J_1 \times \cdots \times J_n \subseteq \mathbb{R}^n$ con los J_i intervalos (en particular $\mathbb{R}^n$) es arcoconexo: producto de arcoconexos (observación anterior), o directamente porque es convexo.
- El disco $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ es arcoconexo: es convexo.
- La circunferencia S^1 es arcoconexa: es la imagen del intervalo $[0, 2\pi]$ por la continua $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ (Prop. 10.56).
- La esfera $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ es arcoconexa: cada hemisferio cerrado $E_{\pm} = S^2 \cap \{\pm z \geq 0\}$ es homeomorfo al disco por $(x, y, z) \mapsto (x, y)$, luego arcoconexo, y los dos se cortan en el ecuador (Prop. 10.61).
- El cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$ es arcoconexo, por ser producto de arcoconexos.
- [MS Ejemplos 7.3(3)] La arcoconexión *no* es hereditaria: $\mathbb{R}$ es arcoconexo y $\mathbb{R} - \{0\}$ no lo es (ni siquiera es conexo, Ej. 10.2).
- [MS Ejemplos 7.3(4)] Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es numerable y $n \geq 2$, $\mathbb{R}^n - A$ es arcoconexo. Idea: dados $q \neq r$ fuera de A , para cada punto s de la mediatriz de $[q, r]$ la poligonal $q \rightarrow s \rightarrow r$ es un camino; son no numerables y dos de ellas sólo comparten q y r , así que el numerable A no puede cortarlas a todas.

10.8 Componentes conexas por caminos y conexión local por caminos

Clase 12 (1/10/2026), más GT 4.4.6 (§10.10). Sigue GT §4.2 y MS §7.4. GT escribe C_x tanto para la componente conexa por caminos como para la componente conexa (§4.6); acá, como en MS, se distinguen: $c(x)$ para la de caminos y $C(x)$ para la conexa.

Definición 10.68 (Componente conexa por caminos [GT 4.2.1, p. 70; MS Def. 7.9, p. 92; clase 12, Def. 4.1]). Sea (X, τ) y $x \in X$. La *componente conexa por caminos* (o *componente arcoconexa*) de x , $c(x)$, es el mayor subconjunto arcoconexo de X que contiene a x : es arcoconexo, contiene a x , y contiene a todo arcoconexo que contenga a x .

$$(c(x) \text{ arcoconexo} \wedge x \in c(x) \wedge \forall A \subseteq X (A \text{ arcoconexo} \wedge x \in A \Rightarrow A \subseteq c(x))).$$

Proposición 10.69 (Existe y es la clase de equivalencia de x [GT Lema 4.2.2 y Prop. 4.2.3, p. 70]). Para todo $x \in X$ la componente $c(x)$ existe: es la unión de todos los arcoconexos que contienen a x . Y coincide con la clase de x para la relación $\sim$ de la Prop. 10.58, es decir, con el conjunto de puntos que se pueden unir con x por un camino en X .

$$(c(x) = \bigcup \{A \subseteq X : A \text{ arcoconexo}, x \in A\} = \{y \in X : \exists \text{ camino en } X \text{ de } x \text{ a } y\}).)$$

Demostración. La familia de arcoconexos que contienen a x no es vacía ($\{x\}$ está) y todos se cortan en x ; por la Prop. 10.61(b) su unión D es arcoconexa, contiene a x , y contiene a cada miembro de la familia: es el mayor, $D = c(x)$. Sea $Z = \{y : x \sim y\}$. Si $y \in c(x)$, hay un camino de x a y dentro de $c(x)$, que es en particular un camino en X : $y \in Z$. Si $z \in Z$ y α es un camino en X de x a z , su imagen $\alpha([0, 1])$ es arcoconexa (Prop. 10.56, porque $[0, 1]$ lo es) y contiene a x y z ; luego $\alpha([0, 1]) \subseteq c(x)$ y $z \in c(x)$. $\square$

Observación 10.70 (La definición de la docente: al revés que GT [clase 12, Def. 4.1, Prop. 4.4 y Obs. 4.5]). En clase la componente arcoconexa se *define* como la clase de equivalencia de x , $c(x) = \{y \in X : \text{existe un camino de } x \text{ a } y\}$: “para mí no tiene discusión si existe o no: es una clase de equivalencia de una relación de equivalencia, y alguien, cuando estudié relaciones, me dijo que existía”. Lo que se demuestra después es que *es el mayor arcoconexo que contiene a x* :

- $c(x)$ es arcoconexo. Si $y, z \in c(x)$, entonces $x \sim y$ y $x \sim z$; por simetría y transitividad $y \sim z$: hay un camino γ de y a z . Ese camino no sale de $c(x)$: si $w = \gamma(t)$, el tramo $\gamma|_{[0,t]}$ reparametrizado une y con w , así que $x \sim w$ y $w \in c(x)$. (“Cada componente arcoconexa es un arcoconexo en su vida privada.”)
- *Es el más grande.* Si D es arcoconexo y $x \in D$, para cada $y \in D$ hay un camino de x a y (en $D \subseteq X$): $x \sim y$, $y \in c(x)$. Luego $D \subseteq c(x)$.

Las propiedades de la Prop. 10.73 (no vacías, $x \in c(x)$, si se cortan coinciden, $X = \bigcup_x c(x)$) salen gratis de ser clases de equivalencia. Las dos definiciones son equivalentes justamente por la Prop. 10.69.

Ejemplo 10.71 (Rectas verticales $x = n$ [clase 12, Ej. 4.3]). En $\mathbb{R}^2$ sea $X = \{(x, y) : x = n \text{ para algún } n \in \mathbb{N}\}$, la unión de las rectas verticales $x = n$. La componente arcoconexa de $(2, 1)$ es la recta $\{2\} \times \mathbb{R}$ entera: $c(2, 1) = c(2, 2) = c(2, \pi)$; la de $(3, 1)$ es $\{3\} \times \mathbb{R}$, y así una componente por cada n . Cualquier representante nombra la misma clase; “esto se porta como $\mathbb{N}$: que sea una raya entera no me hace la diferencia”. (Es el ejemplo del espacio cociente, que no se trabaja en el curso.)

$$(X = \mathbb{N} \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^2 : \quad c(n, y) = \{n\} \times \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{R}.)$$

Observación 10.72. Atención con la segunda descripción: el camino de x a y se busca en todo X , pero entonces automáticamente se queda dentro de $c(x)$ (toda su imagen está en $c(x)$).

Proposición 10.73 (Propiedades de las componentes arcoconexas [GT 4.2.4, p. 71; MS Def. 7.9, p. 92; clase 12, Prop. 4.2]). En (X, τ) : $x \in c(x)$; $c(x)$ es arcoconexo; $c(x)$ es la clase de x por $\sim$; y dos componentes arcoconexas o son iguales o son disjuntas. Es decir, las componentes arcoconexas forman una partición de X (MS llama $\pi_0(X)$ al conjunto de esas clases).

$$(x \in c(x); \quad c(x) \cap c(y) \neq \emptyset \Rightarrow c(x) = c(y); \quad X = \bigcup_{x \in X} c(x).)$$

Demostración. Todo sale de que son las clases de equivalencia de $\sim$ (Prop. 10.69), y las clases de una relación de equivalencia forman una partición. $\square$

Proposición 10.74 (Una imagen continua cae en una componente [GT 4.2.7, pp. 71–72; clase 12, Prop. 7.1]). Si $f : X \rightarrow Y$ es continua, $f(c(x)) \subseteq c(f(x))$. Si f es un homeomorfismo, $f(c(x)) = c(f(x))$, y f induce una biyección $c(x) \mapsto f(c(x))$ entre las componentes arcoconexas de X y las de Y . En particular, el número de componentes arcoconexas es un invariante topológico.

$$(f \text{ continua} \Rightarrow f(c(x)) \subseteq c(f(x)); \quad f \text{ homeomorfismo} \Rightarrow f(c(x)) = c(f(x)).)$$

Demostración. $f(c(x))$ es arcoconexo (Prop. 10.56) y contiene a $f(x)$, luego está en $c(f(x))$. Si f es homeomorfismo, lo mismo con f^{-1} da $f^{-1}(c(f(x))) \subseteq c(x)$, o sea $c(f(x)) \subseteq f(c(x))$. La correspondencia $c(x) \mapsto c(f(x))$ tiene inversa $c(y) \mapsto c(f^{-1}(y))$. $\square$

Observación 10.75 (Cómo se dictó y para qué se usa [clase 12, §7]). La ida sólo necesita f continua. La vuelta “es medio trampa, usa que es homeomorfismo”: $f^{-1} : Y \rightarrow X$ es una función continua (“estoy usando fuertemente el biyectivo: no estoy haciendo preimagen”), así que $f^{-1}(c(f(x)))$ es un arcoconexo que contiene a x y cae en $c(x)$; aplicando f , otra vez por la biyección, $c(f(x)) \subseteq f(c(x))$. “Si fuese una función continua sólo de ida, no alcanza: necesito ida y vuelta.” La consecuencia es la herramienta para probar que dos espacios *no* son homeomorfos, “sin

hacer muchas cuentas”: $\mathbb{R} - \{0\}$ tiene dos componentes arcoconexas y $\mathbb{R}$ una, así que $\mathbb{R} - \{0\} \not\cong \mathbb{R}$; y $\mathbb{R}$ menos dos puntos, con tres, no es homeomorfo a ninguno de los dos (Figura 23). “Es la idea intuitiva que uno tiene de topología: contar agujeros.” Contar agujeros de verdad en espacios más elaborados excede el curso: el toro tiene una sola componente, como el plano, y los distingue ser *simplemente conexo* (en $\mathbb{R}^2$ todo lacito se contrae a un punto; en el toro, uno que da la vuelta no).




Figura 23. Contar agujeros (clase 12): $\mathbb{R}$, $\mathbb{R} - \{0\}$ y $\mathbb{R} - \{a, b\}$ tienen 1, 2 y 3 componentes arcoconexas; por la Prop. 10.74 no son homeomorfos dos a dos.

Definición 10.76 (Localmente conexo por caminos [GT 4.2.5, p. 71; MS Def. 7.8, p. 91; clase 12, Def. 5.1]). (X, τ) es *localmente conexo por caminos* (localmente arcoconexo) si todo entorno de cualquier punto contiene un entorno arcoconexo de ese punto; es decir, si cada punto tiene una base de entornos formada por arcoconexos (así lo define MS).

$$(X \text{ loc. arcoconexo} \iff \forall x \in X \forall N \in \mathcal{N}_x \exists N' \in \mathcal{N}_x : N' \subseteq N \wedge N' \text{ arcoconexo.})$$

Intuición. “Localmente” no es “un poco”: no alcanza con que cada punto tenga *algún* entorno arcoconexo (el propio X lo sería si es arcoconexo), sino que tiene que haberlos *tan chicos como se quiera*. Por eso ser arcoconexo y ser localmente arcoconexo son independientes: $[-1, 0] \cup (0, 1]$ es localmente arcoconexo y no es arcoconexo; los espacios tipo peine son arcoconexos y no localmente arcoconexos.

Observación 10.77 (Lo que *no* es la definición [clase 12, Obs. 5.3–5.4]). Si X es localmente arcoconexo, cada punto tiene *algún* entorno arcoconexo (se aplica la definición con $N = X$). Pero eso es un corolario, no la definición, y no es equivalente: “que sea localmente arcoconexo quiere decir: yo te doy un entorno, vos me conseguís uno más chiquito. Ojo, no caigan”. Un arcoconexo tiene a X como entorno arcoconexo de cada punto y puede no ser localmente arcoconexo (el peine). Las dos propiedades son independientes: puede tener una, la otra, ninguna o las dos. (El GT impreso dice “cualquier entorno de N de x ”: errata por “cualquier entorno N de x ”).

Ejemplo 10.78 ($\mathbb{R} - \{0\}$: localmente arcoconexo, no arcoconexo [clase 12, Ej. 5.2]). $X = \mathbb{R} - \{0\}$ (usual) no es arcoconexo: no es un intervalo ($-1, 1 \in X$ y $0 \notin X$), luego no es conexo (§10.6) y menos arcoconexo. Pero es localmente arcoconexo: dados $x \in X$ y un entorno N de x (que puede tener el mismo agujero), hay G abierto con $x \in G \subseteq N$ y un $\varepsilon > 0$ con $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq G$; achicándolo a $\varepsilon < |x|$, $N' = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ no llega al 0, es entorno de x , está en N y es un intervalo, luego arcoconexo. “Siempre existe un intervalo en torno a algo que no llegue al cero.”

$$(x \in \mathbb{R} - \{0\}, N \in \mathcal{N}_x \Rightarrow \exists 0 < \varepsilon < |x| : N' = (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq N, N' \text{ arcoconexo.})$$

Proposición 10.79 (En un localmente arcoconexo las componentes arcoconexas son abiertas y cerradas [GT 4.2.6, p. 71; clase 12, Prop. 6.1]). Si (X, τ) es *localmente conexo por caminos*, cada componente arcoconexa $c(x)$ es abierta y cerrada en X .

$$(X \text{ loc. arcoconexo} \Rightarrow \forall x \in X : c(x) \in \tau \wedge c(x) \text{ cerrado.})$$

Demostración. Abierta: sea $y \in c(x)$; entonces $c(y) = c(x)$ (Prop. 10.73). Aplicando la definición al entorno $N = X$ de y se obtiene un entorno N' de y arcoconexo; como contiene a y , $N' \subseteq c(y) = c(x)$. Así $c(x)$ es entorno de cada uno de sus puntos, o sea abierto. Cerrada: su complemento es la unión de las demás componentes (son una partición), cada una abierta por lo anterior. $\square$

Observación 10.80. La demostración de **GT** para “cerrada” pasa por la clausura; la de arriba, por el complemento, es más corta y es la misma idea que se usa con las componentes conexas. En $\mathbb{R} - \{0\}$, por ejemplo, $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$ son abiertas y cerradas: “el cero no juega, ponerle el corchete no gana nada”.

Demostración dictada en clase (como GT: interior y clausura). Sólo se usa la forma débil de la hipótesis: todo y tiene un entorno arcoconexo N , y entonces hay $G \in \tau$ con $y \in G \subseteq N$, así que $y \in N^\circ$.

Abierta: $c(x) \subseteq c(x)^\circ$. Sea $y \in c(x)$; como $y \in c(y)$, es $c(x) = c(y)$. N es un arcoconexo que contiene a y , luego $N \subseteq c(y)$ (es el mayor), y por monotonía del interior $y \in G = G^\circ \subseteq N^\circ \subseteq c(y)^\circ = c(x)^\circ$.

Cerrada: $\overline{c(x)} \subseteq c(x)$. Sea $y \in \overline{c(x)}$ y N un entorno arcoconexo de y . N° es un abierto que contiene a y , adherente a $c(x)$, así que $N^\circ \cap c(x) \neq \emptyset$, y con más razón $N \cap c(x) \neq \emptyset$. (“¿Por qué el interior? Porque necesitaba un abierto para la definición de clausura; pero el arcoconexo es N , zapallos.”) Entonces $N \cup c(x)$ es unión de dos arcoconexos que se cortan, arcoconexa, y contiene a x ; por ser $c(x)$ el mayor, $N \cup c(x) \subseteq c(x)$, y como la otra inclusión es obvia, $N \cup c(x) = c(x)$: “absorbe”. Luego $y \in N \subseteq c(x)$. (Para “cerrada” no se sabe de antemano que $y \in c(x)$, por eso se pasa por $N \cup c(x)$ y no por $c(y)$.) $\square$




Figura 24. Por qué $c(x)$ es cerrada en un localmente arcoconexo (dibujo de la clase 12): un punto adherente y tiene un entorno arcoconexo N que pisa a $c(x)$; la unión es un arcoconexo que contiene a x , cabe en $c(x)$, y arrastra a y con ella.

Ejemplo 10.81 (Localmente arcoconexos [GT Ej. 4.2.8(1)–(2), p. 72; CX 18; clase 12, Obs. 5.6]).

- $\mathbb{R}^n$ es arcoconexo y localmente arcoconexo: las bolas $B(x, r)$ son convexas, luego arcoconexas, y forman una base de entornos de x . Lo mismo vale para cualquier *abierto* de $\mathbb{R}^n$ (las bolas chicas quedan adentro), y para cualquier normado.
- S^1 y el disco cerrado son arcoconexos y localmente arcoconexos (alrededor de un punto de S^1 , los arcos chicos son imágenes continuas de intervalos).
- [CX 18] $[-1, 0) \cup (0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ (la guía dice $(0, -1]$, errata por $(0, 1]$) es localmente arcoconexo, y por lo tanto localmente conexo: cada punto tiene intervalos arbitrariamente chicos a su alrededor dentro del conjunto. No es conexo.
- Un discreto es localmente arcoconexo: $\{x\}$ es un entorno arcoconexo de x contenido en cualquier otro.

Ejemplo 10.82 (Arcoconexo pero no localmente arcoconexo [GT Ej. 4.2.8(3), pp. 72–73 y Ej. 4.6.9(4), pp. 86–87; CX 15]). Sea $X \subseteq \mathbb{R}^2$ la unión del eje OX , del eje OY y de las rectas verticales $A_n = \{1/n\} \times \mathbb{R}$, $n \geq 1$. Es arcoconexo: OX , OY y los A_n son rectas y todas cortan a OX (Prop. 10.61(a)). No es localmente conexo (y menos aún localmente arcoconexo) en $p = (0, y_0)$ con $y_0 \neq 0$. En efecto, sea $0 < r < |y_0|$, de modo que $B(p, r)$ no toca a OX , y sea $N \subseteq B(p, r) \cap X$

un entorno de p en X . Contiene alguna $B(p, \delta) \cap X$, que contiene a $p_n = (1/n, y_0)$ para n grande. Fijado un tal n , se toma λ con $\frac{1}{n+1} < \lambda < \frac{1}{n}$: ningún punto de $X \cap B(p, r)$ tiene primera coordenada λ (esos puntos están en OY o en algún A_k). Entonces $G = \{(x, y) : x < \lambda\}$ y $H = \{(x, y) : x > \lambda\}$ son abiertos de $\mathbb{R}^2$ que cubren N , no se cortan, y $p \in G$, $p_n \in H$: desconectan a N (Prop. 10.3). Ningún entorno de p dentro de $B(p, r)$ es conexo. En la clase 12 (Ej. 5.5) se dio la idea con el peine P , que es el mismo ejemplo: alrededor de un punto p del diente $x = 0$, una bolita que no llega a la base, “cuando uno le hace una foto localmente”, es un manojo de rayitas verticales separadas, y eso no es arcoconexo: “en cuanto tirás un entornito se te metió una patita a la cual no podés viajar”. La guía pide lo mismo con el eje Y y las rectas $y = nx$ [CX 15]: arcoconexo porque todas las rectas pasan por el origen, y no localmente arcoconexo en los puntos del eje Y distintos del origen, con el mismo tipo de argumento.

Ejemplo 10.83 (El peine reducido no es arcoconexo [Peine-del-Topologo.pdf; comparar GT Ej. 4.2.8(4)]). Con la notación del Ejemplo 10.28: $E = (K \times [0, 1]) \cup ([0, 1] \times \{0\})$ es arcoconexo (dientes y base son segmentos, y cada diente corta a la base: Prop. 10.61(a)); el peine $P = \overline{E}$ también (se agrega el segmento $\{0\} \times [0, 1]$, que corta a la base). Pero el peine reducido $R = E \cup \{p\}$, $p = (0, 1)$, que es conexo, *no* es arcoconexo: sus componentes arcoconexas son E y $\{p\}$.

Demostración. Sea $\alpha : [0, 1] \rightarrow R$ un camino con $\alpha(0) = p$; se ve que α es constante, así que ningún punto de E se une con p . Sea $S = \alpha^{-1}(\{p\})$, que contiene a 0. S es cerrado en $[0, 1]$: $\{p\}$ es cerrado (en un métrico los puntos son cerrados) y α es continua. S es abierto en $[0, 1]$: sea $t \in S$. Los puntos de R en $W = B(p, \frac{1}{2})$ son p y trozos de dientes $\{1/n\} \times (\frac{1}{2}, 1]$ (la base está a distancia 1 de p). Por continuidad hay un intervalo $J \ni t$, abierto en $[0, 1]$, con $\alpha(J) \subseteq W$. Si existiera $s \in J$ con $\alpha(s) \neq p$, sería $\alpha(s) = (1/n, y)$ para algún n . La primera coordenada $g = \pi_1 \circ \alpha$ es continua en el intervalo de extremos t y s (contenido en J), con $g(t) = 0$ y $g(s) = 1/n$; por el teorema de Bolzano (del Análisis) toma el valor $\lambda = \frac{1}{n+1/2} \in (\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ en algún punto de J . Pero ningún punto de $R \cap W$ tiene primera coordenada λ . Absurdo: $\alpha(J) = \{p\}$ y $J \subseteq S$. Como $[0, 1]$ es conexo (§10.6) y S es abierto, cerrado y no vacío, $S = [0, 1]$: α es constante en p . $\square$

Observación 10.84 (Moraleja: no hay “sándwich” para caminos [GT Nota 4.2.9, pp. 75–76; CX 16]). $E \subseteq R \subseteq \overline{E}$ con E arcoconexo y R no arcoconexo: la Prop. 10.17 no tiene versión por caminos. Además, la componente arcoconexa $\{p\}$ de R es cerrada pero no abierta, y E es abierta en R pero no cerrada (su clausura en R es R): a diferencia de las componentes conexas (Prop. 10.105), las arcoconexas *no tienen por qué ser cerradas*. La pregunta de CX 16 (“¿es arcoconexa la clausura de un arcoconexo?”) tiene respuesta negativa con el ejemplo siguiente de GT (con el peine la clausura P sí resulta arcoconexa; lo que falla es el conjunto intermedio R).

Ejemplo 10.85 (La escalera: conexo, no arcoconexo, y clausura de un arcoconexo [GT Ej. 4.2.8(4), pp. 73–75, Ej. 4.4.5, p. 79 y Nota 4.2.9, pp. 75–76]). En $\mathbb{R}^2$ sean $A_0 = OY$ (el eje vertical), $A_n = \{1/n\} \times \mathbb{R}$ para $n \geq 1$, y los peldaños horizontales $B_n = [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}] \times \{n\}$, que unen A_{n+1} con A_n a altura n . Sea $X = \bigcup_{n \geq 0} A_n \cup \bigcup_{n \geq 1} B_n$ y $H = X - A_0$. Entonces:

- H es arcoconexo: la sucesión $A_1, B_1, A_2, B_2, A_3, \dots$ es de arcoconexos y cada uno corta al siguiente (Prop. 10.61(c)).
- X es conexo: $H \subseteq X \subseteq \overline{H}$, porque cada $(0, y) \in A_0$ es límite de $(1/n, y) \in A_n$; se aplica el sándwich (Prop. 10.17).
- X no es arcoconexo: no hay camino de un punto de H a uno de A_0 (demostración abajo). Sus componentes arcoconexas son H y A_0 ; $\overline{H} = X$, así que la clausura de un arcoconexo no tiene por qué ser arcoconexa (CX 16), y la componente H no es cerrada.

Demostración de que no es arcoconexo. Supongamos que $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ es continua con $\alpha(0) = q \in H$ y $\alpha(1) \in A_0$. La segunda coordenada $\pi_2 \circ \alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, luego acotada (teorema de Weierstrass del Análisis): $|\pi_2(\alpha(t))| \leq M$ para todo t . La primera coordenada de q es positiva; se elige $n_0 > M$ con $\frac{1}{n_0} < \pi_1(q)$ y $\lambda \in (\frac{1}{n_0+1}, \frac{1}{n_0})$. Por Bolzano (del Análisis) aplicado a $\pi_1 \circ \alpha$,

que vale $\pi_1(q) > \lambda$ en 0 y $0 < \lambda$ en 1, hay t con $\pi_1(\alpha(t)) = \lambda$. Pero los puntos de X con primera coordenada λ están sólo en el peldaño B_{n_0} , a altura $n_0 > M$: absurdo. $\square$

Observación 10.86 (Erratas de GT en 4.2.8(4)). En la demostración impresa, V debe ser $\{(x, y) : x > \lambda\}$ (dice $y > \lambda$), y para que $p \in V$ hay que elegir n_0 también en función de p , como arriba. **GT** prueba la conexión de X viendo que no hay abiertos-cerrados propios; el sándwich lo hace en una línea.




Figura 25. La escalera de GT 4.2.8(4): rectas verticales A_n en $x = 1/n$ unidas por peldaños B_n a altura n (azul), más el eje A_0 (rojo). Para ir de H (azul) a A_0 habría que subir infinitos peldaños: ningún camino, que es acotado, lo logra.

10.9 Puntos de corte

Clase 13 (5/10/2026). Sigue **GT** §4.3 (**MS** lo deja como problema 13 de §7.5). “Para los que vieron matemática discreta: es la idea del vértice de un grafo que, si lo saco, desconecta.” Es la herramienta estándar para probar que dos espacios *no* son homeomorfos: se saca un punto y se cuentan los pedazos.

Definición 10.87 (Punto de corte y orden [GT 4.3.1, p. 76; MS §7.5, problema 13, p. 93; clase 13, Def. 2.1]). Sea (X, τ) arcoconexo y $x \in X$ (la hipótesis no está en **GT**: la agregó la docente, “la gracia es que haya sido arcoconexo antes”). x es un *punto de corte* de X si $X - \{x\}$ (con la topología de subespacio) no es arcoconexo. El *orden de corte* de x es la cantidad de componentes arcoconexas de $X - \{x\}$ (un punto que no es de corte, en un X arcoconexo, tiene orden 1).

$$\begin{aligned} (x \text{ punto de corte de } X &\iff X - \{x\} \text{ no es arcoconexo;} \\ \text{ord}(x) &= \# \{\text{componentes arcoconexas de } X - \{x\}\}.) \end{aligned}$$

Observación 10.88. **MS** usa la misma idea pero cuenta componentes *conexas* de $X - \{x\}$. En todos los ejemplos del curso (subconjuntos de $\mathbb{R}$, abiertos de $\mathbb{R}^n$, circunferencias, grafos finitos) las dos cuentas coinciden, porque esos espacios son localmente arcoconexos (Cor. 10.118).

Ejemplo 10.89 (Puntos de corte de espacios conocidos [GT Ej. 4.3.2, p. 76; MS §7.5, problema 13(ii)–(iii), pp. 93–94; clase 13, Ej. 2.2]).

- En $\mathbb{R}$ todo punto es de corte de orden 2: $\mathbb{R} - \{x\} = (-\infty, x) \cup (x, \infty)$, cada pedazo es un intervalo (arcoconexo), y no hay camino de un lado al otro, porque la imagen de un camino es un arcoconexo de $\mathbb{R}$, o sea un intervalo (§10.6), y contendría a x .
- En $[a, b]$ (con $a < b$), cada $x \in (a, b)$ es de corte de orden 2, y los extremos a, b no son de corte: $[a, b] - \{a\} = (a, b]$ es un intervalo. Así, $[0, 1]$ tiene exactamente *dos* puntos que no son de corte, $(0, 1]$ tiene *uno* y $(0, 1)$ *ninguno*.

- En $\mathbb{R}^n$ con $n \geq 2$ ningún punto es de corte: $\mathbb{R}^n - \{p\}$ es arcoconexo. Dados $q, r \neq p$: si p no está en el segmento $[q, r]$, ese segmento sirve; si está, se toma s fuera de la recta L que pasa por q y r , y la polygonal $[q, s] * [s, r]$ sirve, porque $[q, s]$ sólo toca L en q y $[s, r]$ sólo en r , ambos $\neq p$.
- En S^1 ningún punto es de corte (“por ahí tengo que hacer un camino más largo en vez de uno cortito, pero sigue siendo igual de conexo”): si $p = (\cos \theta, \sin \theta)$, entonces $S^1 - \{p\}$ es la imagen del intervalo $(\theta, \theta + 2\pi)$ por $t \mapsto (\cos t, \sin t)$, arcoconexa por la Prop. 10.56.

Observación 10.90 (Errata de GT). **GT** 4.3.2(2) anuncia el ejemplo para $[0, 1]$ y lo escribe para $[a, b]$; es lo mismo con $a = 0$, $b = 1$.

Proposición 10.91 (Invarianza de los puntos de corte [GT 4.3.5(a), pp. 77–78; MS §7.5, problema 13(i), p. 93; clase 13, Prop. 2.4]). Sea $f : X \rightarrow Y$ un homeomorfismo. Entonces x es punto de corte de orden n de X si y sólo si $f(x)$ es punto de corte de orden n de Y . En consecuencia f lleva biyectivamente los puntos de corte de X (de cada orden) sobre los de Y , y los que no son de corte sobre los que no son de corte: la cantidad de puntos de cada tipo es un invariante topológico.

$$(f : X \rightarrow Y \text{ homeomorfismo} \Rightarrow \forall x \in X : \text{ord}_X(x) = \text{ord}_Y(f(x)).)$$

Demostración. Como f es biyectiva, $f(X - \{x\}) = Y - \{f(x)\}$, y la restricción $f| : X - \{x\} \rightarrow Y - \{f(x)\}$ es un homeomorfismo entre subespacios (es continua, biyectiva, y su inversa es la restricción de f^{-1} , también continua; §8). Por la Prop. 10.74, un homeomorfismo da una biyección entre componentes arcoconexas, así que $X - \{x\}$ e $Y - \{f(x)\}$ tienen la misma cantidad de ellas. La vuelta es lo mismo con f^{-1} . (“Le saqué un puntito a cada uno; restringir nunca pierde continuidad.”) $\square$




Figura 26. Invarianza de los puntos de corte (dibujo de la clase 13): al sacar x y $f(x)$, la restricción $\tilde{f}$ sigue siendo un homeomorfismo, y dos componentes de un lado son dos del otro.

Corolario 10.92 (Espacios que no son homeomorfos [GT §4.3; MS §7.5, problema 13(ii)–(iii), pp. 93–94; clase 13, $\mathbb{R}$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^n$ para $n \geq 2$; en particular $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^2$).

- (b) $[0, 1]$, $(0, 1]$ y $(0, 1)$ son dos a dos no homeomorfos; como $(0, 1) \cong \mathbb{R}$, tampoco $[0, 1] \cong \mathbb{R}$.
(c) $[0, 1]$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, ni S^1 a ningún intervalo; en particular $\mathbb{R} \not\cong S^1$ (el corolario dictado: en $\mathbb{R}$ todo punto es de corte y S^1 no tiene).

$$(\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^n \ (n \geq 2); \quad [0, 1] \not\cong (0, 1] \not\cong (0, 1) \cong \mathbb{R}; \quad [0, 1] \not\cong \mathbb{R}^2; \quad S^1 \not\cong J \ (J \subseteq \mathbb{R} \text{ intervalo}).)$$

Demostración. Todo por la Prop. 10.91 y el Ejemplo 10.89. (a) Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ fuera homeomorfismo, $f(0)$ sería de corte en $\mathbb{R}^n$, que no tiene. (b) Los puntos que no son de corte son 2, 1 y 0 respectivamente, y esa cantidad es invariante. (c) Un punto interior de $[0, 1]$ es de corte y $\mathbb{R}^2$ no tiene; S^1 no tiene puntos de corte, y un intervalo con más de un punto sí (sus puntos interiores). $\square$

Observación 10.93. La conexión sola no alcanza para distinguirlos: todos son conexos y arcoconexos. Lo que los separa es cómo se rompen al sacar un punto. El mismo truco, sacando dos puntos, distingue por ejemplo S^1 de la figura “8”.

Definición 10.94 (Punto de corte local [GT 4.3.3, p. 77; clase 13, Def. 2.3]). x es un *punto de corte local de orden n* de X si todo entorno N de x contiene otro entorno N' de x tal que $N' - \{x\}$ tiene exactamente n componentes arcoconexas.

$$(x \text{ de corte local de orden } n \iff \forall N \in \mathcal{N}_x \exists N' \in \mathcal{N}_x : N' \subseteq N \wedge \#\{\text{comp. arcoconexas de } N' - \{x\}\} = n).$$

Observación 10.95 (Errata de GT). El enunciado de **GT** 4.3.3 dice “existe otro $N' \subseteq N$ ” sin pedir que sea entorno; la demostración de 4.3.5(b) usa que lo es, y sin esa condición la definición no tiene sentido (siempre se podría tomar N' con n puntos aislados).

Ejemplo 10.96 ([GT Ej. 4.3.4, p. 77]). En el rombo con sus dos diagonales (Figura 27), ningún punto es de corte (el grafo sigue arcoconexo al sacar cualquier punto), pero: un punto interior de una arista, como x , es de corte local de orden 2; un vértice del rombo, como y (donde llegan dos lados y una diagonal), es de corte local de orden 3; y el centro z (cruce de las diagonales) es de corte local de orden 4.




Figura 27. GT Ej. 4.3.4. Órdenes de corte locales: x tiene 2, y tiene 3, z tiene 4. Un entorno chico de z (círculo rayado) menos z se parte en 4 trocitos de segmento; ninguno de los tres puntos es de corte global.

Proposición 10.97 (Invarianza de los puntos de corte locales [GT 4.3.5(b), pp. 77–78; clase 13]). Si $f : X \rightarrow Y$ es un homeomorfismo, x es de corte local de orden n en X si y sólo si $f(x)$ lo es en Y .

$$(f \text{ homeomorfismo} \Rightarrow (x \text{ de corte local de orden } n \text{ en } X \iff f(x) \text{ de corte local de orden } n \text{ en } Y).)$$

Idea. Un homeomorfismo lleva entornos de x en entornos de $f(x)$ y viceversa (es abierto y continuo), y restringido a $N' - \{x\}$ es un homeomorfismo sobre $f(N') - \{f(x)\}$; se aplica la Prop. 10.74. “Es lo mismo, con el laburo de tomarse el entornito.” $\square$

Observación 10.98 (Cómo se prueba que dos espacios no son homeomorfos [clase 13, Obs. 2.5; CX 19]). Primero se cuentan las componentes conexas (Prop. 10.110); si coinciden, se miran los puntos de corte (Prop. 10.91). Para que haya un homeomorfismo tienen que coincidir las dos cosas. Es exactamente el argumento del Ejemplo 10.120.

10.10 Conexo más localmente arcoconexo implica arcoconexo

GT 4.4.5–4.4.6 y **MS** Prop. 7.18: la conexión es más débil que la arcoconexión, pero con una hipótesis local se recupera la equivalencia.

Ejemplo 10.99 (Conexo que no es arcoconexo [*GT Ej. 4.4.5, p. 79; MS Ej. 7.2, p. 91; clase 11*]). La escalera (Ejemplo 10.85), el peine reducido (Ejemplos 10.28 y 10.83) y el seno del topólogo (Ejemplo 10.55) son conexos y no arcoconexos. Así, la Prop. 10.52 no tiene recíproca.

Teorema 10.100 (Conexo y localmente arcoconexo $\Rightarrow$ arcoconexo [*GT 4.4.6, p. 79; MS Prop. 7.18, p. 91; clase 12, Prop. 8.1*]). Si (X, τ) es localmente conexo por caminos, entonces X es conexo si y sólo si es conexo por caminos.

$$(X \text{ loc. arcoconexo} \Rightarrow (X \text{ conexo} \iff X \text{ arcoconexo}).)$$

Demostración. ($\Leftarrow$) Es la Prop. 10.52, que no usa la hipótesis local. ($\Rightarrow$) Si $X = \emptyset$ no hay nada que probar. Si no, sea $x_0 \in X$. Por la Prop. 10.79, $c(x_0)$ es abierta y cerrada, y no es vacía; como X es conexo, $c(x_0) = X$ (Prop. 10.5). Es decir, todo punto se une con x_0 por un camino, y por transitividad (Prop. 10.58) dos puntos cualesquiera se unen entre sí. $\square$

Observación 10.101 (Ejercicio típico de final [*clase 12, Obs. 8.2–8.3*]). “Ni un camino tiré: propiedad, propiedad, propiedad”. La docente lo presentó así: (a) Defina X conexo. (b) Defina X arcoconexo. (c) Enuncie y demuestre la implicación correcta entre ambos conceptos. (d) Indique bajo qué condiciones los dos conceptos son equivalentes, y demuéstrela. Los lemas previos (que la componente es abierta y cerrada, Prop. 10.79) “son de regalo”; lo que se evalúa es arcoconexo $\Rightarrow$ conexo (Prop. 10.52) y este teorema. Moraleja para contraejemplos: un conexo no arcoconexo *no puede* ser localmente arcoconexo, “¡por eso el peine del topólogo no es localmente arcoconexo!”. Sobre $X = \emptyset$: “si X es vacío nos vamos y no hablamos”; se asume $X \neq \emptyset$ al hablar de (arco)conexidad.

Corolario 10.102 (Abiertos conexos de $\mathbb{R}^n$ [*MS Ejemplos 7.3(4), p. 91*]). Todo abierto conexo de $\mathbb{R}^n$ (o de un espacio normado) es arcoconexo. De hecho, dos puntos se unen con una poligonal.

$$(U \subseteq \mathbb{R}^n \text{ abierto} \wedge U \text{ conexo} \Rightarrow U \text{ arcoconexo}).$$

Demostración. U es localmente arcoconexo: las bolas contenidas en U son convexas y forman bases de entornos (Ejemplo 10.81). Se aplica el Teorema 10.100. (Para la poligonal: el conjunto de puntos que se unen con x_0 por una poligonal dentro de U es abierto y cerrado en U , con el mismo argumento de la Prop. 10.79.) $\square$

10.11 Componentes conexas y conexión local

Clase 13 (5/10/2026). Sigue **GT** §4.6 y **MS** §7.2. Aviso de la docente: **GT** usa la misma letra C_x que para la componente arcoconexa (“medio desubicado”); hay que leer las palabras, porque no siempre coinciden. Los ejemplos en que difieren son los molestos (peine, seno del topólogo); en ejemplos sencillos se pueden pensar iguales. Es la misma construcción que la de las componentes arcoconexas, con “conexo” en lugar de “arcoconexo”; la diferencia importante es que ahora las componentes *siempre* son cerradas (el sándwich sí vale para conexos).

Definición 10.103 (Componente conexa [*GT 4.6.1, p. 84; MS Def. 7.5, p. 90; clase 13, Def. 3.1*]). Sea (X, τ) y $x \in X$. La *componente conexa* de x , $C(x)$, es el mayor subconjunto conexo de X que contiene a x : es conexo, contiene a x , y contiene a todo conexo que contenga a x .

$$(C(x) \text{ conexo} \wedge x \in C(x) \wedge \forall A \subseteq X (A \text{ conexo} \wedge x \in A \Rightarrow A \subseteq C(x)).)$$

Lema 10.104 (La componente existe [GT Lema 4.6.2, p. 84; clase 13, Lema 3.2]). Para todo $x \in X$, $C(x)$ existe: es la unión de todos los conexos de X que contienen a x .

$$(C(x) = \bigcup \{A \subseteq X : A \text{ conexo}, x \in A\}.)$$

Demostración. La familia no es vacía ($\{x\}$ es conexo) y todos sus miembros contienen a x , así que su unión es conexa (Prop. 10.15(b)); contiene a x y a cada conexo que contenga a x . “Es una demostración constructiva: agarra la colección de todos los conexos que contienen a x , cosa que uno no hace en la vida cotidiana, hay infinitos.” La imagen: $C(x)$ es hasta dónde se puede seguir agrandando un conexo que contiene a x sin que deje de ser conexo. $\square$

Proposición 10.105 (Propiedades de las componentes conexas [GT 4.6.5 y Nota 4.6.4, pp. 84–85; MS Lema 7.13, Teo. 7.14, Prop. 7.15(i), p. 90; clase 13, Prop. 3.4]). En (X, τ) , para todos $x, y \in X$:

- (1) $x \in C(x)$ y $C(x)$ es conexo;
- (2) $C(x)$ es cerrado en X ;
- (3) si $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset$, entonces $C(x) = C(y)$: las componentes conexas forman una partición de X ;
- (4) X es conexo si y sólo si tiene una sola componente, $C(x) = X$ para todo x .

$$(C(x) = \overline{C(x)}; \quad C(x) \cap C(y) \neq \emptyset \Rightarrow C(x) = C(y); \quad X \text{ conexo} \iff \forall x : C(x) = X.)$$

Demostración. (1) Por definición. (2) $\overline{C(x)}$ es conexo (sándwich, Prop. 10.17) y contiene a x , así que $\overline{C(x)} \subseteq C(x)$ por maximalidad; la otra inclusión es de siempre. (3) $C(x) \cup C(y)$ es conexo por ser unión de conexos que se cortan (Prop. 10.14) y contiene a x y a y ; por maximalidad $C(x) \cup C(y) \subseteq C(x)$ y $\subseteq C(y)$, luego $C(x) = C(y)$. (4) Si X es conexo es él mismo el mayor conexo que contiene a x . Si $C(x) = X$, X es conexo por (1). $\square$

Observación 10.106 (La prueba de (3) que se dictó, y la relación de equivalencia [clase 13, Prop. 3.4 y Obs. 3.5]). En clase (3) se probó sin uniones, por maximalidad pura: si $z \in C(x) \cap C(y)$, entonces $C(x)$ y $C(y)$ son conexos que contienen a z , luego $C(x), C(y) \subseteq C(z)$; y $C(z)$ es un conexo que contiene a x (porque $x \in C(x) \subseteq C(z)$), luego $C(z) \subseteq C(x)$; igual $C(z) \subseteq C(y)$. Así $C(x) = C(z) = C(y)$. “Me resulta más sencillo decirlo así: si $y \in C(x)$, entonces $C(x) = C(y)$.” Para (2): “las componentes conexas son cerradas *siempre*”. El camino es el inverso del de las componentes arcoconexas: allá primero la relación y después las clases; acá primero las componentes y, como toda partición induce una relación de equivalencia (“esto lo probamos alguna vez en la vida, en Lógica”), $x \approx y \iff C(x) = C(y)$ es de equivalencia y sus clases son las componentes conexas.

Proposición 10.107 (Un conexo queda dentro de una componente [MS Prop. 7.16, p. 90; MS §7.5, problema 9, p. 93]). Si C es una componente conexa de X y $A \subseteq X$ es conexo, entonces $A \subseteq C$ o $A \cap C = \emptyset$. Además, todo subconjunto no vacío, conexo, abierto y cerrado de X es una componente conexa.

$$(A \text{ conexo} \Rightarrow A \subseteq C \vee A \subseteq X - C; \quad \emptyset \neq A \text{ conexo, abierto y cerrado} \Rightarrow A = C(a) \quad \forall a \in A.)$$

Demostración. Si A corta a $C = C(x)$ en a , entonces $C(a) = C$ y $A \subseteq C(a)$ por maximalidad. Para la segunda: si $a \in A$, $A \subseteq C(a)$ por maximalidad; y como $C(a)$ es conexo y corta al abierto-cerrado A , queda entero de ese lado (Prop. 10.7): $C(a) \subseteq A$. $\square$

Proposición 10.108 (Componentes arcoconexas dentro de componentes conexas [MS §7.4, p. 92 (“Def.” 7.10)]). *Para todo $x \in X$, $c(x) \subseteq C(x)$: cada componente conexa es unión de componentes arcoconexas. En particular, un abierto-cerrado es unión de componentes arcoconexas (CX 17).*

$$(\forall x \in X : c(x) \subseteq C(x); \quad A \text{ abierto y cerrado} \Rightarrow A = \bigcup_{a \in A} c(a).)$$

Demostración. $c(x)$ es arcoconexo, luego conexo (Prop. 10.52), y contiene a x : por maximalidad $c(x) \subseteq C(x)$. Para CX 17: si $a \in A$, el conexo $c(a)$ corta al abierto-cerrado A , así que $c(a) \subseteq A$ (Prop. 10.7). $\square$

Observación 10.109. MS numera este hecho como “Definición 7.10”, pero es una afirmación demostrable. La inclusión puede ser estricta: en el peine reducido, $C(p) = R$ y $c(p) = \{p\}$.

Proposición 10.110 (Componentes e imagen continua [GT 4.6.10, p. 87; MS §7.5, problema 8, p. 93; CX 20; clase 13, Prop. 3.11]). *Sea $f : X \rightarrow Y$ continua. Entonces $f(C(x)) \subseteq C(f(x))$, y si E es una componente conexa de Y , $f^{-1}(E)$ es unión de componentes conexas de X . Si f es un homeomorfismo, $f(C(x)) = C(f(x))$ y f induce una biyección entre las componentes conexas de X y las de Y , con componentes correspondientes homeomorfas.*

$$(f \text{ continua} \Rightarrow f(C(x)) \subseteq C(f(x)) \wedge f^{-1}(E) = \bigcup_{x \in f^{-1}(E)} C(x); \quad f \text{ homeomorfismo} \Rightarrow f(C(x)) = C(f(x)).)$$

Demostración. $f(C(x))$ es conexo (Prop. 10.8) y contiene a $f(x)$, así que está en $C(f(x))$. Si $x \in f^{-1}(E)$, entonces $E = C(f(x)) \supseteq f(C(x))$, o sea $C(x) \subseteq f^{-1}(E)$ (CX 20). Para el homeomorfismo, igual que en la Prop. 10.74, aplicando lo anterior a f^{-1} ; y la restricción de un homeomorfismo a $C(x)$ es un homeomorfismo sobre su imagen $C(f(x))$. $\square$

Observación 10.111 (Para qué se usa [clase 13, Prop. 3.11 y Fig. 8]). “Lo que más se usa es para el *no*”: $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R} - \{0\}$ (una componente contra dos); el plano no es homeomorfo al plano menos una recta (dos componentes), ni éste al plano menos los dos ejes (cuatro). En el parcial puede aparecer “muy verdadero o falso”. (GT 4.6.10, “el último teorema del apunte”, deja la demostración como ejercicio análogo a 4.2.7.)

Ejemplo 10.112 (Componentes conexas [GT Ej. 4.6.3 y 4.6.6, pp. 84–85; GT Ej. 4.6.9(2), p. 86; clase 13, Ejs. 3.3 y 3.6]).

- Si X es conexo, $C(x) = X$ para todo x (el extremo opuesto a $\mathbb{Q}$: $\mathbb{R}$). En $\mathbb{R} - \{0\}$, $C(x) = (0, +\infty)$ si $x > 0$ y $C(x) = (-\infty, 0)$ si $x < 0$.
- En $\mathbb{Q}$ (usual) la componente de cada x es $\{x\}$: los únicos conexos no vacíos son los puntos (es totalmente desconexo). Lo mismo en un discreto. Aquí las componentes *no* son abiertas.
- Sea $A = \{1/n : n \geq 1\} \cup \{0\}$ y $X = A \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^2$. La componente de (a, y) es la recta $\{a\} \times \mathbb{R}$. En efecto, esa recta es conexa, luego está en la componente; y si $(a', y') \in C((a, y))$, la proyección $\pi_1(C((a, y)))$ es un conexo de $A \subseteq \mathbb{Q}$, luego un punto, que tiene que ser a : $a' = a$. La componente $\{0\} \times \mathbb{R}$ es cerrada pero no abierta en X .
- En el peine reducido y en la escalera hay una sola componente conexa (son conexos), pero dos componentes arcoconexas.

Definición 10.113 (Localmente conexo [GT 4.6.7, p. 85; clase 13, Def. 3.7]). (X, τ) es *localmente conexo* si todo entorno de cualquier punto contiene un entorno conexo de ese punto (cada punto tiene una base de entornos conexos).

$$(X \text{ loc. conexo} \iff \forall x \in X \forall N \in \mathcal{N}_x \exists N' \in \mathcal{N}_x : N' \subseteq N \wedge N' \text{ conexo.})$$

Observación 10.114. Localmente arcoconexo $\Rightarrow$ localmente conexo, porque los entornos arcoconexos son conexos (Prop. 10.52). Ser conexo y ser localmente conexo son independientes (tabla de abajo). Igual que con caminos, que exista *un* entorno conexo de cada punto no alcanza: dado un N cualquiera hay que conseguir uno conexo más chico. Por ejemplo, $\mathbb{R} - \{0\}$ es localmente conexo y no es conexo, con el mismo intervalo $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, $\varepsilon < |x|$, del Ejemplo 10.78 [clase 13, Ej. 3.8].

Proposición 10.115 (En un localmente conexo las componentes son abiertas [GT 4.6.8, pp. 85–86; clase 13, Prop. 3.9]). Si (X, τ) es localmente conexo, toda componente conexa $C(x)$ es abierta (y, por la Prop. 10.105, abierta y cerrada).

$$(X \text{ loc. conexo} \Rightarrow \forall x \in X : C(x) \in \tau.)$$

Demostración. Sea $y \in C(x)$, de modo que $C(y) = C(x)$. Aplicando la definición al entorno $N = X$, hay un entorno conexo N' de y ; como contiene a y , $N' \subseteq C(y) = C(x)$ (“spoiler alert: no se iba a poder escapar”). Así $C(x)$ es entorno de cada uno de sus puntos; en clase, con interiores: $y \in G \subseteq N'^{\circ} \subseteq C(x)^{\circ}$. $\square$

Corolario 10.116 (Si hay un número finito de componentes, son abiertas [CX 23]). Si X tiene una cantidad finita de componentes conexas, cada una es abierta (y cerrada).

$$(X = C_1 \cup \dots \cup C_k \text{ (componentes)} \Rightarrow \forall i : C_i \in \tau.)$$

Demostración. $X - C_i$ es la unión de las otras $k - 1$ componentes, cada una cerrada (Prop. 10.105); unión finita de cerrados es cerrada, así que C_i es abierta. $\square$

Observación 10.117 (Uso en la guía). **CX 21** (en un compacto con componentes abiertas hay finitas) usa la Prop. 10.105(3): las componentes son un cubrimiento por abiertos disjuntos, del que no se puede sacar ninguno; necesita compacidad, que se ve más adelante. **CX 22** (un abierto U de un localmente conexo es localmente conexo) sale de que, si U es abierto, los entornos de x en el subespacio U son exactamente los entornos de x en X contenidos en U .

Corolario 10.118 (En un localmente arcoconexo, componentes conexas y arcoconexas coinciden [consecuencia de GT 4.2.6 y MS §7.4, p. 92]). Si X es localmente conexo por caminos, entonces $c(x) = C(x)$ para todo x .

$$(X \text{ loc. arcoconexo} \Rightarrow \forall x \in X : c(x) = C(x).)$$

Demostración. $c(x) \subseteq C(x)$ siempre (Prop. 10.108). Por la Prop. 10.79, $c(x)$ es abierta y cerrada; el conexo $C(x)$ la corta (en x), así que $C(x) \subseteq c(x)$ (Prop. 10.7). $\square$

Ejemplo 10.119 (Conexión local [GT Ej. 4.6.9, pp. 86–87; clase 13, Ej. 3.10]).

- $\mathbb{R}^n$ es localmente arcoconexo, luego localmente conexo. En general, la forma más cómoda de probar que algo de $\mathbb{R}^2$ es conexo es probar que es arcoconexo: la circunferencia unidad unida con las rectas $y = x$ e $y = -x$ es arcoconexa (cada pedazo es una parametrización y se cortan, Prop. 10.61), luego conexa (Figura 28).
- $(\mathbb{R}, \text{discreta})$ no es conexo pero sí localmente conexo ($\{x\} = B(x, \frac{1}{2})$ es un entorno conexo de x : “el truco está en que el punto es un entorno”); sus componentes son los puntos, que acá sí son abiertos.
- $\mathbb{Q}$ no es conexo ni localmente conexo: sus únicos conexos no vacíos son puntos, que no son entornos de nadie (tienen interior vacío).
- El espacio del Ejemplo 10.82 (y el peine P) es conexo, incluso arcoconexo, y no es localmente conexo: “en cuanto hago un entornito se me meten rayitas”.




Figura 28. Clase 13: la circunferencia con las rectas $y = \pm x$ es unión de tres arcoconexos que se cortan, luego arcoconexa y por lo tanto conexa.

Ejemplo 10.120 (Aplicación: dos subespacios de $\mathbb{R}$ no homeomorfos [CX 19; clase 13, Obs. 2.5]). $X = \mathbb{N} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (-n-1, -n)$ e $Y = \mathbb{N} \cup [\frac{1}{2}, \frac{2}{3}] \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (-n-1, -n)$ no son homeomorfos (con $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$). Los conexos de un subconjunto de $\mathbb{R}$ son intervalos (§10.6), así que las componentes conexas de X son los puntos de $\mathbb{N}$ y los intervalos abiertos $(-n-1, -n)$; las de Y son esas y además $[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}]$. Contar componentes no alcanza (hay infinitas numerables en los dos), pero si $h : Y \rightarrow X$ fuera homeomorfismo, h llevaría la componente $[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}]$ sobre una componente de X homeomorfa a ella (Prop. 10.110): no puede ser un punto, y tampoco un intervalo abierto, porque $[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}]$ tiene dos puntos que no son de corte y un intervalo abierto ninguno (Prop. 10.91). (Si se toma $0 \in \mathbb{N}$, en X e Y aparece además la componente $(-1, 0]$, que tiene un solo punto que no es de corte; el argumento no cambia.)

Observación 10.121 (Mapa de ejemplos). Resumen de las cuatro propiedades en los ejemplos de esta sección (“loc.”=localmente). Las implicaciones generales son: arcoconexo $\Rightarrow$ conexo; loc. arcoconexo $\Rightarrow$ loc. conexo; conexo + loc. arcoconexo $\Rightarrow$ arcoconexo.

Espacio	conexo	arcoconexo	loc. conexo	loc. arcoconexo
$\mathbb{R}^n$, bolas, S^1 , abiertos conexos de $\mathbb{R}^n$	sí	sí	sí	sí
$[-1, 0] \cup (0, 1]$; $(\mathbb{R}, \text{discreta})$	no	no	sí	sí
$\mathbb{Q}$	no	no	no	no
peine P ; Ej. 10.82; CX 15	sí	sí	no	no
peine reducido R ; escalera; seno del topólogo	sí	no	no	no

Falta en la tabla “conexo, localmente conexo y no arcoconexo”: por el Teorema 10.100 un ejemplo así no puede ser localmente arcoconexo. Existe: $\mathbb{N}$ con la topología cofinita es conexo y localmente conexo (todo abierto no vacío es infinito con la cofinita, luego conexo, Ej. 10.2), pero no es arcoconexo; esto último usa un teorema de Sierpiński ($[0, 1]$ no es unión numerable de dos o más cerrados no vacíos disjuntos dos a dos), que excede el curso.

11 Compacidad

Empieza en la clase 13 (5/10/2026) con **GT** §3.1. La docente anticipó que la topología producto se evalúa “con conexidad o con compacidad”. Sigue **GT** cap. 3 (§§3.1–3.8, pp. 44–60), cruzado con **MS** cap. 6 (pp. 79–84). El producto de compactos se hace con la topología producto de §9 (lema del tubo), no con la versión métrica de **GT** 3.5.1. En **GT** varios enunciados dicen “(seudo)métrico”; acá se escriben para métricos, que es lo que usan los ejercicios (en un pseudométrico se pierde Hausdorff y con él la §11.3).

11.1 Definición y primeros ejemplos

“La compacidad es medio incómoda: conexidad a ojo uno la ve; compacidad no.” **GT** abre con un diagrama de la idea intuitiva (Figura 29), que la docente mostró con una advertencia: no quedarse con la idea intuitiva, sino con la definición formal. En $\mathbb{R}^n$ compacto va a resultar lo mismo que *cerrado y acotado* (§11.6); en métricos, lo mismo que *secuencialmente compacto* (toda sucesión tiene una subsucesión convergente), y ahí va a haber cerrados y acotados no compactos; la definición general, la de espacios topológicos, es la de recubrimientos. “Probar que algo es cerrado y acotado es muchísimo más fácil que probar que de todo cubrimiento por abiertos se puede extraer un subcubrimiento finito.”





Figura 29. El diagrama de *GT* p. 44, mostrado en la clase 13. La definición es la del medio; las otras dos son teoremas que valen en su contexto (Heine–Borel y Bolzano–Weierstrass, §11.6).

Definición 11.1 (Recubrimiento, subrecubrimiento [*GT* 3.1.1–3.1.3, p. 44; *MS* Def. 6.1, p. 79; clase 13, Def. 4.1]). Sea X un conjunto y $A \subseteq X$. Un *recubrimiento* de A (en **MS**: *cubrimiento*) es una familia $\{C_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ de subconjuntos de X cuya unión contiene a A ; si $A = X$, la unión es exactamente X . Es un *recubrimiento por abiertos* si cada C_α es abierto. Un *subrecubrimiento* es una subfamilia $\{C_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda'}$, con $\Lambda' \subseteq \Lambda$, que todavía cubre a A ; es *finito* si Λ' es finito.

$$\begin{aligned} \{C_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \text{ recubre } A &\iff A \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Lambda} C_\alpha; \\ \{C_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda'} \text{ subrecubrimiento} &\iff \Lambda' \subseteq \Lambda \wedge A \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Lambda'} C_\alpha. \end{aligned}$$

Observación 11.2 (Qué es y qué no es un subcubrimiento [*clase* 13, §4]). Un recubrimiento puede ser redundante, superponerse, pasarse de A : “siempre y cuando cubran A ” (dos que cubren, infinitos que cubren, todas las bolas $B(x, 1)$ con $x \in A$, partir A en dos). Un subrecubrimiento es quedarse con *algunos* de los mismos conjuntos, indexados por $\Lambda' \subseteq \Lambda$, que sigan cubriendo: “no puedo inventar abiertos nuevos” (la intersección de dos del recubrimiento no vale), “tenía los abiertos 1 a 50 y me quedo con el 12, el 15 y el 23”. Todo recubrimiento es su propio subrecubrimiento.

Definición 11.3 (Compacto [*GT* 3.1.4–3.1.5, p. 44; *MS* Def. 6.2, p. 79; clase 13, Def. 4.2]). Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$. A es *compacto* (en (X, τ)) si de *todo* recubrimiento de A por abiertos de X se puede extraer un subrecubrimiento finito. Si $A = X$, se dice que (X, τ) es un *espacio compacto*.



celeste: un recubrimiento de A
 rojo: un subrecubrimiento
 (algunos de los mismos, y siguen cubriendo)

Figura 30. Recubrimiento y subrecubrimiento, como en la pizarra de la clase 13: se eligen algunos de los mismos abiertos, sin inventar nuevos.

$$\begin{aligned} (A \text{ compacto} &\iff \forall \{G_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \tau \left(A \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Lambda} G_\alpha \right. \\ &\Rightarrow \left. \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \Lambda : A \subseteq G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n} \right).) \end{aligned}$$

Intuición. El cuantificador es “*todo* recubrimiento”: para probar que algo es compacto hay que tomar un recubrimiento abierto *cualquiera* (no uno elegido por uno) y achicarlo a finitos. Para probar que *no* es compacto alcanza con exhibir *un* recubrimiento abierto sin subrecubrimiento finito. Es la misma asimetría que en conexidad, pero dada vuelta: acá lo fácil es romper la compacidad. La imagen mental: un compacto es un conjunto que “se comporta como si fuera finito” respecto de los abiertos; los resultados de este capítulo son, casi todos, cosas obvias para conjuntos finitos que siguen valiendo para compactos.

Observación 11.4 (La negación: no compacto [clase 13, Obs. 4.3]). A no es compacto si y sólo si *existe* un recubrimiento de A por abiertos del que *no* se puede extraer ningún subrecubrimiento finito. Ojo: compacto no quiere decir que exista un recubrimiento finito (“por ahí existe uno muy amigable”; $\mathbb{R}^2$ se cubre con cuatro abiertos y no es compacto), sino que *cada vez* que te dan un recubrimiento, devolvés uno finito. Probar que algo sí es compacto por la definición “lo haremos tres veces en la vida” (el intervalo cerrado); después se usan propiedades.

$$(A \text{ no compacto} \iff \exists \{G_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \tau : A \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Lambda} G_\alpha \wedge \forall \Lambda' \subseteq \Lambda \text{ finito} : A \not\subseteq \bigcup_{\alpha \in \Lambda'} G_\alpha.)$$

Lema 11.5 (La compacidad es absoluta [GT 3.1.6, pp. 44–45; MS Lema 6.1, pp. 79–80; clase 13, Obs. 4.4]). Sea $A \subseteq (X, \tau)$. Entonces A es compacto en (X, τ) si y sólo si el subespacio (A, τ_A) es un espacio compacto. En particular, si $A \subseteq B \subseteq X$, A es compacto en X sii es compacto en el subespacio B .

$$(A \text{ compacto en } (X, \tau) \iff (A, \tau_A) \text{ compacto.})$$

Demostración. Se traducen los recubrimientos con $\tau_A = \{G \cap A : G \in \tau\}$. ($\Rightarrow$) Si $A = \bigcup_{\alpha} (H_\alpha \cap A)$ con $H_\alpha \in \tau$, los H_α recubren A por abiertos de X ; se extraen $H_{\alpha_1}, \dots, H_{\alpha_n}$ y entonces $A = (H_{\alpha_1} \cap A) \cup \dots \cup (H_{\alpha_n} \cap A)$. ($\Leftarrow$) Si $A \subseteq \bigcup_{\alpha} U_\alpha$ con $U_\alpha \in \tau$, los $U_\alpha \cap A$ recubren al espacio A por abiertos de τ_A ; se extraen finitos, $A = \bigcup_i (U_{\alpha_i} \cap A) \subseteq \bigcup_i U_{\alpha_i}$. $\square$

Observación 11.6. Por el lema, “ A es compacto” no depende del espacio ambiente (a diferencia de “ A es abierto”, ver §8), y todo lo que se pruebe para espacios compactos vale para subconjuntos compactos. Además MS (Obs. 6.1(2), p. 80) observa que en la definición alcanza con recubrimientos por abiertos *básicos*: si $\{G_\alpha\}$ es un recubrimiento abierto, cada punto está en un básico metido en algún G_α ; se extrae un subrecubrimiento finito de esos básicos y se reemplaza cada uno por el G_α que lo contiene.

Proposición 11.7 (Finitos y uniones finitas [GT Ej. 3.1.9 y 3.1.11, p. 45; MS Obs. 6.1(1),(4), p. 80; clase 13, Props. 5.2 y 5.5]). *En cualquier espacio topológico, todo conjunto finito es compacto, y la unión de una cantidad finita de compactos es compacta.*

$$(A \text{ finito} \Rightarrow A \text{ compacto}; \quad A_1, \dots, A_m \text{ compactos} \Rightarrow A_1 \cup \dots \cup A_m \text{ compacto.})$$

Demostración. Si $A = \{a_1, \dots, a_s\} \subseteq \bigcup_{\alpha} G_{\alpha}$, para cada a_i se elige un $G_{\alpha_i} \ni a_i$; los s elegidos cubren A . Si $\{G_{\alpha}\}$ cubre $A_1 \cup \dots \cup A_m$, cubre a cada A_j ; cada uno usa finitos, y la unión de m familias finitas es finita. Para dos: $A \subseteq G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n}$ y $B \subseteq G_{\beta_1} \cup \dots \cup G_{\beta_m}$, así que $A \cup B$ se cubre con $n + m$; “finito más finito da finito”. $\square$

Observación 11.8 (Tarea: ¿y la intersección? [clase 13, Obs. 5.6; guía de compacidad, ej. 3]). “Cuando está la propiedad de la unión, yo pregunto: ¿vale la intersección?”. *Respuesta:* en un Hausdorff sí (los compactos son cerrados, Cor. 11.21, y un cerrado dentro de un compacto es compacto, Prop. 11.17); en general no. Sea $X = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ con la topología: U es abierto si (cuando contiene a a o a b) le faltan sólo finitos naturales. $K_1 = \mathbb{N} \cup \{a\}$ es compacto (el abierto que cubre a a deja afuera finitos puntos, y se cubre cada uno con otro abierto), igual $K_2 = \mathbb{N} \cup \{b\}$, pero $K_1 \cap K_2 = \mathbb{N}$ es un discreto infinito, no compacto. La guía pide la versión que sí vale siempre: K compacto y C cerrado $\Rightarrow K \cap C$ compacto (ej. 3, §11.2).

Ejemplo 11.9 (Espacios que no son compactos [GT Ej. 3.1.7, p. 45; MS Ejemplos 6.1(8) y Contraej. 6.1, pp. 80–81; clase 13, Ej. 5.1 y Obs. 7.2]).

- $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$ no es compacto: $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \geq 1} B(0, k)$, y una cantidad finita de esas bolas es la de radio máximo, que no es todo $\mathbb{R}^n$.
- $(0, 1)$ no es compacto: $\{(\frac{1}{k}, 1)\}_{k \geq 2}$ lo recubre, y finitos de ellos dan $(\frac{1}{k_0}, 1) \neq (0, 1)$. En clase, para (a, b) : $\{(a, b - \frac{1}{n})\}_n$ (Figura 31).

Demostración dictada de que $\mathbb{R}^n$ no es compacto. Basta exhibir un recubrimiento sin subrecubrimiento finito. $\mathcal{U} = \{B(0, n)\}_{n \in \mathbb{N}}$: son abiertos (bolas abiertas), infinitos numerables, y cubren, porque dado x hay un natural $n > \|x\|$ (“los naturales son más grandes que cualquier número que se les ocurra”). Si hubiera un subrecubrimiento finito $\mathbb{R}^n = B(0, n_1) \cup \dots \cup B(0, n_k)$, con $n_0 = \max\{n_1, \dots, n_k\}$ la unión es $B(0, n_0)$ (bolas concéntricas encajadas), acotada; pero $\mathbb{R}^n$ no está acotado: absurdo. $\square$




Figura 31. Recubrimientos sin subrecubrimiento finito (pizarra de la clase 13): las bolas concéntricas de $\mathbb{R}^2$ y los intervalos $(a, b - \frac{1}{n})$ en (a, b) (escala ilustrativa).

Ejemplo 11.10 (Las topologías de referencia [GT Ej. 3.1.8 y 3.1.10, p. 45; MS Ejs. 6.1(1), (2), (5) y (6), p. 80]).

- *Indiscreta*: todo subconjunto es compacto (el único abierto no vacío es X , así que cualquier recubrimiento contiene a X).
- *Discreta*: A es compacto sii es finito. Si A es infinito, $\{\{a\}\}_{a \in A}$ es un recubrimiento abierto en el que ningún elemento sobra, luego no tiene subrecubrimiento finito. En particular, $(\mathbb{N}, \tau_{dis})$ y $(\mathbb{R}, d_D)$ no son compactos. En clase (Ej. 5.3), con la distancia discreta: $\{x\} = B_d(x, \frac{1}{2})$ es abierto; “cada x se cubre solamente con su conjunto: si llego a sacar uno ya hay un x que no se cubre; ni uno puedo sacar”. “Los discretos no son conexos, no son compactos, no se portan bien.” Es el ej. 1 de la guía de compacidad.
- *Cofinita*: (X, τ_{cof}) es compacto, y de hecho todo subconjunto lo es. Dado un recubrimiento abierto de $A \neq \emptyset$, se toma un G_{α_0} no vacío que corte a A ; su complemento $X - G_{\alpha_0}$ es finito, y los finitos puntos de A que quedan afuera se cubren con un abierto cada uno. Es la pista para el ej. 2 de la guía de compacidad (cuáles son los compactos en un cofinito).
- *Conumerable* sobre $\mathbb{R}$: sólo los finitos son compactos (**MS**).

Teorema 11.11 (Los intervalos cerrados y acotados son compactos [GT Ej. 3.1.12, p. 46; clase 13, Teo. 6.1]). En $(\mathbb{R}, \tau_u)$, todo intervalo $[a, b]$ es compacto.

$$(a \leq b \Rightarrow [a, b] \text{ compacto en } (\mathbb{R}, \tau_u).)$$

Demostración, como se dictó. Sea $\{G_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ un recubrimiento de $[a, b]$ por abiertos de $\mathbb{R}$ (“podrían ser intervalitos, podrían no serlo”), y sea

$$S = \{x \in [a, b] : [a, x] \text{ se cubre con una cantidad finita de los } G_\alpha\}.$$

Paso 0: S tiene supremo. $a \in S$, porque $[a, a] = \{a\}$ y a está en algún G_{α_0} : un solo abierto alcanza. S es no vacío y acotado por b ; sea $x_0 = \sup S$, con $a \leq x_0 \leq b$. Se prueban dos cosas: $x_0 \in S$ y $x_0 = b$; con las dos, $b \in S$ y se terminó.

Paso 1: $x_0 \in S$. $x_0 \in [a, b]$ está en algún $G_{\alpha'}$, abierto, así que hay $\varepsilon > 0$ con $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subseteq G_{\alpha'}$ (ojo: ese intervalo *no* es del recubrimiento, es un abierto que lo tiene). Por ser x_0 el supremo hay $x_1 \in S$ con $x_0 - \varepsilon < x_1 \leq x_0$, y $[a, x_1] \subseteq G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n}$. Como $[a, x_0] \subseteq [a, x_1] \cup (x_0 - \varepsilon, x_0]$, es $[a, x_0] \subseteq G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n} \cup G_{\alpha'}$: “con uno más ya tengo un cubrimiento finito”.

Paso 2: $x_0 = b$. Si fuera $x_0 < b$, hay $\delta > 0$ con $[x_0, x_0 + \delta) \subseteq [a, b]$. Con $\varepsilon_0 = \min\{\delta, \varepsilon\}$, el tramo $[x_0, x_0 + \varepsilon_0]$ no se va de $G_{\alpha'}$ ni se pasa de b , y $[a, x_0 + \frac{\varepsilon_0}{2}] \subseteq [a, x_0] \cup [x_0, x_0 + \varepsilon_0] \subseteq G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n} \cup G_{\alpha'}$ (“hasta ε_0 la punta no sé si la cubro, pero hasta la mitad seguro”). Entonces $x_0 + \frac{\varepsilon_0}{2} \in S$ y es mayor que el supremo: absurdo.

Luego $b \in S$: $[a, b]$ se cubre con finitos G_α . □




Figura 32. $[a, b]$ es compacto (pizarra de la clase 13): un $x_1 \in S$ cerca del supremo ya está cubierto por finitos; agregando el $G_{\alpha'}$ de x_0 se cubre hasta x_0 , e incluso un poco más, lo que fuerza $x_0 = b$.

Observación 11.12. La demostración usa el axioma del supremo de $\mathbb{R}$ y nada más: es la “inducción continua” que avanza por $[a, b]$ mientras se pueda cubrir con finitos. “En los reales, si tiro un abierto, está lleno de cosas, me guste o no”; en un discreto, $(x_0 - \frac{1}{2}, x_0 + \frac{1}{2})$ no tiene a nadie más. Es el punto de partida de todo lo que sigue: después vienen el producto de compactos (cajas en $\mathbb{R}^n$) y que un cerrado dentro de un compacto es compacto; “anótense los números: después hay una propiedad que se demuestra por 3.1.12, 3.1.16 y 3.2.8 directamente”. En $\mathbb{Q}$ el mismo argumento falla (el supremo puede no existir), y de hecho $[0, 2] \cap \mathbb{Q}$ no es compacto en $\mathbb{Q}$ (Ej. 11.64).

Proposición 11.13 (En un métrico, compacto implica acotado [*GT 3.1.13, p. 46; clase 13, Prop. 7.1*]). Sea (X, d) un espacio métrico y $C \subseteq X$ compacto. Entonces C es acotado. Equivalentemente (contrarrecíproco): no acotado $\Rightarrow$ no compacto.

$$(C \text{ compacto en } (X, d) \Rightarrow \delta(C) < \infty; \quad C \text{ no acotado} \Rightarrow C \text{ no compacto.})$$

Demostración. Si $C = \emptyset$ no hay nada que probar. Si no, se fija $x_0 \in C$: las bolas $B(x_0, n)$, $n \geq 1$, cubren todo X , y en particular a C . Se extraen finitas; como están encajadas, $C \subseteq B(x_0, n_0)$ con n_0 el mayor radio. Por la desigualdad triangular, $d(x, x') \leq d(x, x_0) + d(x_0, x') < 2n_0$ para $x, x' \in C$. (En clase se ahorró la triangular: estar dentro de una bola ya es la definición equivalente de acotado.) $\square$

Observación 11.14 (Uso inmediato [*clase 13, §7*]). Es la misma prueba que “ $\mathbb{R}^n$ no es compacto”, con centro en un punto cualquiera x_0 . Da al toque que $[0, +\infty)$ y $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$ no son compactos. Pero acotado no alcanza: (a, b) es acotado y no es compacto (Ej. 11.9); “para ser compacto voy a necesitar que sea cerrado, además de acotado”, y eso vale en algunos espacios, no en todos (§11.3). En un espacio topológico general “acotado” ni siquiera está definido.

11.2 Compacidad y cerrados

Definición 11.15 (Propiedad de intersección finita [*GT 3.2.1, p. 47; MS Def. 6.3, p. 80*]). Una familia de conjuntos $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ tiene la *propiedad de intersección finita* (PIF) si toda subfamilia finita tiene intersección no vacía.

$$(\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \text{ tiene la PIF} \iff \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \Lambda : A_{\alpha_1} \cap \dots \cap A_{\alpha_n} \neq \emptyset.)$$

Teorema 11.16 (Compacidad por cerrados [*GT 3.2.2, p. 47; MS Teo. 6.2, p. 81*]). (X, τ) es compacto si y sólo si toda familia de cerrados de X con la PIF tiene intersección no vacía.

$$(X \text{ compacto} \iff \forall \{F_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \text{ cerrados} : (\{F_\alpha\} \text{ tiene la PIF} \Rightarrow \bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha \neq \emptyset).)$$

Demostración. Es la definición pasada a complementos: $\{G_\alpha\}$ es un recubrimiento abierto de X sii $\{X - G_\alpha\}$ es una familia de cerrados con intersección vacía, y $G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n} = X$ sii $(X - G_{\alpha_1}) \cap \dots \cap (X - G_{\alpha_n}) = \emptyset$ (De Morgan). ($\Rightarrow$) Si $\{F_\alpha\}$ tiene la PIF y $\bigcap F_\alpha = \emptyset$, los $X - F_\alpha$ recubren X ; por compacidad finitos lo hacen, y entonces finitos F_α tienen intersección vacía: contradice la PIF. ($\Leftarrow$) Si $\{G_\alpha\}$ recubre X , la familia $\{X - G_\alpha\}$ tiene intersección vacía, luego *no* tiene la PIF: hay finitos con $\bigcap_i (X - G_{\alpha_i}) = \emptyset$, es decir $X = \bigcup_i G_{\alpha_i}$. $\square$

Proposición 11.17 (Cerrado en compacto es compacto [*GT 3.2.3, p. 47; MS Prop. 6.3, p. 81*]). Sea (X, τ) compacto y $F \subseteq X$ cerrado. Entonces F es compacto. Más en general, si $K \subseteq X$ es compacto (con X cualquiera) y F es cerrado en X , entonces $F \cap K$ es compacto.

$$(X \text{ compacto} \wedge F \text{ cerrado} \Rightarrow F \text{ compacto}; \quad K \text{ compacto} \wedge F \text{ cerrado} \Rightarrow F \cap K \text{ compacto.})$$

Demostración. Sea $\{G_\alpha\}$ un recubrimiento de F por abiertos de X . Se le agrega el abierto $X - F$: la familia $\{G_\alpha\} \cup \{X - F\}$ recubre todo X , que es compacto, así que $X = (X - F) \cup G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n}$. Como $X - F$ no tiene puntos de F , queda $F \subseteq G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n}$. Para la versión general: $F \cap K$ es cerrado en el subespacio K , que es un espacio compacto (Lema 11.5); por lo anterior es compacto en K , y otra vez por el lema, en X . $\square$

Corolario 11.18 ([GT 3.2.4, p. 47]). En $(\mathbb{R}, \tau_u)$, todo conjunto cerrado y acotado es compacto.

$$(A \subseteq \mathbb{R} \text{ cerrado} \wedge A \text{ acotado} \Rightarrow A \text{ compacto.})$$

Demostración. Acotado quiere decir $A \subseteq [a, b]$ para algún intervalo; $A = A \cap [a, b]$ es compacto por el Teo. 11.11 y la Prop. 11.17. $\square$

Contraejemplo 11.19 (La compacidad no es hereditaria [MS Contraej. 6.1, p. 81]). $[0, 1]$ es compacto y $(0, 1) \subseteq [0, 1]$ no (Ej. 11.9): un subconjunto de un compacto no tiene por qué serlo. Lo que se hereda es a los *cerrados* (MS: “débilmente hereditaria”).

11.3 Compacidad y Hausdorff

Proposición 11.20 (Separación de un punto y un compacto [GT 3.3.1 y Nota 3.3.2, p. 48; MS Lema 6.8, p. 82]). Sea (X, τ) Hausdorff (§5), $F \subseteq X$ compacto y $x \notin F$. Entonces existen abiertos disjuntos U, V con $x \in U$ y $F \subseteq V$. Vale en todo espacio métrico.

$$(X \text{ es } T_2 \wedge F \text{ compacto} \wedge x \notin F \Rightarrow \exists U, V \in \tau : x \in U \wedge F \subseteq V \wedge U \cap V = \emptyset.)$$

Demostración. Para cada $y \in F$ es $y \neq x$, y por T_2 hay abiertos disjuntos $U_y \ni x$, $V_y \ni y$. Los $\{V_y\}_{y \in F}$ recubren F ; por compacidad, $F \subseteq V_{y_1} \cup \dots \cup V_{y_n} =: V$. Sea $U := U_{y_1} \cap \dots \cap U_{y_n}$, abierto por ser intersección *finita* y con $x \in U$. Y $U \cap V = \bigcup_i (U \cap V_{y_i}) \subseteq \bigcup_i (U_{y_i} \cap V_{y_i}) = \emptyset$. $\square$




Figura 33. Separar un punto de un compacto: se separa x de cada $y \in F$, la compacidad deja finitos V_{y_i} (punteados) y del lado de x se intersecan los finitos U_{y_i} . Sin compacidad habría que intersecar infinitos abiertos, y eso puede no ser abierto.

Corolario 11.21 (En un Hausdorff, compacto implica cerrado [GT 3.3.3, p. 48; MS Prop. 6.9, p. 82]). En un espacio Hausdorff (en particular, en un métrico), todo compacto es cerrado.

$$(X \text{ es } T_2 \wedge F \text{ compacto} \Rightarrow F \text{ cerrado.})$$

Demostración. Se ve que $X - F$ es abierto. Si $x \in X - F$, la Prop. 11.20 da $U \ni x$ abierto y $V \supseteq F$ con $U \cap V = \emptyset$; entonces $U \cap F = \emptyset$, o sea $x \in U \subseteq X - F$. Así todo punto de $X - F$ es interior. $\square$

Contraejemplo 11.22 (Sin Hausdorff, falla [MS Contraej. 6.2, p. 82; Ejemplos 6.1(1),(5), p. 80]). En la indiscreta sobre un X con dos puntos o más, y en la cofinita sobre un X infinito, *todo* subconjunto es compacto (Ej. 11.10), pero no todo subconjunto es cerrado: en la cofinita, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ es compacto y no es cerrado. Ninguna de las dos es T_2 .

Corolario 11.23 (Compactos de un compacto Hausdorff [*MS Cor. 6.10, p. 82*]). Si (X, τ) es compacto y Hausdorff, un subconjunto es compacto si y sólo si es cerrado.

$$(X \text{ compacto} \wedge X \text{ es } T_2 \Rightarrow (A \text{ compacto} \iff A \text{ cerrado}).)$$

Una flecha es la Prop. 11.17 y la otra el Cor. 11.21.

Proposición 11.24 (Separación de dos compactos [*GT 3.3.4 y Nota 3.3.5, pp. 48–49; MS Prop. 6.11, pp. 82–83*]). En un espacio Hausdorff, dos compactos disjuntos F_1, F_2 se separan con abiertos disjuntos: existen $U \supseteq F_1$ y $V \supseteq F_2$ abiertos con $U \cap V = \emptyset$.

$$\begin{aligned} & (X \text{ es } T_2 \wedge F_1, F_2 \text{ compactos} \wedge F_1 \cap F_2 = \emptyset \\ & \Rightarrow \exists U, V \in \tau : F_1 \subseteq U \wedge F_2 \subseteq V \wedge U \cap V = \emptyset.) \end{aligned}$$

Demostración. Se repite la Prop. 11.20 con F_1 en el lugar de x . Para cada $x \in F_1$ hay abiertos disjuntos $U_x \ni x$ y $V_x \supseteq F_2$. Los U_x recubren F_1 : $F_1 \subseteq U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_n} =: U$. Sea $V := V_{x_1} \cap \dots \cap V_{x_n} \supseteq F_2$, abierto. Y $U \cap V \subseteq \bigcup_i (U_{x_i} \cap V_{x_i}) = \emptyset$. $\square$

Observación 11.25 (Erratas de GT p. 48–49). En la demostración de 3.3.4 GT escribe $V = \bigcup_{i=1}^n V_{x_i}$ (“abierto por ser intersección finita”): debe ser $V = \bigcap_i V_{x_i}$, como arriba; y la conclusión “ $U \cup V = \emptyset$ ” es $U \cap V = \emptyset$. En 3.3.1 el último término $(U_{y_n} \cup V_{y_n})$ es $(U_{y_n} \cap V_{y_n})$. La moraleja es la de la figura anterior: *del lado que se cubre se une, del lado de enfrente se interseca*. En un espacio no T_2 puede fallar incluso para dos puntos: en $(\mathbb{R}, \tau_{ind})$, $\{1\}$ y $\{2\}$ son compactos disjuntos no separables (MS Contraej. 6.3, p. 83).

Teorema 11.26 (Heine–Borel en la recta [*GT 3.3.6, p. 49; MS Ejemplos 6.1(8), p. 80*]). En $(\mathbb{R}, \tau_u)$, un subconjunto A es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

$$(A \subseteq (\mathbb{R}, \tau_u) : A \text{ compacto} \iff A \text{ cerrado} \wedge A \text{ acotado}).$$

Demostración. $(\Leftarrow)$ Cor. 11.18. $(\Rightarrow)$ Cerrado por el Cor. 11.21 ($\mathbb{R}$ es métrico) y acotado por la Prop. 11.13. $\square$

11.4 Compacidad y continuidad

Proposición 11.27 (La imagen continua de un compacto es compacta [*GT 3.4.1, p. 49; MS Prop. 6.4 y Cor. 6.5, p. 81*]). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ continua y $A \subseteq X$ compacto. Entonces $f(A)$ es compacto. En particular, si X es compacto y f es sobreyectiva, Y es compacto, y la compacidad es una propiedad topológica.

$$\begin{aligned} & (f \text{ continua} \wedge A \text{ compacto} \Rightarrow f(A) \text{ compacto}; \\ & X \cong Y \Rightarrow (X \text{ compacto} \iff Y \text{ compacto}).) \end{aligned}$$

Demostración. Sea $f(A) \subseteq \bigcup_\alpha G_\alpha$ con $G_\alpha \in \tau'$. Entonces $A \subseteq f^{-1}(f(A)) \subseteq \bigcup_\alpha f^{-1}(G_\alpha)$, y cada $f^{-1}(G_\alpha)$ es abierto por continuidad. Por compacidad $A \subseteq f^{-1}(G_{\alpha_1}) \cup \dots \cup f^{-1}(G_{\alpha_n}) = f^{-1}(G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n})$, y aplicando f (que cumple $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$): $f(A) \subseteq G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n}$. $\square$

Corolario 11.28 (Menos abiertos, más compacto [MS Obs. 6.1(3), p. 80]). Si A es compacto en (X, τ_1) y $\tau_2 \subseteq \tau_1$, entonces A es compacto en (X, τ_2) : es la imagen de A por $1_X : (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$, continua por la Prop. 7.13. (Con menos abiertos hay menos recubrimientos que achicar.)

$$(A \text{ compacto en } (X, \tau_1) \wedge \tau_2 \subseteq \tau_1 \Rightarrow A \text{ compacto en } (X, \tau_2).)$$

Teorema 11.29 (Weierstrass [GT 3.4.2, p. 49]). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u)$ continua y $A \subseteq X$ compacto y no vacío. Entonces f alcanza en A su máximo y su mínimo.

$$(f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} \wedge A \neq \emptyset \text{ compacto} \Rightarrow \exists a_1, a_2 \in A \forall a \in A : f(a_1) \leq f(a) \leq f(a_2).)$$

Demostración. $f(A)$ es compacto en $\mathbb{R}$ (Prop. 11.27), luego cerrado y acotado (Teo. 11.26). Como es no vacío y acotado, tiene supremo s ; el supremo es adherente ($(s - \varepsilon, s]$ corta a $f(A)$ para todo $\varepsilon > 0$, GT Ej. 2.3.7), y como $f(A)$ es cerrado, $s \in \overline{f(A)} = f(A)$: $s = f(a_2)$. Igual con el ínfimo. $\square$

Observación 11.30 (Errata de GT 3.4.2). GT no pide $A \neq \emptyset$, y hace falta: el vacío es compacto y $f(\emptyset) = \emptyset$ no tiene máximo. Además, lo que se alcanza son el máximo y el mínimo de f sobre A (“la imagen alcanza su máximo” en el texto).

Proposición 11.31 (De compacto a Hausdorff, toda continua es cerrada [GT 3.4.3 y Nota 3.4.4, pp. 49–50; MS Prop. 6.12, p. 83]). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ continua, con X compacto e Y Hausdorff. Entonces f es cerrada: lleva cerrados de X en cerrados de Y .

$$(f \text{ continua} \wedge X \text{ compacto} \wedge Y \text{ es } T_2 \Rightarrow \forall F \text{ cerrado de } X : f(F) \text{ cerrado de } Y.)$$

Demostración. Es la cadena de las tres proposiciones anteriores: F cerrado en el compacto $X \Rightarrow F$ compacto (Prop. 11.17) $\Rightarrow f(F)$ compacto (Prop. 11.27) $\Rightarrow f(F)$ cerrado en el Hausdorff Y (Cor. 11.21). $\square$

Corolario 11.32 (Biyectiva y continua de compacto a Hausdorff es homeomorfismo [GT 3.4.5, p. 50; MS Cor. 6.13, p. 83]). Si $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ es continua y biyectiva, X es compacto e Y es Hausdorff, entonces f es un homeomorfismo.

$$(f \text{ continua} \wedge f \text{ biyectiva} \wedge X \text{ compacto} \wedge Y \text{ es } T_2 \Rightarrow f \text{ homeomorfismo.})$$

Demostración. f es cerrada (Prop. 11.31); una biyección continua y cerrada es homeomorfismo (caracterizaciones de §7.5). Directamente: para F cerrado de X , $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$ es cerrado, así que f^{-1} es continua. $\square$

Observación 11.33. GT pide que X e Y sean los dos compactos y Hausdorff; como dice su Nota 3.4.4, sólo se usa que X sea compacto e Y Hausdorff. Las dos hipótesis son necesarias:

- sin compacidad del dominio: $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ de $[0, 2\pi)$ en S^1 es biyectiva y continua y no es homeomorfismo (§7.5; MS Contraej. 6.4, p. 83). $[0, 2\pi)$ no es compacto: justamente, el “agujero” en 2π es lo que rompe la continuidad de la inversa;
- sin Hausdorff en el codominio: $1_X : (X, \tau_{dis}) \rightarrow (X, \tau_{ind})$ con X finito de dos puntos o más es biyectiva y continua, el dominio es compacto (finito) y no es homeomorfismo.

Ejemplo 11.34 (La circunferencia es compacta [GT Ej. 3.4.6, p. 50]). $S^1 = f([0, 2\pi])$ con $f(t) = (\cos t, \sin t)$, continua porque sus coordenadas lo son (Prop. 7.15), y $[0, 2\pi]$ es compacto (Teo. 11.11). Luego S^1 es compacto en $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 11.35 (Intersección de compactos [GT Ej. 3.4.7, p. 50; MS Obs. 6.1(4), p. 80, y §6.5, Problema 4(ii), p. 84]). En un espacio Hausdorff (en particular, métrico), la intersección de una familia no vacía de compactos $\{A_\alpha\}$ es compacta: cada A_α es cerrado (Cor. 11.21), así que $\bigcap_\alpha A_\alpha$ es cerrado y está contenido en un A_{α_0} compacto (Prop. 11.17).

$$(X \text{ es } T_2 \wedge \forall \alpha A_\alpha \text{ compacto} \wedge \Lambda \neq \emptyset \Rightarrow \bigcap_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha \text{ compacto.})$$

Sin Hausdorff puede fallar. Sea $X = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ (con $a, b \notin \mathbb{N}$ distintos) y $\tau = \mathcal{P}(\mathbb{N}) \cup \{G \subseteq X : G \cap \{a, b\} \neq \emptyset \wedge \mathbb{N} - G \text{ finito}\}$ (se verifica que es topología). $K_1 = \mathbb{N} \cup \{a\}$ y $K_2 = \mathbb{N} \cup \{b\}$ son compactos: el abierto del recubrimiento que contiene a a (resp. b) deja afuera finitos naturales. Pero $K_1 \cap K_2 = \mathbb{N}$ es un subespacio discreto infinito, no compacto. Y K_1 es compacto y no es cerrado ($\{b\}$ no es abierto).

Ejemplo 11.36 (Encajados de Cantor [GT Ej. 3.4.8, pp. 50–51]). Sea $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \dots$ una sucesión de cerrados no vacíos con F_1 compacto. Entonces $\bigcap_n F_n \neq \emptyset$. En efecto, la familia tiene la PIF (una intersección finita $F_{n_1} \cap \dots \cap F_{n_k}$ es el de índice mayor, no vacío), y los $F_n = F_n \cap F_1$ son cerrados del espacio compacto F_1 (Teo. 11.16). Es lo que pasa con el conjunto de Cantor (GT Ej. 2.6.6(c)). GT pide además que X sea Hausdorff, pero no se usa. Con F_1 no compacto falla: $F_n = [n, \infty)$ en $\mathbb{R}$.

$$(F_1 \supseteq F_2 \supseteq \dots \text{ cerrados} \wedge F_n \neq \emptyset \wedge F_1 \text{ compacto} \Rightarrow \bigcap_{n \geq 1} F_n \neq \emptyset.)$$

11.5 Compacidad en productos: lema del tubo y Tychonoff finito

GT §3.5 prueba que el producto de compactos es compacto sólo para métricos con $\delta_n^{\max}$ (3.5.1) y en la Nota 3.5.5 dice que la demostración “similar” vale para la topología producto. Acá se hace directamente con la topología producto de §9, con el argumento de los tubos (Prop. 9.9); la versión métrica sale de que las métricas producto inducen la topología producto (Obs. 9.7).

Lema 11.37 (Lema del tubo [versión topológica de GT 3.5.1 y Nota 3.5.5, pp. 51–53; MS Teo. 6.6, p. 81]). Sean X e Y espacios topológicos con Y compacto, $x_0 \in X$, y W un abierto de $X \times Y$ que contiene a toda la fibra $\{x_0\} \times Y$. Entonces existe un abierto $U \ni x_0$ de X tal que el tubo entero $U \times Y$ queda dentro de W .

$$(Y \text{ compacto} \wedge W \in \tau_{X \times Y} \wedge \{x_0\} \times Y \subseteq W \Rightarrow \exists U \in \tau_X : x_0 \in U \wedge U \times Y \subseteq W.)$$

Demostración. Para cada $y \in Y$, $(x_0, y) \in W$ y W es abierto del producto, así que hay un rectángulo básico con $(x_0, y) \in U_y \times V_y \subseteq W$ ($U_y \in \tau_X$, $V_y \in \tau_Y$). Los $\{V_y\}_{y \in Y}$ recubren Y ; como Y es compacto, $Y = V_{y_1} \cup \dots \cup V_{y_n}$. Sea $U := U_{y_1} \cap \dots \cap U_{y_n}$: es abierto (intersección finita) y contiene a x_0 . Si $(x, y) \in U \times Y$, hay i con $y \in V_{y_i}$, y $x \in U \subseteq U_{y_i}$, así que $(x, y) \in U_{y_i} \times V_{y_i} \subseteq W$. (Si $Y = \emptyset$, sirve $U = X$.) $\square$

Observación 11.38 (Sin compacidad no hay tubo). En $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ el abierto $W = \{(x, y) : |xy| < 1\}$ contiene a la fibra $\{0\} \times \mathbb{R}$, pero ningún tubo $(-\varepsilon, \varepsilon) \times \mathbb{R}$: el punto $(\frac{\varepsilon}{2}, \frac{4}{\varepsilon})$ está en el tubo y no en W . El borde de W son las hipérbolas $xy = \pm 1$, que se pegan al eje vertical sin tocarlo: es el mismo fenómeno que hace que la proyección de la hipérbola no sea cerrada (§9). La fibra $\mathbb{R}$ no es compacta, y la intersección de los infinitos U_y se achica a $\{0\}$.




Figura 34. El lema del tubo. La fibra compacta $\{x_0\} \times Y$ (negro) se cubre con finitos rectángulos $U_{y_i} \times V_{y_i} \subseteq W$ (rojo); la intersección de sus bases, U , da un tubo $U \times Y$ (violeta) todavía dentro de W . Es el tubo de la Figura 12, ahora “engordando” una fibra.

Teorema 11.39 (Tychonoff, caso finito [MS Teo. 6.6, p. 81; GT 3.5.1 y Nota 3.5.5, pp. 51–53]). Sean X e Y espacios topológicos. Si X e Y son compactos, $X \times Y$ (con la topología producto) es compacto. Recíprocamente, si $X \times Y \neq \emptyset$ es compacto, X e Y lo son. Por inducción, lo mismo vale para $X_1 \times \cdots \times X_n$.

$$(X, Y \text{ compactos} \Rightarrow X \times Y \text{ compacto}; \quad X \times Y \neq \emptyset \text{ compacto} \Rightarrow X, Y \text{ compactos.})$$

Demostración. Sea $\{W_\alpha\}$ un recubrimiento abierto de $X \times Y$. Se fija $x \in X$. La fibra $\{x\} \times Y$ es compacta: es la imagen de Y por $y \mapsto (x, y)$, continua (Cor. 9.13), y se aplica la Prop. 11.27. Entonces la cubren finitos W_α ; su unión W_x es un abierto que contiene a $\{x\} \times Y$. Por el lema del tubo hay $U_x \ni x$ abierto con $U_x \times Y \subseteq W_x$.

Los $\{U_x\}_{x \in X}$ recubren X , compacto: $X = U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_m}$. Luego

$$X \times Y = \bigcup_{j=1}^m U_{x_j} \times Y \subseteq \bigcup_{j=1}^m W_{x_j},$$

y cada W_{x_j} es unión de finitos W_α : en total, finitos W_α cubren $X \times Y$. Recíproca: π_X es continua y, si $X \times Y \neq \emptyset$, sobreyectiva; así $X = \pi_X(X \times Y)$ es compacto (Prop. 11.27). Igual Y . $\square$

Intuición. Es un “doble paso a finitos”: primero en la dirección de Y (cada fibra vertical se cubre con finitos, y el lema del tubo engorda esa fibra a un tubo), después en la dirección de X (finitos tubos cubren todo). La compacidad de Y es la que permite intersecar los U_{y_i} sin perder la apertura.

Observación 11.40 (Subconjuntos compactos de un producto). Si $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$ son compactos, $A \times B$ es compacto en $X \times Y$ (que es el enunciado de GT 3.5.1). Por el Lema 11.5 alcanza con ver que la topología de subespacio de $A \times B$ en $X \times Y$ es la topología producto de $(A, \tau_A) \times (B, \tau_B)$; y eso es porque las dos tienen la misma base: $(U \times V) \cap (A \times B) = (U \cap A) \times (V \cap B)$.

Proposición 11.41 (Proyección a lo largo de un factor compacto [MS §6.5, Problema 7, p. 84]). Si X es compacto, la proyección $\pi_Y : X \times Y \rightarrow Y$ es cerrada. (Compárese con la hipérbola de §9: allí el factor que se “aplasta” es $\mathbb{R}$, no compacto.)

$$(X \text{ compacto} \Rightarrow \forall F \text{ cerrado de } X \times Y : \pi_Y(F) \text{ cerrado de } Y.)$$

Demostración. Sea F cerrado y $y_0 \notin \pi_Y(F)$. Entonces la fibra $X \times \{y_0\}$ no corta a F : está en el abierto $W = (X \times Y) - F$. Por el lema del tubo (con los papeles de los factores cambiados) hay $V \ni y_0$ abierto con $X \times V \subseteq W$, es decir, $X \times V$ no corta a F , o sea $V \cap \pi_Y(F) = \emptyset$. Así $Y - \pi_Y(F)$ es abierto. $\square$

Corolario 11.42 (Cajas compactas [GT 3.5.2, p. 52]). En $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$, todo producto de intervalos $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ es compacto.

$$([a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \text{ compacto en } (\mathbb{R}^n, \tau_u).)$$

Demostración. Cada $[a_i, b_i]$ es compacto (Teo. 11.11), el producto es compacto (Teo. 11.39) y la topología producto de n copias de $\mathbb{R}$ es la usual de $\mathbb{R}^n$ (Obs. 9.7); con d_e , $d_{\max}$ o d_{taxi} da lo mismo (Prop. 2.5). $\square$

Teorema 11.43 (Heine–Borel en $\mathbb{R}^n$ [GT 3.5.3, pp. 52–53; MS §6.5, Problema 2, p. 83]). En $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$, un subconjunto A es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

$$(A \subseteq (\mathbb{R}^n, \tau_u) : A \text{ compacto} \iff A \text{ cerrado} \wedge A \text{ acotado}).$$

Demostración. $(\Rightarrow)$ $\mathbb{R}^n$ es métrico, luego Hausdorff: A es cerrado (Cor. 11.21) y acotado (Prop. 11.13). $(\Leftarrow)$ Si A es acotado está en una bola euclídea $B(0, r)$, y por lo tanto en una caja $J = [-r, r]^n$ (la bola de $d_{\max}$ de radio r contiene a la de d_e). J es compacto (Cor. 11.42) y $A = A \cap J$ es compacto por ser cerrado dentro de un compacto (Prop. 11.17). $\square$

Observación 11.44 (Errata y alcance [GT 3.5.3 y Nota 3.5.4, pp. 52–53]). El enunciado de **GT** dice “ $A \subseteq \mathbb{R}$ ”: es $A \subseteq \mathbb{R}^n$. La implicación $(\Rightarrow)$ vale en todo métrico (Nota 3.5.4); $(\Leftarrow)$ es propia de $\mathbb{R}^n$ y falla en general:

- en $(\mathbb{N}, d_D)$ el espacio entero es cerrado y acotado ($\delta = 1$), y no es compacto (discreto infinito, Ej. 11.10);
- en $(\mathbb{Q}, d_e)$, $[0, 2] \cap \mathbb{Q}$ es cerrado (en $\mathbb{Q}$) y acotado, y no es compacto (Ej. 11.64);
- en el espacio de funciones continuas, la bola cerrada unidad (Ej. 11.55).

11.6 Compacidad en espacios métricos

Definición 11.45 (Subsucesión, compacidad secuencial [GT 3.6.2–3.6.3, p. 54; MS Defs. 6.4–6.5, p. 82]). Una *subsucesión* de $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es una sucesión $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1}$ con $n_1 < n_2 < \cdots$ índices estrictamente crecientes. (X, τ) es *secuencialmente compacto* si toda sucesión en X tiene una subsucesión convergente (en X). **GT** llama a esto *propiedad de Bolzano–Weierstrass*; en **MS** ese nombre se reserva para “todo subconjunto infinito tiene un punto de acumulación”. En métricos las tres cosas son equivalentes a la compacidad (**MS** Prop. 6.7); en topológicos generales no hay relación entre compacidad y compacidad secuencial.

$$(X \text{ secuencialmente compacto} \iff \forall \{x_n\}_{n \geq 1} \subseteq X \exists n_1 < n_2 < \cdots \exists x_0 \in X : x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x_0.)$$

Proposición 11.46 (Compacto métrico $\Rightarrow$ secuencialmente compacto [GT 3.6.1–3.6.2, pp. 53–54]). Sea (X, d) métrico compacto. Entonces toda sucesión en X tiene una subsucesión convergente.

$$((X, d) \text{ compacto} \Rightarrow \forall \{x_n\} \subseteq X \exists \{x_{n_k}\}_{k \geq 1} \exists x_0 \in X : x_{n_k} \rightarrow x_0.)$$

Demostración. (Reorganización de la de **GT**.) Primero: si para cierto x_0 toda bola $B(x_0, r)$ contiene x_n para infinitos índices n , entonces una subsucesión converge a x_0 : se elige n_1 con $x_{n_1} \in B(x_0, 1)$, $n_2 > n_1$ con $x_{n_2} \in B(x_0, 1/2)$, $\dots$, $n_k > n_{k-1}$ con $x_{n_k} \in B(x_0, 1/k)$ (siempre se puede, porque hay infinitos índices disponibles), y $d(x_{n_k}, x_0) < 1/k \rightarrow 0$. Ahora, por el absurdo: si ninguna subsucesión converge, cada $x \in X$ tiene una bola $B(x, r_x)$ que contiene x_n sólo para *finitos* índices n . Esas bolas recubren X ; por compacidad, finitas lo hacen. Entonces todos los índices $n \in \mathbb{N}$ están entre los finitos índices asociados a finitas bolas: absurdo, porque $\mathbb{N}$ es infinito. $\square$

Definición 11.47 (Totalmente acotado [*nombre de curso; es la propiedad de GT 3.6.4, p. 54*]). (X, d) es *totalmente acotado* si para cada $\varepsilon > 0$ se puede cubrir con una cantidad finita de bolas de radio ε . (**GT** enuncia la propiedad sin darle nombre.) Totalmente acotado implica acotado; la recíproca es falsa: $(\mathbb{N}, d_D)$ es acotado y no se cubre con finitas bolas de radio $\frac{1}{2}$ (que son unitarios).

$$((X, d) \text{ totalmente acotado} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists x_1, \dots, x_n \in X : X = B(x_1, \varepsilon) \cup \dots \cup B(x_n, \varepsilon).)$$

Proposición 11.48 (Secuencialmente compacto $\Rightarrow$ totalmente acotado [*GT 3.6.4, pp. 54–55*]). Si (X, d) es métrico y secuencialmente compacto, entonces es totalmente acotado.

$$((X, d) \text{ sec. compacto} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists x_1, \dots, x_n : X = \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon).)$$

Demostración. Si para cierto ε_0 ninguna cantidad finita de bolas de radio ε_0 cubre X , se construye por recurrencia una sucesión ε_0 -separada: x_1 cualquiera, y $x_{n+1} \notin B(x_1, \varepsilon_0) \cup \dots \cup B(x_n, \varepsilon_0)$ (existe, porque esas n bolas no cubren). Así $d(x_n, x_m) \geq \varepsilon_0$ si $n \neq m$. Ninguna subsucesión converge: si $x_{n_k} \rightarrow x_0$, para k, s grandes $d(x_{n_k}, x_{n_s}) \leq d(x_{n_k}, x_0) + d(x_0, x_{n_s}) < \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2}$. Absurdo. $\square$

Lema 11.49 (Lema de Lebesgue [*GT 3.6.5 y Nota 3.6.6, pp. 55–56*]). Sea (X, d) métrico secuencialmente compacto y $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ un recubrimiento de X por abiertos. Entonces existe $\varepsilon > 0$ (un número de Lebesgue del recubrimiento) tal que toda bola de radio ε está contenida en algún U_α . En consecuencia, todo $A \subseteq X$ no vacío con $\delta(A) < \varepsilon$ está contenido en algún U_α .

$$(\exists \varepsilon > 0 \forall x \in X \exists \alpha \in \Lambda : B(x, \varepsilon) \subseteq U_\alpha; \quad \emptyset \neq A \subseteq X \wedge \delta(A) < \varepsilon \Rightarrow \exists \alpha : A \subseteq U_\alpha.)$$

Demostración. Por el absurdo: si ningún ε sirve, para $\varepsilon = \frac{1}{n}$ hay x_n con $B(x_n, \frac{1}{n})$ no contenida en ningún U_α . Una subsucesión converge, $x_{n_k} \rightarrow x_0$, y x_0 está en algún U_{α_0} abierto: $B(x_0, \delta) \subseteq U_{\alpha_0}$. Se toma k con $d(x_{n_k}, x_0) < \frac{\delta}{2}$ y $\frac{1}{n_k} < \frac{\delta}{2}$. Si $y \in B(x_{n_k}, \frac{1}{n_k})$, $d(y, x_0) < \frac{1}{n_k} + \frac{\delta}{2} < \delta$; o sea $B(x_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subseteq B(x_0, \delta) \subseteq U_{\alpha_0}$, contra la elección de x_{n_k} . Para la consecuencia: si $a \in A$ y $\delta(A) < \varepsilon$, entonces $A \subseteq B(a, \varepsilon)$, que está en algún U_α . $\square$

Intuición. El número de Lebesgue dice que un recubrimiento abierto de un compacto métrico tiene un “grosor mínimo”: todo conjunto suficientemente chico cae *entero* en uno de los abiertos. En $(0, 1)$ con el recubrimiento $\{(\frac{1}{k}, 1)\}$ no hay grosor mínimo: cerca de 0 los abiertos que cubren son cada vez más finos en ese extremo. Es el mismo fenómeno que el lema del tubo, en versión métrica.

Observación 11.50 (Errata de **GT** 3.6.5). El enunciado dice “cualquier recubrimiento”: tiene que ser *por abiertos* (con $\{\{x\}\}_{x \in X}$ falla). En la demostración aparece G_α en lugar de U_α . En 3.6.4, “ $x_2 \notin B_d(x, \varepsilon_0)$ ” es $x_2 \notin B_d(x_1, \varepsilon_0)$.

Teorema 11.51 (Bolzano–Weierstrass: en métricos, compacto $\iff$ secuencialmente compacto [GT 3.6.3, p. 54, demostración en p. 56; MS Prop. 6.7, p. 82]). *Un espacio métrico (X, d) es compacto si y sólo si toda sucesión en X tiene una subsucesión convergente.*

$$((X, d) \text{ compacto} \iff \forall \{x_n\} \subseteq X \exists \{x_{n_k}\} \exists x_0 \in X : x_{n_k} \rightarrow x_0.)$$

Demostración. $(\Rightarrow)$ Prop. 11.46. $(\Leftarrow)$ Sea $\{U_\alpha\}$ un recubrimiento abierto y ε un número de Lebesgue (Lema 11.49). Por la Prop. 11.48, $X = B(x_1, \varepsilon) \cup \dots \cup B(x_n, \varepsilon)$, y cada $B(x_i, \varepsilon)$ está en algún U_{α_i} . Luego $X = U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_n}$. $\square$

Observación 11.52. Para un subconjunto A de un métrico: A es compacto sii toda sucesión de puntos de A tiene una subsucesión que converge a un punto de A (se aplica el teorema al subespacio $(A, d|_A)$, Lema 11.5 y Prop. 8.5(v)). Es la forma más cómoda de probar que algo *no* es compacto en un métrico: exhibir una sucesión sin subsucesiones convergentes en A .

Teorema 11.53 (Heine: continua en compacto es uniformemente continua [GT 3.6.7–3.6.8, pp. 56–57]). *Sea $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ continua, con (X, d) compacto. Entonces f es uniformemente continua (definición en §7.4, que es la GT 3.6.7).*

$$\begin{aligned} & ((X, d) \text{ compacto} \wedge f \text{ continua} \\ & \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \mu > 0 \\ & \forall x, x' \in X : d(x, x') < \mu \Rightarrow \rho(f(x), f(x')) < \varepsilon.) \end{aligned}$$

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, los conjuntos $f^{-1}(B_\rho(y, \frac{\varepsilon}{2}))$, $y \in Y$, son abiertos (continuidad) y recubren X . Sea μ un número de Lebesgue de ese recubrimiento (Lema 11.49, aplicable por el Teo. 11.51). Si $d(x, x') < \mu$, entonces $\{x, x'\} \subseteq B(x, \mu) \subseteq f^{-1}(B_\rho(y_0, \frac{\varepsilon}{2}))$ para algún y_0 , así que $\rho(f(x), f(x')) \leq \rho(f(x), y_0) + \rho(y_0, f(x')) < \varepsilon$. $\square$

Observación 11.54. La compacidad es necesaria: $x \mapsto x^2$ en $\mathbb{R}$ y $x \mapsto \frac{1}{x}$ en $(0, 1)$ son continuas y no uniformemente continuas (§7.4). Nota: la continuidad uniforme sí figura en GT, como Def. 3.6.7.

Ejemplo 11.55 (Cerrado y acotado que no es compacto [GT Ej. 3.6.9, p. 57]). Sea $X = \{f : [0, 1] \rightarrow [0, 1] \text{ continua}\}$ con $d_\infty(f, g) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$, θ la función nula y $0 < \varepsilon \leq 1$. La bola cerrada $A = B[\theta, \varepsilon]$ es cerrada y acotada, pero no es compacta. Las “rampas” $f_n(x) = \varepsilon \max\{0, 1 - (n+1)x\}$ están en A (valen ε en 0 y 0 desde $\frac{1}{n+1}$), y $d_\infty(f_n, \theta) = \varepsilon$. Si una subsucesión f_{n_k} convergiera a $f_0 \in A$, convergería punto a punto; para cada $x > 0$ es $f_{n_k}(x) = 0$ a partir de cierto k , así que $f_0(x) = 0$, y por continuidad $f_0(0) = 0$: $f_0 = \theta$. Pero $d_\infty(f_{n_k}, \theta) = \varepsilon \not\rightarrow 0$. Por el Teo. 11.51, A no es compacto.

Observación 11.56 (Errata menor de GT 3.6.9). GT toma “ ε arbitrario”; como las funciones van a $[0, 1]$, las rampas de altura ε exigen $\varepsilon \leq 1$ (para $\varepsilon > 1$ la bola es todo X y sirven las mismas rampas de altura 1).

11.7 Compacidad y completitud

Definición 11.57 (Sucesión de Cauchy, espacio completo [GT 3.7.1 y 3.7.4, p. 58]). En (X, d) , una sucesión $\{x_n\}$ es *de Cauchy* si sus términos se acercan entre sí: para cada $\varepsilon > 0$ hay n_0 con $d(x_n, x_{n'}) < \varepsilon$ para todos $n, n' \geq n_0$. (X, d) es *completo* si toda sucesión de Cauchy converge en X .




Figura 35. Las rampas de GT Ej. 3.6.9: todas a distancia ε de θ , con soporte cada vez más angosto. Punto a punto tienden a una función discontinua (ε en 0, 0 en el resto), así que ninguna subsucesión converge uniformemente.

$$\begin{aligned} (\{x_n\} \text{ de Cauchy} &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n, n' \geq n_0 : d(x_n, x_{n'}) < \varepsilon; \\ (X, d) \text{ completo} &\iff \forall \{x_n\} \text{ de Cauchy} \exists x_0 \in X : x_n \rightarrow x_0.) \end{aligned}$$

Proposición 11.58 ([GT 3.7.2–3.7.3, p. 58]). Toda sucesión de Cauchy está acotada, y toda sucesión convergente es de Cauchy.

$$(\{x_n\} \text{ de Cauchy} \Rightarrow \delta(\{x_n : n \geq 1\}) < \infty; \quad x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow \{x_n\} \text{ de Cauchy.})$$

Demostración. Con $\varepsilon = 1$, a partir de n_0 todos están a distancia < 1 de x_{n_0} , y quedan finitos términos antes: todos están en la bola de centro x_{n_0} y radio $r > \max\{1, d(x_{n_0}, x_i) : i < n_0\}$. Si $x_n \rightarrow x_0$: $d(x_n, x_{n'}) \leq d(x_n, x_0) + d(x_0, x_{n'}) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$ para n, n' grandes. $\square$

Proposición 11.59 (Compacto métrico $\Rightarrow$ completo [GT 3.7.5, p. 58]). Todo espacio métrico compacto es completo.

$$((X, d) \text{ compacto} \Rightarrow (X, d) \text{ completo.})$$

Demostración. Sea $\{x_n\}$ de Cauchy. Por el Teo. 11.51 tiene una subsucesión $x_{n_k} \rightarrow x_0$. Se ve que *toda* la sucesión converge a x_0 : dado ε , hay n_0 con $d(x_n, x_{n'}) < \frac{\varepsilon}{2}$ para $n, n' \geq n_0$ (Cauchy) y k_0 con $d(x_{n_k}, x_0) < \frac{\varepsilon}{2}$ para $k \geq k_0$. Para $n \geq n_0$ se elige $k \geq k_0$ con $n_k \geq n_0$, y $d(x_n, x_0) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x_0) < \varepsilon$. $\square$

Corolario 11.60 ($\mathbb{R}^n$ es completo [GT 3.7.6, p. 58]). $(\mathbb{R}^n, d_e)$ es completo.

$$(\forall \{x_n\} \subseteq \mathbb{R}^n \text{ de Cauchy} \exists x_0 \in \mathbb{R}^n : x_n \rightarrow x_0.)$$

Demostración. Una sucesión de Cauchy está acotada (Prop. 11.58), así que vive en una bola cerrada $K = B[x_1, r]$, que es compacta por Heine–Borel (Teo. 11.43). En el métrico compacto (K, d_e) es de Cauchy, luego converge a un punto de K (Prop. 11.59), y por lo tanto converge en $\mathbb{R}^n$. $\square$

Observación 11.61. La recíproca de la Prop. 11.59 es falsa: $\mathbb{R}$ es completo y no compacto. Y la completitud *no* es una propiedad topológica: $(0, 1) \cong \mathbb{R}$ (GT 2.8.17), pero $(0, 1)$ no es completo ($x_n = \frac{1}{n}$ es de Cauchy y no converge en $(0, 1)$). La compacidad sí lo es (Prop. 11.27).

11.8 Compacidad local

Definición 11.62 (Localmente compacto [GT 3.8.1, p. 59]). (X, τ) es *localmente compacto* si cada punto tiene entornos compactos arbitrariamente chicos: para todo $x \in X$ y todo entorno N de x existe un entorno N' de x compacto con $N' \subseteq N$.

$$(X \text{ localmente compacto} \iff \forall x \in X \forall N \in \mathcal{N}_x \exists N' \in \mathcal{N}_x : N' \subseteq N \wedge N' \text{ compacto.})$$

Proposición 11.63 (Caracterización en métricos [GT 3.8.2, p. 59]). Para un espacio métrico (X, d) son equivalentes:

- (1) (X, d) es localmente compacto;
- (2) cada $x \in X$ es centro de alguna bola cerrada $B[x, \varepsilon]$ compacta;
- (3) cada $x \in X$ tiene algún entorno compacto.

En particular, todo métrico compacto es localmente compacto ($N = X$ en (3)).

$$((1) \iff \forall x \exists \varepsilon > 0 : B[x, \varepsilon] \text{ compacta} \iff \forall x \exists N \in \mathcal{N}_x : N \text{ compacto.})$$

Idea. La herramienta es una sola: una bola cerrada metida en un compacto es compacta, porque es cerrada (§2) y cerrado dentro de compacto es compacto (Prop. 11.17). (1) $\Rightarrow$ (2): X es entorno de x , así que hay un entorno compacto N , y $B(x, \delta) \subseteq N$; entonces $B[x, \delta/2] \subseteq N$ es compacta. (2) $\Rightarrow$ (3): trivial. (3) $\Rightarrow$ (1): dado un entorno M de x , hay $B(x, \delta) \subseteq M$ y $B(x, \varepsilon) \subseteq N$ con N compacto; para $\mu < \min\{\delta, \varepsilon\}$, $N' = B[x, \mu]$ es un entorno de x contenido en M y compacto por estar dentro de N . $\square$

Ejemplo 11.64 ([GT Ejs. 3.8.3–3.8.6, p. 59]).

- $\mathbb{R}^n$ es localmente compacto: toda bola cerrada es compacta (Heine–Borel). No es compacto: la compacidad local es estrictamente más débil.
- Todo espacio discreto es localmente compacto: $\{x\}$ es un entorno compacto de x .
- $(0, 1)$ es localmente compacto (cumple (2): $B[x, \varepsilon] = [x - \varepsilon, x + \varepsilon]$ si $\varepsilon < \min\{x, 1 - x\}$), pero no toda bola cerrada es compacta: en el subespacio $(0, 1)$, $B[\frac{1}{2}, 1] = (0, 1)$.
- $\mathbb{Q}$ (usual) no es localmente compacto: $B[x, \varepsilon] = [x - \varepsilon, x + \varepsilon] \cap \mathbb{Q}$ no es compacta, porque si lo fuera en $\mathbb{Q}$ lo sería en $\mathbb{R}$ (Lema 11.5) y sería cerrada en $\mathbb{R}$, y no lo es (le faltan los irracionales del intervalo, que son adherentes).
- El espacio de funciones del Ej. 11.55 no es localmente compacto en θ : ninguna bola cerrada de centro θ es compacta.

Proposición 11.65 (Abiertos y cerrados de un localmente compacto [GT 3.8.7, p. 60]). Sea (X, d) métrico localmente compacto. Si $A \subseteq X$ es abierto, $(A, d|_A)$ es localmente compacto; si $B \subseteq X$ es cerrado, $(B, d|_B)$ es localmente compacto.

$$\begin{aligned} (X \text{ loc. compacto} \wedge A \in \tau_d &\Rightarrow (A, d|_A) \text{ loc. compacto;} \\ X \text{ loc. compacto} \wedge B \text{ cerrado} &\Rightarrow (B, d|_B) \text{ loc. compacto.}) \end{aligned}$$

Idea. Abierto: A es entorno de cada $a \in A$, así que hay un entorno compacto $N' \subseteq A$ de a , y una bola cerrada $B[a, \varepsilon] \subseteq N'$, compacta; como está dentro de A , es también la bola cerrada de $(A, d|_A)$. Cerrado: si $B[b, \varepsilon]$ es compacta en X , la bola de $(B, d|_B)$ es $B \cap B[b, \varepsilon]$, cerrado dentro de un compacto (Prop. 11.17). En los dos casos se aplica la Prop. 11.63(2). $\square$

Observación 11.66 (Errata de **GT** 3.8.7). Los dos ítems de **GT** dicen “cerrado”; el primero es “*abierto*”, como muestra su propia demostración (“como A es abierto, A es entorno de a ”). Sin alguna de las dos hipótesis puede fallar: $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ no es abierto ni cerrado, y no es localmente compacto (Ej. 11.64).

Apéndice A: mapa rápido de los ejercicios de la guía

Guía	Herramienta principal
Métricos A.1–A.5	Lema de deformación por f creciente y subaditiva; métrica inducida por inyección; contraejemplo de pseudométrica.
Métricos A.6–A.9	Axiomática mínima; $d(\cdot, A)$ es 1-lipschitziana; norma asociada a una métrica invariante y homogénea.
Ej. teórico N°1	Cauchy–Schwarz, norma asociada, polarización, ley del paralelogramo.
Métricos C.1–C.8	Bolas en d_{taxi} , d_{max} , d_D ; truncamiento; diámetro y acotación.
Métricos C.9–C.12	$\text{int } A$ como unión de abiertos; convexidad de bolas; $\overline{B(x, r)} = B[x, r]$ en normados.
Topológicos A.1–A.6	Verificación de axiomas de topología; familias totalmente ordenadas; cerrados asociados.
Topológicos A.7–A.13	Entornos; clausura/interior/frontera en τ_u ; $\text{fr } A = \emptyset$; unitarios cerrados; densidad.
Topológicos D.1–D.5	Álgebra fina de $\text{int}(\cdot)$ y $\overline{(\cdot)}$; problema de Kuratowski; frontera de uniones e intersecciones.
Ej. teórico N°2	Bases, topología generada, criterio de base, comparación por bases, subbases, K -topología.
Ej. teóricos T_0, T_1, T_2	Jerarquía de separación; $T_1 \iff$ puntos cerrados; unicidad de límites.
Continuidad A.1–A.3	Continuidad <i>en un punto</i> ; χ_A y $\chi_{\mathbb{Q}}$; $d(\cdot, A)$ uniformemente continua.
Continuidad A.4–A.10	Continuidad coordenada a coordenada; álgebra de continuas; métricas producto; cofinita y conumerable; preimagen de cerrados.
Continuidad B	Preimágenes vs. imágenes; homeomorfismos; isometrías; $\{f < g\}$ y $\{f \neq g\}$; lema del pegado; $\max\{f, g\}$ por subbase.
<i>Segundo parcial</i>	
Productos 1–3 (TP p. 4)	$\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$ e $\text{int}(A \times B) = \text{int } A \times \text{int } B$; $T_2 \times T_2$ es T_2 ; continuidad de $f \times g$ y de (f, g) . Trabajar en la base de rectángulos y pensarlos como tubos (§9).
Conexidad 1–10 (salvo 4)	Desconexiones con G, H del espacio grande; imagen continua; funciones a un discreto; dos puntos en un conexo; uniones (5–7: uno que corta a todos, dos a dos, en cadena); sándwich. El 4 usa Bolzano (§10.6).
Conexidad 15–23	Arcoconexidad, componentes conexas y por caminos, conexión local, puntos de corte (§10, subsecciones finales); el 21 usa compacidad (§11).

Apéndice B: lo que entra en el primer parcial

Cada ítem va enunciado dos veces: en lenguaje natural y en lenguaje lógico. Salvo aclaración, (X, τ) , (Y, τ') son espacios topológicos y (X, d) , (Y, ρ) métricos.

B.1 Espacios métricos y normados

- **Distancia.** d mide separación: nunca negativa, simétrica, nula sólo entre un punto y sí mismo, y nunca conviene desviarse. [GT 1.1.1]

$$\forall x, y, z \in X : \quad d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = d(y, x) \wedge (d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y) \wedge d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

Seudodistancia: se reemplaza la tercera por $\forall x : d(x, x) = 0$.

- **Axiomática mínima.** Alcanza con la anulación y una triangular con el punto auxiliar al final: simetría y positividad se deducen. [EJ Métricos-A.6]

$$d \text{ es distancia} \iff \left[\forall x, y (d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y) \wedge \forall x, y, z d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z) \right].$$

- **Norma.** Longitud de un vector: no negativa, homogénea, nula sólo en 0, subaditiva. [GT 1.1.4]

$$\forall v, w \in V \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} : \quad \|v\| \geq 0 \wedge \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\| \wedge (\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0) \wedge \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

- **Distancia asociada a una norma.** Toda norma induce una distancia. [GT 1.1.5]

$$(V, \|\cdot\|) \text{ normado} \Rightarrow d(v, w) := \|v - w\| \text{ es distancia en } V.$$

- **Cuándo una métrica proviene de una norma.** Sólo si es insensible a trasladar y escala con el factor. [EJ Métricos-A.8]

$$\exists \|\cdot\| : d(x, y) = \|x - y\| \iff \forall x, y, z d(x + z, y + z) = d(x, y) \wedge \forall \lambda d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y),$$

y en ese caso $\|x\| = d(x, 0)$.

- **La discreta no proviene de una norma.** En $\mathbb{R}^n$ ninguna norma da la métrica discreta. [GT 1.1.17]

$$\neg \exists \|\cdot\| \text{ norma en } \mathbb{R}^n : \forall x, y \quad \|x - y\| = d_D(x, y).$$

- **Producto interno y Cauchy-Schwarz.** El producto interno nunca supera al producto de las longitudes. [EJ Ej. teórico N° 1]

$$\forall u, v \in V : \quad |(u, v)| \leq \|u\| \|v\|, \quad \|u\| := \sqrt{(u, u)}.$$

- **Polarización y ley del paralelogramo.** Una norma viene de un producto interno exactamente cuando cumple la identidad del paralelogramo.

$$(u, v) = \frac{1}{4} \|u+v\|^2 - \frac{1}{4} \|u-v\|^2; \quad \|\cdot\| \text{ proviene de p.i.} \iff \forall u, v \quad \|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

- **Deformación de una métrica.** Componer con una función creciente y subaditiva que sólo se anula en 0 vuelve a dar una distancia. [EJ Métricos-A.1, A.2, C.3]

$$\left[f \text{ creciente} \wedge \forall a, b \quad f(a+b) \leq f(a) + f(b) \wedge (f(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0) \right] \Rightarrow f \circ d \text{ es distancia.}$$

Casos: $f(t) = \min\{1, t\}$, $f(t) = \frac{t}{1+t}$, $f(t) = \min\{t, r\}$.

- **Métrica inducida por una función.** Copiar la distancia del codominio da distancia exactamente cuando la función no pega puntos. [EJ Métricos-A.3]

$$d(x, x') := \rho(f(x), f(x')) \text{ es seudodistancia; } \quad d \text{ es distancia} \iff f \text{ es inyectiva.}$$

- **Distancia a un conjunto, entre conjuntos, diámetro.** [EJ Métricos-A.7, A.9, C.5-C.8]

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a), \quad d(A, B) = \inf_{a \in A, b \in B} d(a, b), \quad \delta(A) = \sup_{a, b \in A} d(a, b), \quad A \text{ acotado} \iff \delta(A) < \infty.$$

- $d(\cdot, A)$ es 1-lipschitziana. Moverse una cierta distancia cambia la distancia al conjunto a lo sumo en esa cantidad. [EJ Métricos-A.7]

$$\forall x, y \in X : |d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

- **Bolas.** [GT 1.1.18]

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in X : d(x, y) < \varepsilon\}, \quad B[x, \varepsilon] = \{y \in X : d(x, y) \leq \varepsilon\}.$$

- **Propiedad de reencaje.** Alrededor de cada punto de una bola hay otra bola contenida en ella. [GT 1.1.25]

$$\forall y \in B(x, \varepsilon) \quad \exists \delta > 0 : B(y, \delta) \subseteq B(x, \varepsilon) \quad (\text{sirve } \delta = \varepsilon - d(x, y)).$$

- **Separación en métricos.** Dos puntos distintos tienen bolas disjuntas. [GT 1.1.26]

$$\forall x \neq y \quad \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap B(y, \varepsilon) = \emptyset \quad (\text{sirve } \varepsilon = \frac{d(x, y)}{2}).$$

- **Convexidad de las bolas en normados.** El segmento entre dos puntos de una bola no se sale de ella. [EJ Métricos-C.11]

$$\forall y, z \in B(x, r) \quad \forall t \in (0, 1) : ty + (1 - t)z \in B(x, r).$$

- **Clausura de la bola abierta en normados.** En un normado la clausura de la bola abierta es la cerrada; en un métrico general no. [EJ Métricos-C.12]

$$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|) : \overline{B(x, r)} = B[x, r]; \quad (X, d_D) : \overline{B(x, 1)} = \{x\} \subsetneq B[x, 1] = X.$$

- **Normas de referencia en $\mathbb{R}^n$.** Euclídea, del taxi y del máximo son normas; la triangular de las dos últimas sale coordinada a coordinada. [GT 1.1.2-1.1.3, 1.1.6-1.1.10]

$$\|x\|_{\text{taxi}} = \sum_i |x_i|, \quad \|x\|_{\max} = \max_i |x_i|, \quad \|x\|_e = \left(\sum_i x_i^2 \right)^{1/2};$$

$$n = 1 : d(x, y) = |x - y|.$$

- **Norma del supremo y norma integral.** Sobre las acotadas, el supremo del valor absoluto; sobre las continuas en $[0, 1]$, la integral del valor absoluto (la anulación usa la continuidad). [GT 1.1.11-1.1.13]

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| \text{ en } \ell^{\infty}(\mathbb{R}); \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f| \text{ en } C[0, 1]; \quad d_{\infty}(\sin, \cos) = \sqrt{2}.$$

- **Seudodistancias de referencia.** Copiar la distancia a través de una función no inyectiva da una seudodistancia que no separa puntos. [GT 1.1.15, 1.1.27]

$$d_{\text{meta}}(f, g) = |f(1) - g(1)| \text{ en } C[0, 1]; \quad d((x, x'), (y, y')) = |x - y| \text{ en } \mathbb{R}^2 : d((0, 0), (0, 1)) = 0.$$

- **Bolas de referencia.** Intervalo, disco, rombo, cuadrado; en d_{∞} , una franja con margen; en la discreta, un punto o todo. [GT 1.1.19-1.1.24]

$$B_{|\cdot|}(x, \varepsilon) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon); \quad B_{d_{\max}}(0, \varepsilon) = (-\varepsilon, \varepsilon)^2;$$

$$B_{d_{\infty}}(\theta, \varepsilon) = \{f : \sup |f| < \varepsilon\}; \quad B_{d_D}(\theta, \varepsilon) = \{\theta\} \quad (\varepsilon \leq 1), \quad \mathbb{R}^2 \quad (\varepsilon > 1).$$

B.2 Topología de un espacio métrico

- **Interior, abierto, entorno (versión métrica).** Un punto es interior si tiene margen dentro del conjunto. *[GT 1.2.1, 1.2.6]*

$$x \in \text{int } A \iff \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \subseteq A; \quad A \text{ abierto} \iff A = \text{int } A; \quad N \in \mathcal{N}_x \iff x \in \text{int } N.$$

- **Propiedades de los abiertos.** Las tres que después se toman como axiomas. *[GT 1.2.8]*

$$\emptyset, X \text{ abiertos}; \quad \bigcup_{i \in I} G_i \text{ abierto}; \quad \bigcap_{k=1}^n G_k \text{ abierto}.$$

- **Equivalencia de las métricas usuales de $\mathbb{R}^n$.** Distancias distintas pueden dar la misma topología. *[GT 1.2.3–1.2.4]*

$$\tau_{d_e} = \tau_{d_{\text{taxi}}} = \tau_{d_{\text{max}}}.$$

- **Comparación de las tres métricas de $\mathbb{R}^n$.** La del máximo es la menor, la del taxi la mayor, y a lo sumo n veces la del máximo; por eso las bolas encajan y las topologías coinciden. *[GT 1.2.3–1.2.4, Nota 1.2.5]*

$$d_{\text{max}} \leq d_e \leq d_{\text{taxi}} \leq n d_{\text{max}} \Rightarrow \tau_{d_e} = \tau_{d_{\text{taxi}}} = \tau_{d_{\text{max}}}.$$

- **Acumulación en métricos.** Un punto de acumulación tiene infinitos puntos del conjunto en cada entorno; por eso los finitos no acumulan. *[GT 2.3.2–2.3.3]*

$$(X, d) : \quad x \in A' \iff \forall G \in \tau_d (x \in G \Rightarrow |G \cap A| = \infty).$$

- **Supremo e ínfimo son adherentes.** En $\mathbb{R}$, el ínfimo y el supremo de un conjunto no vacío (si existen) están en su clausura; un cerrado acotado no vacío tiene mínimo y máximo. *[GT Ej. 2.3.7]*

$$\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R} \text{ acotado} \Rightarrow \inf A, \sup A \in \bar{A}; \quad A = \bar{A} \Rightarrow \inf A = \min A, \sup A = \max A.$$

B.3 Espacios topológicos

- **Topología.** *[GT 2.1.1]*

$$\emptyset, X \in \tau; \quad \forall \{G_i\}_{i \in I} \subseteq \tau : \bigcup_{i \in I} G_i \in \tau; \quad \forall G_1, \dots, G_n \in \tau : \bigcap_{k=1}^n G_k \in \tau.$$

- **Cerrados.** Complemento de abierto, con las propiedades duales. *[GT 2.4.2, 2.4.4]*

$$C \text{ cerrado} \iff X - C \in \tau; \quad \bigcap_{i \in I} C_i \text{ cerrado}; \quad \bigcup_{k=1}^n C_k \text{ cerrado}.$$

- **Topologías de referencia.** *[GT 2.1.4; EJ Top-A; catálogo completo en el Apéndice E]*

$$\tau_{\text{dis}} = \mathcal{P}(X), \quad \tau_{\text{ind}} = \{\emptyset, X\}, \quad \tau_{\text{cof}} = \{\emptyset\} \cup \{A : X - A \text{ finito}\}, \quad \tau_{\text{conum}} = \{A : X - A \text{ numerable}\} \cup \{\emptyset\},$$

$$\tau_{x_0} = \{X\} \cup \{A \subseteq X : x_0 \notin A\}.$$

- **La cofinita no es metrizable.** Si el conjunto es infinito, ninguna distancia produce la cofinita. *[GT 2.1.5]*

$$X \text{ infinito} \Rightarrow \neg \exists d \text{ distancia en } X : \tau_d = \tau_{\text{cof}}.$$

- **Interior topológico.** El mayor abierto contenido en el conjunto. [GT 2.2.1, 2.2.3]

$$x \in \text{int } A \iff \exists G \in \tau : x \in G \subseteq A; \quad \text{int } A = \bigcup \{G \in \tau : G \subseteq A\}; \quad A \in \tau \iff A = \text{int } A.$$

- **Entorno, punto aislado, de acumulación, adherente.** [GT 2.2.5, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.4]

$$N \in \mathcal{N}_x \iff \exists G \in \tau : x \in G \subseteq N; \quad x \text{ aislado de } A \iff \exists G \in \tau : G \cap A = \{x\};$$

$$x \in A' \iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset); \quad x \in \overline{A} \iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap A \neq \emptyset).$$

- **Clausura.** El menor cerrado que contiene al conjunto. [GT 2.3.6, 2.3.8]

$$\overline{A} = \bigcap \{C \text{ cerrado} : A \subseteq C\} = A \cup A'; \quad A \text{ cerrado} \iff A = \overline{A}.$$

- **Dualidad interior/clausura.** Una operación es la otra vista desde el complemento. [GT 2.4.1]

$$\overline{A} = X - \text{int}(X - A); \quad \text{int } A = X - \overline{X - A}.$$

- **Álgebra de interior y clausura.** [GT 2.2.4, 2.4.3]

$$\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B, \quad \text{int } A \cup \text{int } B \subseteq \text{int}(A \cup B),$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \text{int}(\text{int } A) = \text{int } A, \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}.$$

- **Frontera y exterior.** Los indecisos, y la partición del espacio en tres. [GT 2.6.1–2.6.5]

$$x \in \text{fr } A \iff \forall G \in \tau (x \in G \Rightarrow G \cap A \neq \emptyset \wedge G \cap (X - A) \neq \emptyset);$$

$$\text{fr } A = \overline{A} \cap \overline{X - A} = \overline{A} - \text{int } A; \quad X = \text{int } A \dot{\cup} \text{fr } A \dot{\cup} \text{ext } A.$$

- **Abierto y cerrado a la vez.** Equivale a no tener borde. [EJ Top-A.11]

$$A \in \tau \wedge A \text{ cerrado} \iff \text{fr } A = \emptyset.$$

- **Unitarios cerrados en métricos.** [EJ Top-A.12]

$$(X, d) \Rightarrow \forall x \in X : X - \{x\} \in \tau_d, \text{ es decir } \{x\} \text{ es cerrado.}$$

- **Denso.** Toca a todos los abiertos no vacíos. [EJ Top-A.13]

$$\overline{D} = X \iff \forall G \in \tau (G \neq \emptyset \Rightarrow G \cap D \neq \emptyset) \iff \text{int}(X - D) = \emptyset.$$

- **Clausura y abiertos.** Un abierto se puede meter adentro de la clausura. [EJ Top-D.1]

$$A \in \tau \Rightarrow A \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}.$$

- **Frontera de una unión.** [EJ Top-D.4]

$$\text{fr}(A \cup B) \subseteq \text{fr } A \cup \text{fr } B; \quad \overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset \Rightarrow \text{fr}(A \cup B) = \text{fr } A \cup \text{fr } B.$$

- **Operadores de Kuratowski.** Alternar interior y clausura se estabiliza, pero los dos órdenes no dan lo mismo. [EJ Top-D.2]

$$i(A) := \text{int}(\overline{A}) = (\overline{A})^\circ, \quad c(A) := \overline{\text{int } A} = \overline{A}^\circ; \quad i \circ i = i, \quad c \circ c = c;$$

$$A \in \tau \Rightarrow A \subseteq i(A); \quad A \text{ cerrado} \Rightarrow c(A) \subseteq A; \quad i(A) \text{ y } c(A) \text{ son incomparables en general.}$$

- **La clausura medida con la distancia.** En un métrico, estar pegado a A es estar a distancia cero de A .

$$(X, d) : \quad \overline{A} = \{x \in X : d(x, A) = 0\}; \quad A \text{ cerrado} \iff (d(x, A) = 0 \Rightarrow x \in A).$$

- **Frontera de un abierto.** Un abierto (o un cerrado) tiene borde sin interior.

$$A \in \tau \vee A \text{ cerrado} \Rightarrow \text{int}(\text{fr } A) = \emptyset; \quad \text{falso en general: } \text{int}(\text{fr } \mathbb{Q}) = \mathbb{R}.$$

- **Ni siquiera pseudometrizable.** Una pseudodistancia que separara dos puntos los separaría con bolas disjuntas; si no separa ninguno, da la indiscreta. *[GT Nota 2.1.6]*

$$X \text{ infinito} \Rightarrow \neg \exists d \text{ pseudodistancia : } \tau_d = \tau_{\text{cof}}.$$

- **Abierto = entorno de todos sus puntos.** *[GT 2.2.6]*

$$A \in \tau \iff \forall x \in A : A \in \mathcal{N}_x.$$

- **Interior, clausura y frontera de ejemplos.** *[GT Ej. 2.6.6]*

$$\text{int } \mathbb{Z} = \emptyset, \quad \overline{\mathbb{Z}} = \text{fr } \mathbb{Z} = \mathbb{Z}; \quad \text{int}[a, b) = (a, b), \quad \overline{[a, b)} = [a, b], \quad \text{fr}[a, b) = \{a, b\};$$

$$D = \{\text{derivables}\} \subseteq (C[-1, 1], d_\infty) \text{ no es cerrado.}$$

B.4 Bases y subbases (sólo conceptual: hay que saber qué es una base)

- **Base para una topología.** Piezas con las que se arman todos los abiertos: la condición **(B1)** de cubrir y la **(B2)** de poder encajar en las intersecciones. *[MS Def. 2.4]*

$$\underbrace{(\forall x \in X \exists B \in \beta : x \in B)}_{\text{(B1)}} \wedge \underbrace{(\forall B_1, B_2 \in \beta \forall x \in B_1 \cap B_2 \exists B_3 \in \beta : x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2)}_{\text{(B2)}},$$

$$\tau_\beta = \{U \subseteq X : \forall x \in U \exists B \in \beta, x \in B \subseteq U\} = \left\{ \bigcup_{i \in I} B_i : B_i \in \beta \right\}.$$

- **Base de una topología dada.** *[MS Teo. 2.3]*

$$\beta \subseteq \tau \text{ es base de } \tau \iff \forall U \in \tau \forall x \in U \exists B \in \beta : x \in B \subseteq U.$$

- **Comparación de topologías.** Más fina = tiene más abiertos, y se chequea con básicos. *[MS Teo. 2.4]*

$$\tau' \text{ más fina que } \tau \iff \tau \subseteq \tau' \iff \forall x \in X \forall B \in \beta (x \in B \Rightarrow \exists B' \in \beta' : x \in B' \subseteq B).$$

- **Subbase.** *[MS Lema 2.6]*

$$\bigcup_{S \in \sigma} S = X \Rightarrow \left\{ \bigcap_{k=1}^n S_k : S_k \in \sigma, n \in \mathbb{N} \right\} \text{ es base de una topología.}$$

B.5 Axiomas de separación

- T_0, T_1, T_2 . Cuánto puede la topología distinguir dos puntos distintos. [EJ Ej. teóricos; GT 2.5.3]

$$T_0 : \forall x \neq y \exists U \in \tau : (x \in U \wedge y \notin U) \vee (y \in U \wedge x \notin U);$$

$$T_1 : \forall x \neq y \exists U, V \in \tau : (x \in U \wedge y \notin U) \wedge (y \in V \wedge x \notin V);$$

$$T_2 : \forall x \neq y \exists U, V \in \tau : x \in U \wedge y \in V \wedge U \cap V = \emptyset.$$

- **Jerarquía.** Cada nivel implica el anterior y ninguna recíproca vale.

$$T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0; \quad \tau_{cof} (X \text{ infinito}) : T_1 \wedge \neg T_2; \quad \text{Sierpiński} : T_0 \wedge \neg T_1.$$

- **Caracterización de T_1 .** [EJ Ej. teórico 4]

$$X \text{ es } T_1 \iff \forall x \in X : \{x\} \text{ es cerrado.}$$

- **Métrico $\Rightarrow$ Hausdorff.** [GT 1.1.26]

$$(X, d) \text{ métrico} \Rightarrow (X, \tau_d) \text{ es } T_2.$$

B.6 Sucesiones y convergencia

- **Convergencia.** Toda cola termina metida en cualquier abierto que contenga al límite. [GT 2.5.1]

$$x_n \rightarrow x_0 \iff \forall G \in \tau (x_0 \in G \Rightarrow \exists n_0 \forall n \geq n_0 : x_n \in G).$$

- **Unicidad del límite.** [GT 2.5.2]

$$X \text{ es } T_2 \Rightarrow (x_n \rightarrow x \wedge x_n \rightarrow y \Rightarrow x = y).$$

- **Clausura por sucesiones** (sólo métricos). [GT 2.5.6–2.5.7]

$$(X, d) : x \in \bar{A} \iff \exists \{a_n\}_{n \geq 1} \subseteq A : a_n \rightarrow x; \quad A \text{ cerrado} \iff (\{a_n\} \subseteq A \wedge a_n \rightarrow x \Rightarrow x \in A).$$

- **Sin Hausdorff, varios límites.** Con la pseudodistancia $|x - x'|$ en $\mathbb{R}^2$, la sucesión $(1/n, 0)$ converge a todos los puntos del eje vertical. [GT Ej. 2.5.5]

$$d((x, y), (x', y')) = |x - x'| : \forall y \in \mathbb{R} (1/n, 0) \rightarrow (0, y).$$

B.7 Continuidad

- **Continuidad en un punto.** Todo objetivo alrededor de la imagen se alcanza desde algún entorno del punto. [MS Def. 4.1]

$$f \text{ continua en } a \iff \forall M \in \mathcal{N}_{f(a)} \exists N \in \mathcal{N}_a : f(N) \subseteq M \iff \forall M \in \mathcal{N}_{f(a)} : f^{-1}(M) \in \mathcal{N}_a.$$

- **Versión ε - δ .** [GT 2.8.4]

$$f \text{ continua en } a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : f(B(a, \delta)) \subseteq B(f(a), \varepsilon).$$

- **Las caracterizaciones de la continuidad global.** Todas equivalentes; en el parcial se usan sobre todo (2) y (3). [GT 2.8.1–2.8.2]

$$(1) \forall A \subseteq X : f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)} \iff (2) \forall F \text{ cerrado de } Y : f^{-1}(F) \text{ cerrado}$$

$$\iff (3) \forall G \in \tau' : f^{-1}(G) \in \tau \iff (4) \forall B \subseteq Y : \overline{f^{-1}(B)} \subseteq f^{-1}(\bar{B}).$$

Basta verificar (3) sobre los elementos de una base o subbase de τ' .

- **Caracterización por convergencia** (sólo métricos como $\Longleftrightarrow$). [GT 2.8.5]

$$(X, d) \rightarrow (Y, \rho) : f \text{ continua} \Longleftrightarrow \forall \{x_n\} (x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x_0)).$$

La implicación $\Rightarrow$ vale en cualquier espacio topológico; la $\Leftarrow$ usa la clausura por sucesiones y necesita métrica.

- **Propiedades generales.** [GT 2.8.6]

$$f \text{ constante} \Rightarrow f \text{ continua}; \quad 1_X : (X, \tau) \rightarrow (X, \tau) \text{ continua}; \quad f, g \text{ continuas} \Rightarrow g \circ f \text{ continua};$$

$$f \text{ continua} \Rightarrow f|_A : (A, \tau_A) \rightarrow Y \text{ continua}; \quad \text{en particular } i : (A, \tau_A) \rightarrow (X, \tau) \text{ es continua.}$$

- **Inclusión, restricción, correstricción.** Las tres cambian el dominio o el codominio, no la fórmula. [GT 2.8.6d y 2.8.7; TS Obs. 3.1.4]

$$i : A \rightarrow X, i(a) = a; \quad i^{-1}(U) = U \cap A; \quad f|_A = f \circ i; \quad \tilde{f} = f|^{f(X)} : X \rightarrow f(X).$$

- **Correstricción a la imagen.** [GT 2.8.7]

$$f \text{ continua} \Rightarrow \tilde{f} : (X, \tau) \rightarrow (f(X), \tau'|_{f(X)}), \quad \tilde{f}(x) = f(x), \text{ es continua.}$$

- **La identidad entre dos topologías.** La identidad es continua exactamente cuando la topología de salida es la más fina. [GT Ej. 2.8.8]

$$1_X : (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2) \text{ continua} \Longleftrightarrow \tau_2 \subseteq \tau_1; \quad (1_X \text{ continua en ambos sentidos}) \Longleftrightarrow \tau_1 = \tau_2.$$

- **Homeomorfismo.** Dos espacios que son el mismo salvo el nombre de los puntos. [GT 2.8.9]

$$f \text{ homeomorfismo} \Longleftrightarrow f \text{ biyectiva} \wedge f \text{ continua} \wedge f^{-1} \text{ continua.}$$

- **Aplicación abierta y cerrada.** Hablan de *imágenes*, no de preimágenes. [GT 2.8.14]

$$f \text{ abierta} \Longleftrightarrow \forall G \in \tau : f(G) \in \tau'; \quad f \text{ cerrada} \Longleftrightarrow \forall F \text{ cerrado de } X : f(F) \text{ cerrado de } Y.$$

- **Los homeomorfismos son abiertos y cerrados.** El truco es leer la imagen como preimagen de la inversa. [GT 2.8.13]

$$f \text{ homeomorfismo} \wedge G \in \tau \Rightarrow f(G) = (f^{-1})^{-1}(G) \in \tau'.$$

- **Caracterización de homeomorfismo.** [GT 2.8.15]

$$f \text{ homeo} \Longleftrightarrow (f \text{ biyectiva} \wedge \text{continua} \wedge \text{abierta}) \Longleftrightarrow (f \text{ biyectiva} \wedge \text{continua} \wedge \text{cerrada}).$$

$$\text{También: } f \text{ homeo} \Longleftrightarrow f \text{ biyectiva} \wedge \forall A \subseteq X : f(\overline{A}) = \overline{f(A)}.$$

- **Isometría biyectiva.** [EJ Continuidad-B.4]

$$[f \text{ biyectiva} \wedge \forall x, x' \rho(f(x), f(x')) = d(x, x')] \Rightarrow f \text{ es homeomorfismo.}$$

- **Propiedad topológica.** Lo que se conserva por homeomorfismos; la acotación no lo es.

$$P \text{ topológica} \Longleftrightarrow (X \cong Y \wedge X \text{ cumple } P \Rightarrow Y \text{ cumple } P); \quad (0, 1) \cong \mathbb{R} \text{ con sólo uno acotado.}$$

- **Función característica.** Es continua exactamente cuando el conjunto no tiene borde. [EJ Continuidad-A.1-A.2]

$$\chi_A : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u) \text{ continua} \iff A \in \tau \wedge A \text{ cerrado} \iff \text{fr } A = \emptyset.$$

- **Conjuntos definidos por desigualdades.** [EJ Continuidad-B.5]

$$f, g : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u) \text{ continuas} \Rightarrow \{x \in X : f(x) < g(x)\} \in \tau.$$

- **Coincidencia y Hausdorff.** Donde dos funciones continuas difieren es abierto; donde coinciden, cerrado. [EJ Continuidad-B.6]

$$f, g : X \rightarrow Y \text{ continuas} \wedge Y \text{ es } T_2 \Rightarrow \{x : f(x) \neq g(x)\} \in \tau \wedge \{x : f(x) = g(x)\} \text{ cerrado.}$$

$$\text{Corolario: } D \text{ denso} \wedge f|_D = g|_D \Rightarrow f = g.$$

- **Continuidad y densidad.** La imagen de un denso por una continua sobreyectiva es densa. [EJ Continuidad-A.10]

$$\overline{D} = X \wedge f \text{ continua y sobreyectiva} \Rightarrow \overline{f(D)} = Y.$$

- **La distancia es continua.** Moviendo los extremos, la distancia cambia a lo sumo lo que se movieron. [EJ Continuidad-A.7; video de cátedra]

$$|d(x, y) - d(z, w)| \leq d(x, z) + d(y, w); \quad d : (X \times X, d_{\max}) \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua con } \delta = \frac{\varepsilon}{2} \text{ (con } d_{\text{sum}} : \delta = \varepsilon).$$

- **Lema del pegado.** Si las restricciones son continuas, la función lo es — con abiertos siempre, con cerrados sólo en cantidad finita. [EJ Continuidad-B.7]

$$X = \bigcup_{F \in \mathcal{F}} F \wedge \forall F \in \mathcal{F} : f|_F \text{ continua} \wedge \mathcal{F} \subseteq \tau \Rightarrow f \text{ continua;}$$

$$X = \bigcup_{k=1}^n F_k \wedge \forall k : F_k \text{ cerrado} \wedge f|_{F_k} \text{ continua} \Rightarrow f \text{ continua.}$$

- **Conjuntos de nivel.** [EJ Continuidad-A.9]

$$f : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_u) \text{ continua} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R} : f^{-1}(a) \text{ es cerrado.}$$

- **Intervalos abiertos homeomorfos.** Todos los intervalos abiertos, acotados o no, son homeomorfos a $\mathbb{R}$ (afines, tan, exp). [GT 2.8.16, 2.8.17]

$$(a, b) \cong (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \stackrel{\tan}{\cong} \mathbb{R} \stackrel{\exp}{\cong} (0, +\infty) \cong (c, +\infty) \cong (-\infty, -c).$$

- **Inmersión y gráfica.** Una inmersión es una continua inyectiva que es homeomorfismo sobre su imagen; la gráfica de una continua es una copia de la recta. [GT 2.8.18-2.8.21]

$$f \text{ inmersión} \iff f \text{ continua, inyectiva y } \tilde{f} : X \rightarrow f(X) \text{ homeo;}$$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ continua} \iff \varphi_f(x) = (x, f(x)) \text{ inmersión.}$$

B.8 Topología de subespacio

- **Topología relativa.** Los abiertos de A son las trazas de los abiertos de X . [GT 2.7.1; TS 3.1]

$$\tau_A = \{U \cap A : U \in \tau\}; \quad F \subseteq A \text{ cerrado en } A \iff \exists C \text{ cerrado de } X : F = C \cap A.$$

- τ_A como la menos fina que hace continua la inclusión. [TS Def. 3.1.1]

$$i^{-1}(U) = U \cap A; \quad \tau_A = \min \{ \tau^* \text{ topología en } A : i : (A, \tau^*) \rightarrow X \text{ continua} \},$$

donde el mínimo es respecto de $\subseteq$. Las más finas (por ejemplo la discreta) también hacen continua a i , pero no son mínimas.

- **Propiedad universal.** Una función hacia A es continua exactamente cuando lo es vista dentro de X . [TS Prop. 3.1.2]

$$(*) \quad \forall Z \text{ espacio topológico } \forall f : Z \rightarrow A : \quad f \text{ continua} \iff i \circ f : Z \rightarrow X \text{ continua.}$$

- **Unicidad.** τ_A es la única topología con esa propiedad. [TS Prop. 3.1.3]

$$\tau^* \text{ cumple } (*) \Rightarrow \tau^* = \tau_A,$$

y se prueba con 1_A en los dos sentidos, usando que $1_A : (A, \tau_1) \rightarrow (A, \tau_2)$ continua $\iff \tau_2 \subseteq \tau_1$.

- **Restricción y correstricción.** [TS Obs. 3.1.4]

$$g : X \rightarrow Y \text{ continua} \Rightarrow g|_A = g \circ i \text{ continua};$$

$$h : Z \rightarrow X \text{ continua} \wedge h(Z) \subseteq A \Rightarrow h|_A : Z \rightarrow A \text{ continua.}$$

- **Clausura relativa y métrica restringida.** [GT 2.7.4–2.7.5]

$$B \subseteq A \subseteq X : \quad \overline{B}^A = \overline{B}^X \cap A; \quad (X, d) : B_{d|_A}(a, \varepsilon) = B(a, \varepsilon) \cap A, \text{ luego } \tau_{d|_A} = (\tau_d)_A.$$

- **Subespacio abierto y cerrado.** [TS Def. 3.1.6, Ej. 3.1.7]

$$A \text{ subespacio abierto} \iff A \in \tau \iff i : A \rightarrow X \text{ es abierta};$$

$$A \text{ subespacio cerrado} \iff A \text{ cerrado en } X \iff i : A \rightarrow X \text{ es cerrada.}$$

$$A \in \tau \Rightarrow (V \in \tau_A \Rightarrow V \in \tau).$$

Apéndice C: lo que entra en el segundo parcial

Mismo formato que el Apéndice B: cada ítem en lenguaje natural y en lenguaje lógico. Cubre las clases 9 (producto, 10/9/2026), 10 (conexidad, 24/9/2026), 11 (intervalos, Bolzano y arcoconexidad, 28/9/2026), 12 (componentes arcoconexas y conexión local por caminos, 1/10/2026) y 13 (puntos de corte, componentes conexas, conexión local y comienzo de compacidad, 5/10/2026), más el resto de la guía teórica. Según la docente, en el parcial va a haber seguro un ejercicio de producto (“de conexos con productos o de compactos con productos”) y, sobre homeomorfismos, “muy verdadero o falso”; lo más importante es pensar si algo es conexo o no (uniones, cosas en el producto). $X \times Y$ lleva siempre la topología producto.

C.1 Topología producto

- **Continuidad en una base del codominio.** Para ver que f es continua alcanza con que la preimagen de cada básico sea abierta (no hace falta que sea básica). [TP p. 4]

$$\beta \text{ base de } \tau_Y \wedge \forall B \in \beta : f^{-1}(B) \in \tau_X \Rightarrow f \text{ continua.}$$

- **Base de rectángulos.** Abierto por abierto: cubre, y la intersección de dos rectángulos es un rectángulo. [TP p. 1; MS §5.4]

$$\beta_{X \times Y} = \{U \times V : U \in \tau_X, V \in \tau_Y\}; \quad (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2).$$

- **Topología producto.** Los abiertos son uniones de rectángulos: cada punto tiene un rectángulo alrededor. [TP pp. 1-2]

$$G \in \tau_{X \times Y} \iff G = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \times V_{\alpha} \iff \forall (x, y) \in G \exists U \in \tau_X \exists V \in \tau_Y : (x, y) \in U \times V \subseteq G.$$

- **El error frecuente.** Un abierto del producto no es un rectángulo, ni el producto de sus proyecciones. [TP p. 2]

$$G \in \tau_{X \times Y} \not\Rightarrow G = U \times V; \quad G \neq \pi_X(G) \times \pi_Y(G) \text{ en general.}$$

- **Tubos.** La preimagen por una proyección es un tubo, y un rectángulo es la intersección de dos tubos.

$$\pi_X^{-1}(U) = U \times Y; \quad \pi_Y^{-1}(V) = X \times V; \quad U \times V = \pi_X^{-1}(U) \cap \pi_Y^{-1}(V).$$

- **La menos fina que hace continuas a las proyecciones.** Las proyecciones son continuas, y cualquier otra topología que lo logre tiene más abiertos. [TP p. 2; GT 2.8.11]

$$\pi_X, \pi_Y \text{ continuas; } (\pi_X, \pi_Y : (X \times Y, \sigma) \rightarrow X, Y \text{ continuas}) \Rightarrow \tau_{X \times Y} \subseteq \sigma.$$

- **Continuidad hacia un producto.** Una función al producto es continua exactamente cuando sus dos coordenadas lo son. [TP p. 3; MS Prop. 5.10; GT 2.8.12]

$$f : Z \rightarrow X \times Y \text{ continua} \iff \pi_X \circ f \text{ y } \pi_Y \circ f \text{ continuas.}$$

- **Funciones armadas coordenada a coordenada.** [TP ej. 3]

$$f, g \text{ continuas} \Rightarrow (f, g) : x \mapsto (f(x), g(x)) \text{ y } f \times g : (x, y) \mapsto (f(x), g(y)) \text{ continuas;}$$

$$x \mapsto (x, y_0) \text{ y } y \mapsto (x_0, y) \text{ continuas (copias de los factores dentro del producto).}$$

- **Proyecciones abiertas, no cerradas.** La sombra de un abierto es abierta; la de un cerrado puede no ser cerrada. [TP pp. 3-4; GT Ej. 2.8.16; MS Prop. 5.9, Obs. 5.4]

$$G \in \tau_{X \times Y} \Rightarrow \pi_X(G) \in \tau_X; \quad F = \{y = \frac{1}{x}, x > 0\} \text{ cerrado, } \pi_X(F) = (0, +\infty) \text{ no cerrado.}$$

- **Clausura e interior de un producto.** Se calculan coordenada a coordenada. [TP ej. 1; MS Prop. 5.11]

$$\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}; \quad \text{int}(A \times B) = \text{int } A \times \text{int } B.$$

- **Hausdorff por Hausdorff.** [TP ej. 2; MS Prop. 5.12]

$$X, Y \text{ son } T_2 \Rightarrow X \times Y \text{ es } T_2 \quad (\text{separar con tubos } U_1 \times Y, U_2 \times Y).$$

- $\mathbb{R}^n$ y los productos métricos. [TP p. 2; MS Ejemplos 5.3] (se enuncia, no se demuestra)

$$(\mathbb{R}^n, \tau_u) = (\mathbb{R}, \tau_u) \times \cdots \times (\mathbb{R}, \tau_u); \quad \tau_{d_{\max}} = \tau_{d_{\text{sum}}} = \tau_{d_e} = \tau_{X \times Y} \text{ sobre } (X, d) \times (Y, \rho).$$

C.2 Conexidad

- **Disconexo, conexo.** Disconexo es partirse en dos abiertos no vacíos disjuntos; conexo es no poder hacerlo. Un subconjunto es conexo si lo es como subespacio. [GT 4.4.1]

$$X \text{ disconexo} \iff \exists U, V \in \tau : U, V \neq \emptyset \wedge U \cap V = \emptyset \wedge U \cup V = X; \quad A \text{ conexo} \iff (A, \tau_A) \text{ conexo.}$$

- **Desconexión con abiertos del espacio grande.** G y H pueden cortarse, pero no sobre A . [clase 10, Obs. 2.3]

$$A \text{ no conexo} \iff \exists G, H \in \tau : G \cap A \neq \emptyset \wedge H \cap A \neq \emptyset \wedge G \cap H \cap A = \emptyset \wedge A \subseteq G \cup H.$$

- **Ejemplos.** Discreto con dos puntos o más: disconexo; indiscreto: todo conexo; $\mathbb{R} - \{0\}$: disconexo. [GT Ej. 4.4.3, Prop. 4.5.4]

$$(X, \tau_{dis}) : A \text{ conexo} \iff |A| \leq 1; \quad (X, \tau_{ind}) : \text{todo } A \text{ conexo}; \quad \mathbb{R} - \{0\} = (-\infty, 0) \dot{\cup} (0, +\infty).$$

- **Conexo $\iff$ sin abiertos-cerrados propios.** Equivalentemente, sin subconjuntos propios de frontera vacía. [GT 4.4.2]

$$X \text{ conexo} \iff (U \in \tau \wedge U \text{ cerrado} \Rightarrow U \in \{\emptyset, X\}) \iff (\text{fr } U = \emptyset \Rightarrow U \in \{\emptyset, X\}).$$

- **Un conexo queda de un lado de un abierto-cerrado.** [MS Prop. 7.4]

$$C \text{ conexo} \wedge A \text{ abierto y cerrado} \Rightarrow C \subseteq A \vee C \subseteq X - A.$$

- **Imagen continua de un conexo.** La continuidad tira desconexiones para atrás, así que conserva la conexidad hacia adelante. [GT 4.4.7]

$$f \text{ continua} \wedge A \text{ conexo} \Rightarrow f(A) \text{ conexo}; \quad X \cong Y \Rightarrow (X \text{ conexo} \iff Y \text{ conexo}).$$

- **Menos abiertos, más conexo.** [MS Lema 7.2]

$$(X, \tau_1) \text{ conexo} \wedge \tau_2 \subseteq \tau_1 \Rightarrow (X, \tau_2) \text{ conexo.}$$

- **Espacio discreto.** [GT 4.5.2]

$$(X, \tau) \text{ discreto} \iff \forall x : \{x\} \in \tau \iff \tau = \mathcal{P}(X).$$

- **Conexo** $\iff$ **toda continua a un discreto es constante.** [GT 4.5.5]

$$X \text{ conexo} \iff \forall f : X \rightarrow (Y, \tau_{dis}) \text{ continua} : f \text{ constante} \iff \forall f : X \rightarrow (\{0, 1\}, \tau_{dis}) \text{ continua} : f \text{ constante}$$

- **Dos puntos en un conexo.** La herramienta principal para probar que algo *es* conexo. [GT 4.5.6]

$$X \text{ conexo} \iff \forall a, b \in X \exists C \text{ conexo} : a, b \in C; \quad B \text{ conexo} \iff \forall a, b \in B \exists C \text{ conexo} : a, b \in C \subseteq B.$$

- **Unión de dos conexos que se cortan.** [GT 4.5.7]

$$A, B \text{ conexos} \wedge A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B \text{ conexo.}$$

- **Uniones de familias.** Uno que corta a todos, dos a dos, o en cadena. [GT 4.5.7–4.5.9; guía de conexidad, ejs. 5–7]

$$\left(\exists \alpha_0 \forall \alpha : C_\alpha \cap C_{\alpha_0} \neq \emptyset \right) \vee \left(\forall \alpha, \beta : C_\alpha \cap C_\beta \neq \emptyset \right) \vee \left(\forall n : C_n \cap C_{n+1} \neq \emptyset \right) \Rightarrow \bigcup C_\alpha \text{ conexo.}$$

- **Intersección, frontera e interior: no.** [clase 10, Obs. 7.3 y 7.6]

$$S^1 \cap \{y = 0\} = \{(\pm 1, 0)\} \text{ no conexo}; \quad \text{fr}[1, 2] = \{1, 2\}; \quad \text{int}(B[(-1, 0), 1] \cup B[(1, 0), 1]) \text{ no conexo.}$$

- **Sándwich.** Lo que está entre un conexo y su clausura es conexo. [GT 4.4.8]

$$A \text{ conexo} \wedge A \subseteq B \subseteq \overline{A} \Rightarrow B \text{ conexo}; \quad A \text{ conexo} \Rightarrow \overline{A} \text{ conexo.}$$

- **Basta tocar la clausura.** [CX 1 y 2]

$$A, B \text{ conexos} \wedge \overline{A} \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B \text{ conexo}; \quad A \text{ conexo y denso} \wedge A \subseteq B \Rightarrow B \text{ conexo.}$$

- **Cruzar la frontera.** Un conexo que tiene puntos adentro y afuera de B toca el borde de B . [CX 14]

$$A \text{ conexo} \wedge A \cap B \neq \emptyset \wedge A \cap (X - B) \neq \emptyset \Rightarrow A \cap \text{fr } B \neq \emptyset.$$

- **Gráfico de una continua.** [CX 8]

$$X \text{ conexo} \wedge f : X \rightarrow Y \text{ continua} \Rightarrow \{(x, f(x))\} \text{ conexo en } X \times Y.$$

- **Totalmente desconexo.** Cualquier par de puntos se separa con una desconexión. [CX 11–13]

$$\forall x \neq y \exists U, V \in \tau : x \in U, y \in V, U \cap V = \emptyset, U \cup V = X \Rightarrow T_2 \wedge \text{conexos} = \text{puntos}; \quad \text{ej.: } \mathbb{Q}, \text{ Sorgenfrey.}$$

- **Peine del topólogo.** Conexo por sándwich. [Peine-del-Topologo.pdf]

$$E = (K \times [0, 1]) \cup ([0, 1] \times \{0\}) \text{ conexo}; \quad E \subseteq R \subseteq P = \overline{E} \Rightarrow R, P \text{ conexos.}$$

- **Producto de conexos.** Se unen dos puntos con una “cruz” formada por una copia de cada factor. [clase 10, Prop. 8.1; MS Teo. 7.12]

$$X, Y \text{ conexos} \iff X \times Y \text{ conexo} \quad (X \times Y \neq \emptyset); \quad C = (X \times \{y_1\}) \cup (\{x_2\} \times Y).$$

- **Producto menos un rectángulo propio.** [Producto-de-Conexos.pdf]

$$X, Y \text{ conexos} \wedge A \subsetneq X \wedge B \subsetneq Y \Rightarrow (X \times Y) - (A \times B) \text{ conexo.}$$

C.3 Intervalos de $\mathbb{R}$ y Bolzano (clase 11)

- **Intervalo.** Contiene a todo lo que está entre dos de sus puntos. [clase 11]

$$I \text{ intervalo} \iff \forall a, b \in I \forall c (a < c < b \Rightarrow c \in I).$$

- **Intervalo $\iff$ conexo.** Si falta un punto c , los rayos $(-\infty, c)$ y (c, ∞) desconectan; si hay una desconexión, el supremo de $\{x \in U \cap I : x_1 \leq x \leq x_2\}$ marca un agujero. [clase 11; GT 2.7.6]

$$I \subseteq (\mathbb{R}, \tau_u) : I \text{ conexo} \iff I \text{ intervalo}; \quad s = \sup\{x \in U \cap I : x_1 \leq x \leq x_2\}.$$

- **$[a, b]$ es conexo.** Se avanza desde a hasta el supremo de lo que queda dentro del abierto-cerrado C : cerrado da que el supremo está en C , abierto que se puede seguir; sólo cierra si se llega a b . [GT 2.7.6]

$$C \subseteq [a, b] \text{ abierto y cerrado, } a \in C, s = \sup\{t : [a, t] \subseteq C\} \Rightarrow s \in C \wedge s = b \Rightarrow C = [a, b].$$

- **Bolzano y valor intermedio clásicos.** La imagen continua de un intervalo es un intervalo. [GT 2.8.3 (Consecuencia), 4.4.4]

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} \wedge f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0;$$

$$J \text{ intervalo} \Rightarrow f(J) \text{ intervalo}.$$

- **Conexos de la recta.** [GT 4.4.4 y 2.7.6]

$$A \subseteq (\mathbb{R}, \tau_u) \text{ conexo} \iff \forall a, b \in A (a \leq b \Rightarrow [a, b] \subseteq A) \iff A \text{ es un intervalo}.$$

- **Bolzano.** [GT 4.5.1 = 2.8.3]

$$X \text{ conexo} \iff \forall f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : (\exists x_1, x_2 : f(x_1) < 0 < f(x_2)) \Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = 0.$$

C.4 Conexión por caminos, componentes y puntos de corte (clases 11, 12 y 13)

- **Camino y arcoconexo.** Un camino es una continua desde $[0, 1]$; arcoconexo es poder unir dos puntos cualesquiera con un camino que no sale del conjunto. [GT 4.1.1–4.1.2]

$$X \text{ arcoconexo} \iff \forall x, y \in X \exists \alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continua} : \alpha(0) = x \wedge \alpha(1) = y.$$

- **Segmentos.** Intervalos, normados y convexos son arcoconexos: el segmento es un camino lipschitziano. [GT 4.1.3]

$$\alpha(t) = (1 - t)x + ty, \quad \|\alpha(t) - \alpha(s)\| = |t - s| \|y - x\|.$$

- **Arcoconexo implica conexo.** Una desconexión del espacio tirada para atrás por un camino desconectaría a $[0, 1]$. La recíproca es falsa (peine reducido, escalera, seno del topólogo). [GT 4.1.4; MS Prop. 7.17]

$$X \text{ arcoconexo} \Rightarrow X \text{ conexo}; \quad \text{conexo} \not\Rightarrow \text{arcoconexo}.$$

- **Imagen continua de un arcoconexo.** Se compone el camino con la función. [GT 4.1.6; MS Teo. 7.19]

$$f \text{ continua} \wedge A \text{ arcoconexo} \Rightarrow f(A) \text{ arcoconexo} \quad (\text{camino } f \circ \alpha).$$

- **Convexo $\Rightarrow$ arcoconexo, no al revés.** El segmento sirve en un convexo; en una “L” hay que dar la vuelta. [clase 11]

A convexo $\Rightarrow A$ arcoconexo; anillo, “L”: arcoconexos no convexos.

- **Seno y peine del topólogo.** Conexos (sándwich) y no arcoconexos; el peine completo es arcoconexo pero no localmente arcoconexo. [clase 11]

$$S = \{(x, \sin \frac{1}{x}) : x > 0\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]); \quad C \subseteq S \subseteq \overline{C} \Rightarrow S \text{ conexo}; \quad S \text{ no arcoconexo.}$$

- **Producto de arcoconexos.** Se avanza a la vez por las dos coordenadas. [clase 11; *Producto-de-Conexos.pdf*]

$$X, Y \text{ arcoconexos} \Rightarrow X \times Y \text{ arcoconexo}; \quad \gamma(t) = (\alpha(t), \beta(t)) \text{ continua por coordenadas.}$$

- **Yuxtaposición.** Estar unidos por un camino es de equivalencia; la transitiva pega dos caminos con el lema del pegado (dos cerrados). [GT 4.1.9]

$$\alpha^-(t) = \alpha(1-t); \quad (\alpha * \beta)(t) = \alpha(2t) \quad (t \leq \frac{1}{2}), \quad \beta(2t-1) \quad (t \geq \frac{1}{2}).$$

- **Uniones de arcoconexos.** Mismos tres casos que para conexos: uno que corta a todos, dos a dos, o en cadena. [GT 4.1.10–4.1.12]

$$(\exists \alpha_0 \forall \alpha : C_\alpha \cap C_{\alpha_0} \neq \emptyset) \vee (\forall \alpha, \beta : C_\alpha \cap C_\beta \neq \emptyset) \vee (\forall n : C_n \cap C_{n+1} \neq \emptyset) \Rightarrow \bigcup C_\alpha \text{ arcoconexo.}$$

- **Unión de rectas por el origen.** Todas se cruzan en el origen. [clase 12]

$$\bigcup_{m \in \Lambda} \{(x, mx) : x \in \mathbb{R}\} \text{ arcoconexo}; \quad A, B \text{ arcoconexos} \not\Rightarrow A \cap B \text{ arcoconexo} \quad (S^1 \cap \{y \geq 0\}, S^1 \cap \{y \leq 0\}).$$

- **Componente arcoconexa.** El mayor arcoconexo que contiene a x ; es la clase de x por “estar unidos por un camino”; forman una partición, pero no tienen por qué ser cerradas. [GT 4.2.1–4.2.4, Nota 4.2.9]

$$c(x) = \{y \in X : \exists \text{ camino de } x \text{ a } y\}; \quad c(x) \cap c(y) \neq \emptyset \Rightarrow c(x) = c(y); \quad c(x) \subseteq C(x).$$

- **Contar agujeros.** Un homeomorfismo biyecta componentes arcoconexas: $f(c(x)) = c(f(x))$. [GT 4.2.7; clase 12]

$$\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R} - \{0\} \not\cong \mathbb{R} - \{a, b\} \quad (1, 2 \text{ y } 3 \text{ componentes}).$$

- **Localmente arcoconexo.** Todo entorno contiene un entorno arcoconexo (no basta que exista uno); entonces las componentes arcoconexas son abiertas y cerradas. $\mathbb{R} - \{0\}$: localmente arcoconexo, no arcoconexo. [GT 4.2.5–4.2.6; clase 12]

$$\forall x \forall N \in \mathcal{N}_x \exists N' \in \mathcal{N}_x : N' \subseteq N \wedge N' \text{ arcoconexo} \Rightarrow c(x) \text{ abierta y cerrada.}$$

- **Conexo y localmente arcoconexo implica arcoconexo.** La componente arcoconexa de un punto es abierta, cerrada y no vacía, luego es todo. En particular los abiertos conexos de $\mathbb{R}^n$ son arcoconexos. Ejercicio típico de final (junto con arcoconexo $\Rightarrow$ conexo). [GT 4.4.6; MS Prop. 7.18; clase 12]

$$X \text{ loc. arcoconexo} \Rightarrow (X \text{ conexo} \iff X \text{ arcoconexo}).$$

- **Peine reducido y escalera.** Conexos (sándwich) y no arcoconexos (Bolzano sobre la primera coordenada del camino): no hay sándwich para caminos. [GT Ej. 4.2.8(4), 4.4.5; CX 16]

$$E \subseteq R \subseteq \overline{E}, \quad E \text{ arcoconexo}, \quad R \text{ conexo no arcoconexo}; \quad \overline{H} = X \text{ no arcoconexo.}$$

- **Punto de corte.** x es de corte si al sacarlo el espacio deja de ser arcoconexo; su orden es la cantidad de componentes arcoconexas que quedan. [GT 4.3.1]

$$x \text{ de corte} \iff X - \{x\} \text{ no arcoconexo}; \quad \text{ord}(x) = \# \text{ componentes arcoconexas de } X - \{x\}.$$

- **Invarianza de los puntos de corte.** Un homeomorfismo restringido a $X - \{x\}$ es homeomorfismo sobre $Y - \{f(x)\}$ y conserva las componentes. [GT 4.3.5]

$$f \text{ homeomorfismo} \Rightarrow \text{ord}_X(x) = \text{ord}_Y(f(x)).$$

- **No homeomorfos por puntos de corte.** En $\mathbb{R}$ todo punto es de corte y en $\mathbb{R}^2$ ninguno; $[0, 1]$, $(0, 1]$, $(0, 1)$ tienen 2, 1 y 0 puntos que no son de corte; S^1 no tiene puntos de corte. [GT 4.3.2, 4.3.5; MS §7.5 probl. 13]

$$\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^n \ (n \geq 2); \quad [0, 1] \not\cong (0, 1] \not\cong (0, 1) \cong \mathbb{R}; \quad [0, 1] \not\cong \mathbb{R}^2; \quad S^1 \not\cong \text{intervalo}.$$

- **Componente conexa.** El mayor conexo que contiene a x ; forman una partición y son siempre cerradas (sándwich). [GT 4.6.1–4.6.5; MS Lema 7.13, Teo. 7.14]

$$C(x) = \bigcup \{A \text{ conexo} : x \in A\}; \quad C(x) = \overline{C(x)}; \quad C(x) \cap C(y) \neq \emptyset \Rightarrow C(x) = C(y).$$

- **Conexos, abiertos-cerrados y componentes.** Un conexo queda dentro de una componente; un abierto-cerrado es unión de componentes (conexas y arcoconexas). [MS Prop. 7.16; CX 17]

$$A \text{ conexo} \Rightarrow A \subseteq C \vee A \cap C = \emptyset; \quad A \text{ abierto y cerrado} \Rightarrow A = \bigcup_{a \in A} c(a) = \bigcup_{a \in A} C(a).$$

- **Componentes e imagen continua.** La imagen de una componente cae en una componente; la preimagen de una componente es unión de componentes; un homeomorfismo biyecta componentes homeomorfas. Para probar que dos espacios no son homeomorfos: primero contar componentes, después puntos de corte. [GT 4.6.10; CX 19, 20; clase 13]

$$f(C(x)) \subseteq C(f(x)); \quad f^{-1}(E) = \bigcup_{x \in f^{-1}(E)} C(x); \quad f \text{ homeo} \Rightarrow f(C(x)) = C(f(x)).$$

- **Localmente conexo.** Todo entorno contiene un entorno conexo; entonces las componentes son abiertas. También lo son si hay finitas. [GT 4.6.7–4.6.8; CX 23]

$$X \text{ loc. conexo} \Rightarrow C(x) \in \tau; \quad \#\{\text{componentes}\} < \infty \Rightarrow C(x) \in \tau.$$

- **Conexo no localmente conexo.** Rectas verticales en $x = 1/n$ más los ejes: arcoconexo, pero cerca de $(0, y_0)$, $y_0 \neq 0$, ningún entorno chico es conexo. [GT Ej. 4.2.8(3), 4.6.9(4); CX 15]

$$X = OX \cup OY \cup \bigcup_n \{\frac{1}{n}\} \times \mathbb{R} \text{ arcoconexo, no loc. conexo.}$$

C.5 Compacidad (desde la clase 13)

- **Compacto.** De todo recubrimiento por abiertos se extrae uno finito (con los mismos abiertos, sin inventar nuevos); no depende del espacio ambiente. [GT 3.1.4, 3.1.6; clase 13]

$$A \text{ compacto} \iff \forall \{G_\alpha\} \subseteq \tau \ (A \subseteq \bigcup_\alpha G_\alpha \Rightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n : A \subseteq G_{\alpha_1} \cup \dots \cup G_{\alpha_n});$$

$$A \text{ compacto en } X \iff (A, \tau_A) \text{ compacto.}$$

- **No compacto.** Basta exhibir *un* recubrimiento por abiertos sin subrecubrimiento finito; que exista un recubrimiento finito no prueba nada. [clase 13]

$$A \text{ no compacto} \iff \exists \{G_\alpha\} \subseteq \tau : A \subseteq \bigcup_\alpha G_\alpha \wedge \text{ninguna subfamilia finita cubre } A.$$

- **Ejemplos de referencia.** Finitos y uniones finitas: sí; discreta: sólo finitos; cofinita e indiscreta: todo; $\mathbb{R}^n$ y (a, b) : no. [GT 3.1.7–3.1.11; clase 13]

$$\mathbb{R}^n = \bigcup_k B(0, k); \quad (a, b) = \bigcup_n (a, b - \frac{1}{n}); \quad (X, \tau_{dis}) : A \text{ compacto} \iff A \text{ finito}.$$

- **$[a, b]$ es compacto.** Por supremo: el mayor x tal que $[a, x]$ se cubre con finitos es b . [GT 3.1.12]

$$S = \{x \in [a, b] : [a, x] \text{ se cubre con finitos } G_\alpha\}, \quad \sup S \in S \wedge \sup S = b.$$

- **Compacto en métrico es acotado.** Bolas concéntricas de centro x_0 : finitas son la mayor. Al revés: no acotado $\Rightarrow$ no compacto ($[0, +\infty)$). [GT 3.1.13; clase 13]

$$C \text{ compacto en } (X, d) \Rightarrow \delta(C) < \infty \quad (C \subseteq B(x_0, n_0)).$$

- **Compacidad por cerrados (PIF).** [GT 3.2.2]

$$X \text{ compacto} \iff \forall \{F_\alpha\} \text{ cerrados} : (\forall \alpha_1, \dots, \alpha_n : F_{\alpha_1} \cap \dots \cap F_{\alpha_n} \neq \emptyset) \Rightarrow \bigcap_\alpha F_\alpha \neq \emptyset.$$

- **Cerrado en compacto es compacto.** Se agrega el abierto $X - F$ al recubrimiento. [GT 3.2.3]

$$X \text{ compacto} \wedge F \text{ cerrado} \Rightarrow F \text{ compacto}; \quad K \text{ compacto} \wedge F \text{ cerrado} \Rightarrow F \cap K \text{ compacto}.$$

- **Separar punto y compacto en un Hausdorff.** Del lado del compacto se une, del lado del punto se interseca (finitos). [GT 3.3.1]

$$X \text{ } T_2 \wedge F \text{ compacto} \wedge x \notin F \Rightarrow \exists U, V \in \tau : x \in U, F \subseteq V, U \cap V = \emptyset.$$

- **Compacto en Hausdorff es cerrado.** Falla sin T_2 (indiscreta, cofinita). [GT 3.3.3]

$$X \text{ } T_2 \wedge F \text{ compacto} \Rightarrow F \text{ cerrado}; \quad X \text{ compacto y } T_2 \Rightarrow (A \text{ compacto} \iff A \text{ cerrado}).$$

- **Separar dos compactos en un Hausdorff.** [GT 3.3.4]

$$X \text{ } T_2 \wedge F_1, F_2 \text{ compactos} \wedge F_1 \cap F_2 = \emptyset \Rightarrow \exists U, V \in \tau : F_1 \subseteq U, F_2 \subseteq V, U \cap V = \emptyset.$$

- **Imagen continua de un compacto.** Las preimágenes de un recubrimiento recubren abajo. [GT 3.4.1]

$$f \text{ continua} \wedge A \text{ compacto} \Rightarrow f(A) \text{ compacto}; \quad X \cong Y \Rightarrow (X \text{ compacto} \iff Y \text{ compacto}).$$

- **Weierstrass.** Una continua a $\mathbb{R}$ alcanza máximo y mínimo en un compacto no vacío. [GT 3.4.2]

$$f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} \wedge A \neq \emptyset \text{ compacto} \Rightarrow \exists a_1, a_2 \in A \forall a \in A : f(a_1) \leq f(a) \leq f(a_2).$$

- **De compacto a Hausdorff: cerrada, y biyectiva $\Rightarrow$ homeomorfismo.** [GT 3.4.3–3.4.5]

$$f \text{ continua, } X \text{ compacto, } Y \text{ } T_2 \Rightarrow f \text{ cerrada}; \quad \text{si además } f \text{ biyectiva} \Rightarrow f \text{ homeomorfismo}.$$

- **Encajados de Cantor.** [GT 3.4.8]

$$F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots \text{ cerrados no vacíos } \wedge F_1 \text{ compacto} \Rightarrow \bigcap_n F_n \neq \emptyset.$$

- **Lema del tubo.** Un abierto que contiene una fibra compacta contiene un tubo entero alrededor. [GT Nota 3.5.5; MS Teo. 6.6]

$$Y \text{ compacto } \wedge \{x_0\} \times Y \subseteq W \in \tau_{X \times Y} \Rightarrow \exists U \in \tau_X : x_0 \in U \wedge U \times Y \subseteq W.$$

- **Tychonoff finito.** [GT 3.5.1, Nota 3.5.5; MS Teo. 6.6]

$$X, Y \text{ compactos} \iff X \times Y \text{ compacto } (X \times Y \neq \emptyset);$$

$$X \text{ compacto} \Rightarrow \pi_Y : X \times Y \rightarrow Y \text{ cerrada.}$$

- **Heine–Borel.** En $\mathbb{R}^n$ (no en cualquier métrico) compacto es cerrado y acotado. [GT 3.3.6, 3.5.3]

$$A \subseteq (\mathbb{R}^n, \tau_u) : A \text{ compacto} \iff A \text{ cerrado } \wedge A \text{ acotado};$$

$$(\mathbb{N}, d_D) \text{ cerrado, acotado, no compacto.}$$

- **Bolzano–Weierstrass.** En métricos, compacto es lo mismo que secuencialmente compacto. [GT 3.6.2–3.6.3]

$$(X, d) \text{ compacto} \iff \forall \{x_n\} \subseteq X \exists n_1 < n_2 < \cdots \exists x_0 \in X : x_{n_k} \rightarrow x_0.$$

- **Totalmente acotado.** Secuencialmente compacto $\Rightarrow$ finitas ε -bolas cubren. [GT 3.6.4]

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_1, \dots, x_n : X = B(x_1, \varepsilon) \cup \cdots \cup B(x_n, \varepsilon).$$

- **Número de Lebesgue.** Todo recubrimiento abierto de un compacto métrico tiene un grosor mínimo. [GT 3.6.5–3.6.6]

$$\exists \varepsilon > 0 \forall x \exists \alpha : B(x, \varepsilon) \subseteq U_\alpha; \quad \delta(A) < \varepsilon \Rightarrow \exists \alpha : A \subseteq U_\alpha.$$

- **Heine.** Continua en compacto métrico es uniformemente continua. [GT 3.6.8]

$$(X, d) \text{ compacto } \wedge f \text{ continua} \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \mu > 0 \forall x, x' : d(x, x') < \mu \Rightarrow \rho(f(x), f(x')) < \varepsilon.$$

- **Cerrado y acotado no compacto.** Rampas en $C([0, 1], [0, 1])$ con d_∞ . [GT 3.6.9]

$$f_n(x) = \varepsilon \max\{0, 1 - (n+1)x\} \in B[\theta, \varepsilon], \quad d_\infty(f_n, \theta) = \varepsilon, \quad \text{sin subsucesiones convergentes.}$$

- **Cauchy, completo; compacto $\Rightarrow$ completo.** [GT 3.7.1–3.7.6]

$$(X, d) \text{ compacto} \Rightarrow \text{completo}; \quad \mathbb{R}^n \text{ completo};$$

$$\mathbb{R} \text{ completo no compacto}; \quad (0, 1) \cong \mathbb{R} \text{ no completo.}$$

- **Localmente compacto.** Entornos compactos arbitrariamente chicos; en métricos, alguna bola cerrada compacta en cada punto. [GT 3.8.1–3.8.6]

$$\forall x \forall N \in \mathcal{N}_x \exists N' \in \mathcal{N}_x : N' \subseteq N \wedge N' \text{ compacto}; \quad \mathbb{R}^n, (0, 1), \text{ discretos: sí; } \mathbb{Q} : \text{no.}$$

Apéndice D: glosario de notación

Símbolos usados en este apunte, con su lectura y el lugar donde aparecen definidos. Cuando dos textos usan notaciones distintas se indican las dos.

Símbolo	Lectura y significado
Conjuntos y lógica	
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	Naturales, enteros, racionales, reales. $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$: irracionales.
$\mathbb{R}^n$	Espacio real n -dimensional. $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$: recta real extendida.
$\mathcal{P}(X)$	Partes de X : la familia de <i>todos</i> los subconjuntos de X .
$X - A$	Complemento de A en X . Otros textos escriben $X \setminus A$ o A^c .
$A \subseteq B, A \subsetneq B$	Contenido; contenido y distinto (inclusión estricta).
$A \dot{\cup} B$	Unión disjunta: la unión, con el dato adicional de que $A \cap B = \emptyset$.
$\forall, \exists, \neg$	Para todo; existe; negación.
$\wedge, \vee$	Conjunción (“y”); disyunción (“o”, inclusivo).
$\Rightarrow, \Leftrightarrow$	Implica; si y sólo si. En el texto también “sii”.
$:=$	Igualdad por definición (se define el lado izquierdo).
$\inf S$	Ínfimo de $S \subseteq \mathbb{R}$: la mayor de sus cotas inferiores. Dos propiedades, que son las que se usan: (i) $\inf S \leq s$ para todo $s \in S$; (ii) para todo $\varepsilon > 0$ existe $s \in S$ con $s < \inf S + \varepsilon$. <i>Puede no pertenecer a S</i> : si pertenece se llama mínimo.
$\sup S$	Supremo: la menor de las cotas superiores, con las propiedades simétricas. Si pertenece a S es el máximo.
Espacios métricos y normados	
(X, d)	Espacio métrico: conjunto X con distancia d . Otras letras usadas: ρ, d' .
$d_e, d_{\text{taxi}}, d_{\max}$	Distancias euclídea, del taxi (o de la suma) y del máximo en $\mathbb{R}^n$.
d_D	Distancia discreta: vale 1 entre puntos distintos y 0 en la diagonal.
$d_{\text{sum}}, d_{\max}^2$	Distancias sobre el producto $X \times X$ (suma y máximo de las coordenadas).
$d _A$	Restricción de d a $A \times A$: la métrica heredada por un subconjunto.
$\ v\ $	Norma de v . $\ \cdot\ _{\text{taxi}}, \ \cdot\ _{\max}$: normas asociadas a esas distancias.
(u, v)	Producto interno de u y v . Otros textos: $\langle u, v \rangle$ o $u \cdot v$.
$B(x, r)$	Bola <i>abierta</i> de centro x y radio r : $\{y : d(x, y) < r\}$.
$B[x, r]$	Bola <i>cerrada</i> : $\{y : d(x, y) \leq r\}$. Notar corchetes vs. paréntesis.
$d(x, A)$	Distancia de un punto a un conjunto: $\inf\{d(x, a) : a \in A\}$.
$d(A, B)$	Distancia entre conjuntos: $\inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$.
$\delta(A)$	Diámetro de A : $\sup\{d(a, b) : a, b \in A\}$. A acotado $\Leftrightarrow \delta(A) < \infty$.
$\ \cdot\ _\infty, d_\infty$	Norma y distancia del supremo: $\ f\ _\infty = \sup_x f(x) $, $d_\infty(f, g) = \sup_x f(x) - g(x) $ (GT 1.1.11).
$\ \cdot\ _1, d_1$	Norma y distancia integrales en $C[0, 1]$: $\ f\ _1 = \int_0^1 f $, $d_1(f, g) = \int_0^1 f - g $ (GT 1.1.13).
d_{meta}	Seudodistancia $ f(1) - g(1) $ en $C[0, 1]$ (GT 1.1.15).
$\ \cdot\ _e$	Norma euclídea de $\mathbb{R}^n$, $(\sum_i x_i^2)^{1/2}$; su distancia es d_e .
Espacios topológicos	
(X, τ)	Espacio topológico. Otras letras para topologías: $\tau', \tau^*, \mathcal{T}$.

Símbolo	Lectura y significado
τ_u, τ_e	Topología usual o euclídea de $\mathbb{R}$ o $\mathbb{R}^n$ (en GT aparece como “euclídea”).
τ_d	Topología inducida por la distancia d (la que tiene por base a las bolas).
τ_{dis}, τ_{ind}	Discreta ($= \mathcal{P}(X)$) e indiscreta ($= \{\emptyset, X\}$).
τ_{cof}, τ_{conum}	Cofinita (o de Zariski) y conumerable.
τ_{x_0}	Topología del punto excluido x_0 .
τ_K	K -topología de $\mathbb{R}$, generada por los (a, b) y los $(a, b) - K$ con $K = \{1/n\}$.
τ_A	Topología de subespacio (o relativa) sobre $A \subseteq X$: $\{U \cap A : U \in \tau\}$.
τ_β	Topología generada por la base β .
β, σ	Base y subbase de una topología.
$\tau \subseteq \tau'$	τ' es <i>más fina</i> que τ (tiene al menos los mismos abiertos).
$\mathcal{N}_x, \mathcal{B}_x$	Sistema de entornos de x ; base local (base de entornos) en x .

Operadores sobre conjuntos

$\text{int } A$	Interior de A : el mayor abierto contenido en A .
A°	Lo mismo que $\text{int } A$. Es la notación de GT , de MS y la que usan los enunciados de parcial; en este apunte se escribe $\text{int } A$.
$\overline{A}$	Clausura o adherencia de A : el menor cerrado que contiene a A .
A'	Conjunto derivado: los puntos de acumulación de A .
$\text{fr } A$	Frontera de A : $\overline{A} \cap \overline{X - A} = \overline{A} - \text{int } A$.
∂A	Lo mismo que $\text{fr } A$. Notación habitual en los enunciados de parcial.
$\text{ext } A$	Exterior de A : $\text{int}(X - A)$.
$i(A), c(A)$	Operadores de Kuratowski: $i(A) = \text{int}(\overline{A}) = (\overline{A})^\circ$ y $c(A) = \overline{\text{int } A} = \overline{A}^\circ$. En general son distintos e incomparables.
$\overline{B}^A$	Clausura de B <i>relativa</i> al subespacio A (frente a $\overline{B}^X$, en todo X).

Funciones

$f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$	Función entre espacios, con las topologías explicitadas.
$f^{-1}(B)$	<i>Preimagen</i> de B : $\{x \in X : f(x) \in B\}$. Siempre significa preimagen, incluso si f no es biyectiva.
f^{-1}	Función <i>inversa</i> , sólo cuando se dijo que f es biyectiva (homeomorfismos).
$f(A)$	Imagen directa: $\{f(a) : a \in A\}$.
$g \circ f$	Composición: primero f , después g .
$f _A$	Restricción de f al subespacio A del dominio.
$f _A^A$	Correstricción: la misma función vista con codominio A (requiere $f(X) \subseteq A$).
$\tilde{f}$	Correstricción a la imagen: $\tilde{f} : X \rightarrow f(X)$.
$1_X, \text{id}$	Identidad de X . En GT aparece como id .
$i : A \rightarrow X$	Inclusión de un subconjunto: $i(a) = a$.
p_i	Proyección i -ésima $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
χ_A	Función característica de A : vale 1 en A y 0 fuera.
$X \cong Y$	X e Y son homeomorfos (existe una equivalencia topológica entre ellos).
Γ_f	Gráfica de f : $\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$, con la topología relativa (GT 2.8.18).

Símbolo	Lectura y significado
$\varphi_f, \tilde{\varphi}_f$	$\varphi_f(x) = (x, f(x))$ y su correstricción a Γ_f ; si f es continua, φ_f es una inmersión.
inmersión	Continua e inyectiva, y homeomorfismo sobre su imagen (GT 2.8.19). Otros textos: embebimiento, encaje.
Sucesiones y separación	
$\{x_n\}_{n \geq 1}$	Sucesión de puntos de X .
$x_n \rightarrow x_0$	Converge a x_0 : toda cola entra en cualquier abierto que contenga a x_0 .
T_0, T_1, T_2	Axiomas de separación; T_2 es lo mismo que Hausdorff.
Productos y conexidad	
$X \times Y$	Producto cartesiano: pares (x, y) . Como espacio, lleva la topología producto.
$\tau_{X \times Y}, \tau_{prod}$	Topología producto. En MS : $\tau_X \times \tau_Y$ o τ_{Tyc} (de Tychonov).
$\beta_{X \times Y}$	Base de rectángulos abiertos $U \times V$, con $U \in \tau_X, V \in \tau_Y$.
π_X, π_Y	Proyecciones $\pi_X(x, y) = x, \pi_Y(x, y) = y$. En TP : Π_X, Π_Y ; en MS : p_X, p_Y ; en GT ($\mathbb{R}^n$): p_i .
$U \times Y, X \times V$	Tubos: $\pi_X^{-1}(U)$ y $\pi_Y^{-1}(V)$.
(f, g)	Función a un producto armada por coordenadas: $x \mapsto (f(x), g(x))$.
$f \times g$	Producto de funciones: $(x, y) \mapsto (f(x), g(y))$.
$\{x_0\} \times Y, X \times \{y_0\}$	Copias de Y y de X dentro del producto (“rectas” vertical y horizontal).
(U, V) desconexión	Par de abiertos no vacíos, disjuntos, que cubren el espacio. MS : separación.
$\delta_2^{\max}$	En GT : distancia del máximo sobre un producto de dos métricos ($= d_{\max}$ de este apunte).
S^1	Circunferencia unidad $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$.
Caminos y componentes	
$\alpha : [0, 1] \rightarrow X$	Camino: función continua desde $[0, 1]$ usual; va de $\alpha(0)$ (origen) a $\alpha(1)$ (extremo).
arcoconexo	En CX : conexo por caminos (GT, MS). No se pide que el camino sea inyectivo.
α^-	Camino inverso: $\alpha^-(t) = \alpha(1 - t)$, recorre α al revés.
$\alpha * \beta$	Yuxtaposición: primero α y después β , cada uno en la mitad del tiempo; requiere $\alpha(1) = \beta(0)$.
$x \sim y$	x e y se unen por un camino en X (relación de equivalencia).
$c(x)$	Componente arcoconexa (conexa por caminos) de x : la clase de x por $\sim$. Notación de MS ; GT escribe C_x .
$\pi_0(X)$	En MS : el conjunto de las componentes arcoconexas de X .
$C(x)$	Componente conexa de x : el mayor conexo que contiene a x . Notación de MS ; GT escribe también C_x .
$\text{ord}(x)$	Orden de corte de x : cantidad de componentes arcoconexas de $X - \{x\}$ (notación de este apunte).
OX, OY	En GT : los ejes coordenados de $\mathbb{R}^2$.
Compacidad	
$\{G_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$	Recubrimiento (MS : cubrimiento) de A : familia cuya unión contiene a A . “Por abiertos” si cada G_α es abierto.

Símbolo	Lectura y significado
$\{G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_n}\}$	Subrecubrimiento finito: finitos miembros del recubrimiento que todavía cubren.
PIF	Propiedad de intersección finita: toda subfamilia finita tiene intersección no vacía.
$\{x_{n_k}\}_{k \geq 1}$	Subsucesión de $\{x_n\}$: índices $n_1 < n_2 < \dots$ estrictamente crecientes.
$U \times Y$ (tubo)	En el lema del tubo: abierto de la forma $\pi_X^{-1}(U)$ que contiene a la fibra $\{x_0\} \times Y$.
ε de Lebesgue	Número de Lebesgue de un recubrimiento abierto: toda bola de radio ε cae entera en algún miembro.
d_∞	Distancia del supremo entre funciones: $d_\infty(f, g) = \sup_x f(x) - g(x) $ ($= \max$ si son continuas en $[0, 1]$).
θ	Función idénticamente nula (el “origen” de un espacio de funciones).
$C([0, 1], [0, 1])$	Funciones continuas de $[0, 1]$ en $[0, 1]$; con d_∞ es el ejemplo de cerrado y acotado no compacto.
Espacios de funciones que aparecen en los ejercicios	
$C[a, b]$	Funciones continuas de $[a, b]$ en $\mathbb{R}$.
$\mathcal{R}[0, 1]$	Funciones Riemann-integrables en $[0, 1]$.
$\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$	Matrices reales $n \times n$; A^t es la traspuesta.
$\ell^\infty(\mathbb{R})$	Funciones acotadas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, con la norma del supremo (en GT, “ V ”).
θ	Función nula, $\theta(x) = 0$: el origen de los espacios de funciones (notación de GT).
$\mathcal{C}$	Conjunto de Cantor, $\bigcap_n A_n \subseteq [0, 1]$ (GT 2.6.6(c)).

Intuición. Los dos choques de notación que más se pagan en un parcial: (1) f^{-1} delante de un conjunto es *preimagen* y existe siempre, mientras que f^{-1} como función sólo existe si f es biyectiva — en la demostración de que un homeomorfismo es abierto conviven los dos sentidos, escritos $(f^{-1})^{-1}(G)$; (2) los paréntesis y corchetes de $B(x, r)$ y $B[x, r]$, que se distinguen sólo por el tipo de delimitador.

Apéndice E: catálogo de topologías de referencia

Todas las topologías que aparecen en el apunte y en las guías, con su definición, sus cerrados y dónde se usan. Varias figuran en los ejercicios sólo por su nombre: acá está la definición que el ejercicio da por sabida.

E.1 Las cuatro básicas

- **Discreta** $\tau_{dis} = \mathcal{P}(X)$ [MS Ejemplos 2.1, p. 23]. Todo subconjunto es abierto, y también cerrado. Es la más fina de todas. Proviene de la métrica discreta d_D . Todo punto es aislado; las únicas sucesiones convergentes son las finalmente constantes.
- **Indiscreta** (o grosera) $\tau_{ind} = \{\emptyset, X\}$ [MS Ejemplos 2.1, p. 23]. La menos fina de todas. Cerrados: $\emptyset$ y X . No es T_0 si X tiene más de un punto, luego no es metrizable, y toda sucesión converge a todos los puntos.
- **Usual o euclídea** τ_u (también τ_e) sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{R}^n$: la inducida por la distancia euclídea, con base los intervalos abiertos (resp. las bolas abiertas). Es la topología por defecto cada vez que un ejercicio no aclara cuál usa.
- **Métrica** τ_d [MS Teo. 2.14, p. 32]: la generada por la base de bolas $\{B(x, r)\}$ de una distancia d . Un espacio es *metrizable* si su topología es de esta forma para alguna d .

E.2 Definidas por el tamaño del complemento

- **Cofinita o de Zariski** $\tau_{cof} = \{\emptyset\} \cup \{A : X - A \text{ finito}\}$ [GT 2.1.4, p. 19; EJ Continuidad-A.5]. Cerrados: X y los conjuntos finitos. Si X es infinito es T_1 pero no T_2 (dos abiertos no vacíos siempre se cortan) y no es metrizable. Sobre un X finito coincide con la discreta.
- **Conumerable** $\tau_{conum} = \{\emptyset\} \cup \{A : X - A \text{ numerable}\}$ [EJ Continuidad-A.6, p. 12; MS p. 23]. Cerrados: X y los conjuntos numerables. Mismo mecanismo que la cofinita cambiando “finito” por “numerable”; sobre $\mathbb{R}$, dos abiertos no vacíos siempre se cortan, y por eso toda función continua a $(\mathbb{R}, \tau_u)$ es constante.

E.3 Definidas por un punto distinguido

Las tres aparecen en la guía de espacios topológicos con la definición dada dentro del propio ejercicio; conviene tenerlas juntas porque se confunden entre sí.

- **Punto excluido** $\tau_{x_0} = \{X\} \cup \{A \subseteq X : x_0 \notin A\}$ [EJ Top-A.2, p. 6; MS τ^A , p. 23]. Abiertos: todos los que *evitan* x_0 , más X . Cerrados: $\emptyset$ y todos los que *contienen* x_0 .
- **Punto incluido** $\tau^{x_0} = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X : x_0 \in A\}$. Es la dual de la anterior: abiertos son los que contienen a x_0 , más $\emptyset$. El caso $X = \{a, b\}$ da el **espacio de Sierpiński** $\tau = \{\emptyset, \{a\}, X\}$, ejemplo canónico de T_0 que no es T_1 .
- **Punto añadido** $\tau' = \{\emptyset\} \cup \{\{x_0\} \cup G : G \in \tau\}$ sobre $Y = X \cup \{x_0\}$ con $x_0 \notin X$ [EJ Top-A.6, p. 6]. Se agrega un punto que está en *todos* los abiertos no vacíos. Cerrados: Y y los $C \subseteq X$ con $X - C \in \tau$. El punto x_0 es adherente a todo conjunto no vacío, así que el espacio no es T_0 respecto de x_0 .

E.4 Familias totalmente ordenadas sobre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^2$

El truco común: si la familia de candidatos a abiertos está *totalmente ordenada* por inclusión, uniones e intersecciones arbitrarias vuelven a caer en la familia — salvo por los casos límite, que hay que chequear a mano.

- **Colas a derecha** $\tau = \{\mathbb{R}, \emptyset\} \cup \{(a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}$ [EJ Top-A.3, p. 6; comparar MS τ_{kol} , p. 23]. Cerrados: $\mathbb{R}$, $\emptyset$ y los $(-\infty, a]$. Es T_0 y no T_1 . Ojo con la unión: $\bigcup_i (a_i, \infty) = (\inf a_i, \infty)$, y da $\mathbb{R}$ si el ínfimo es $-\infty$.
- **Semiplanos encajados** $U_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < x - c\}$, con $c \in \mathbb{R}$, más $\mathbb{R}^2$ y $\emptyset$ [EJ Top-A.4, p. 6]. Cerrados: los $\{y \geq x - c\}$, más $\mathbb{R}^2$ y $\emptyset$. Mismo mecanismo que las colas, un piso más arriba.
- **Bolas cerradas concéntricas** $\{\mathbb{R}^2, \emptyset\} \cup \{B[(0, 0), r] : r > 0\}$ [EJ Top-A.5, p. 6]. No es una topología: $\bigcup_{r < 1} B[0, r] = B(0, 1)$ no pertenece a la familia. Está en el catálogo justamente como el caso donde el truco del orden total falla.

E.5 Refinamientos de la usual en $\mathbb{R}$

- **K -topología** τ_K , generada por la base $\{(a, b)\} \cup \{(a, b) - K\}$ con $K = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ [EJ Ej. teórico N° 2.5, p. 10; Munkres §13]. Estrictamente más fina que τ_u : el conjunto $\mathbb{R} - K$ es τ_K -abierto y no τ_u -abierto.
- **Sorgenfrey** (límite inferior) τ_{sor} , generada por $\{[a, b) : a < b\}$ [MS Ejemplos 2.4(7), p. 26]. También estrictamente más fina que τ_u ; cada $[a, b)$ es a la vez abierto y cerrado.

E.6 Construidas a partir de otra

- **Subespacio** (o relativa) $\tau_A = \{U \cap A : U \in \tau\}$ sobre $A \subseteq X$. Cerrados relativos: las trazas $C \cap A$ de los cerrados de X .
- **Producto** $\tau_{X \times Y}$ sobre $X \times Y$, generada por los rectángulos $U \times V$ (§9). Cerrados: entre otros, los $F_1 \times F_2$ con F_i cerrados. $\tau_{dis} \times \tau_{dis} = \tau_{dis}$, $\tau_{ind} \times \tau_{ind} = \tau_{ind}$, $\tau_u \times \tau_u = \tau_u$ en $\mathbb{R}^2$.
- **Generada por una base** τ_β y **generada por una subbase** τ_σ : las del §4. Todas las anteriores pueden describirse así eligiendo la base adecuada.

E.7 Tabla de separación, metrizabilidad y conexidad

Topología	T_1	T_2	Conexa	Comentario
Discreta ($ X \geq 2$)	sí	sí	no	métrica (d_D); conexos: los puntos
Indiscreta ($ X \geq 2$)	no	no	sí	ni siquiera T_0 ; todo es conexo
Usual en $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$	sí	sí	sí	conexos de $\mathbb{R}$: los intervalos
Cofinita (X infinito)	sí	no	sí	no metrizable
Conumerable ($X = \mathbb{R}$)	sí	no	sí	no metrizable
Punto excluido	no	no	sí	T_0 ; el único abierto con x_0 es X
Punto incluido / Sierpiński	no	no	sí	T_0 ; todo abierto no vacío tiene a x_0
Colas a derecha	no	no	sí	T_0 ; dos abiertos no vacíos se cortan
K -topología	sí	sí	sí	más fina que la usual
Sorgenfrey	sí	sí	no	$[a, b)$ es abierto y cerrado