

## Şeffaf Plak Çalışma Sistemi

Analize başlamak için gerekenler;

- > 3D tarama veya geleneksel ölçü sistemi ile ölçünün ve kapanışının alınması
- > Hastanan profil, cephe ve ağız içi fotoğraflarının alınması
- > Panoramik röntgenin alınması
- > Ağız içi diastemelerin ölçülmesi
- > Hareket istenmeyen dişlerin kron, köprü veya ankiloz olan dişlerin belirtilmesi

### ŞEFFAF PLAK ÜCRETLENDİRME

ÜRÜN	3D TARAMA + ESSIX PLAK	DURAN+	CA PRO+	DURASOFT	1 MM YUMUŞAK / SERT GECE PLAĞI	2 MM YUMUŞAK / SERT GECE PLAĞI	3 MM YUMUŞAK / SERT GECE PLAĞI	İNDİRECT RESTORASYON PLAĞI	BEYAZLATMA PLAĞI	EXTREME SPORCU PLAĞI
TEK ÇENE FİYAT	300 TL	400 TL	450 TL	650 TL	300 TL	350 TL	400 TL	Tek diş 500 TL (Her diş için 300 TL eklenecektir)	400 TL	1500 TL

**Çift çene vakalarda %10 indirim uygulanır. (Duran+ ve Ca Pro+ için geçerlidir.)**

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Fiyatlar 01.01.2024 tarihine kadar geçerlidir.

## Garanti Kapsamı

- > Kontrol plakları, onaylanan tarihten itibaren hesaplanan sürenin iki katıdır.
- > Plak tedavisine başlamadan önce diş taşı, dolgu, kanal vb. tedavilerin bitmiş olması gerekmektedir.
- > Analiz ücreti tek çene için 400 TL'dir. Analiz onaylandıktan sonra bu ücret plakların ücretinden düşecektir
- > Planlama ile ilgili elastik, mini vida vb. uygulamalar hekim tarafından bildirilmelidir.
- > Ankiloz, implant ve hareketi istenmeyen dişler tedaviye başlamadan önce belirtilmelidir.
- > Tedaviye pekiştirici plaklar dahildir. Tedavi bittikten sonra alınan ölçüye pekiştirici uygulanır.

## Tedavi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- > Hastanın plakları günde 20-22 saat kullanımından emin olunması gerekmektedir.
- > En az 2 plakta bir plakların uyumu ağız içinde kontrol edilmelidir.
- > Her kontrol aşamasında dişlerin arasındaki kontaktların kontrol edilmesi, diş ipi geçmeyecek kadar sıkı kontaktların arası gevşetilmelidir.
- > Chewy kullanımı hastaya alışkanlık kazandırılmalıdır.

## Tedavi Bitiminde Kontrol Edilmesi Gerekenler

- > Dişler arasındaki kontaktlar kontrol edilmelidir.
- > Kapanışta erken temas olmamalıdır.
- > Tedavi sonrasında pekiştirici plak veya retainer uygulamasına önem verilmelidir.
- > Relaps olan vakalar tekrar ücretlendirilecektir.