Topic 4 – Wave

Formative Assessment

PROBLEM SET

NAME:


TEAM:


THIS IS A PRACTICE ASSESSMENT. Show formulas, substitutions, answers, and units!


- Describir cualitativa mente las variaciones de energía que tienen lugar durante un ciclo de una oscilación
- Dibujar aproximadamente e interpretar gráficos de ejemplos de movimiento armónico simple


Topic 4.1 – Oscilaciones-Paper 1

1. Una partícula oscila con movimiento armónico simple (mas) de período T. ¿Cuál de las gráficas muestra la variación con el tiempo de la energía cinética de la partícula?









- 2. Un cuerpo sufre una oscilación bajo movimiento armónico simple (mas). ¿Cuál es la afirmación correcta respecto a los sentidos de la aceleración del cuerpo y de su velocidad?
- A. Siempre opuestos

- B. Opuestos durante medio período
- C. Opuestos durante un cuarto de período
- D. Nunca opuestos
- 3. En las oscilaciones armónicas simples, ¿cuáles de los siguientes pares de cantidades tienen siempre sentidos opuestos?
- A. Energía cinética y energía potencial
- B. Velocidad y aceleración

C. Velocidad y desplazamiento

- D. Aceleración y desplazamiento
- 4. Una chica situada en una barca estacionaria observa que cada minuto 10 crestas de olas se cruzan con la barca. ¿Cuál es el periodo de las olas?
- A. 1/10 min
- B. 1/10 min⁻¹
- C. 10 min
- D. 10 min⁻¹
- 5. Una partícula está sometida a un movimiento armónico simple (MAS) con energía cinética máxima E_{max} y amplitud x_0 . Se suelta la partícula desde el reposo en su desplazamiento de amplitud máxima.



¿Cuál es la variación en la energía cinética cuando la partícula se ha desplazado una distancia de $x_0/3$?

- A. $E_{\text{max}}/9$
- B. $4E_{\text{max}}/9$
- C. $5E_{\text{max}}/9$

D. $8 E_{\text{max}} / 9$

6. El periodo de una partícula que experimenta un movimiento armónico simple (MAS) es T.

aceleración de la partícula El cociente desplazamiento de la partícula desde su posición de equilibrio

es proporcional a

A. T⁻²

D. T^2

7. Una partícula de masa m oscila con movimiento armónico simple (MAS) de frecuencia angular ω.


La amplitud del MAS es A. ¿Cuál es la energía cinética de la partícula cuando está a medio camino entre la posición de equilibrio y un extremo del movimiento?

- A. $\frac{mA^2\omega^2}{A}$
- B. $\frac{3mA^2\omega^2}{\alpha}$
- C. $\frac{9mA^2\omega^2}{22}$

D. $\frac{15mA^2\omega^2}{22}$

Un objeto situado en el extremo de un muelle oscila verticalmente con movimiento armónico simple.

La gráfica muestra la variación con el tiempo t del desplazamiento x. La amplitud es x_0 y el periodo de oscilación es T.



8. ¿Cuál de las siguientes es la expresión correcta para el desplazamiento x?

- A. $-x_0 \cos \frac{2\pi}{T}t$
- B. $x_0 cos \frac{2\pi}{\tau} t$
- C. $-x_0 sen^{\frac{2\pi}{T}}t$
- D. $x_0 sen \frac{2\pi}{T} t$

9. ¿Cuál de las siguientes es la expresión correcta para la máxima aceleración del objeto?

A. $\frac{2\pi}{T} \chi_0$

- B. $\frac{2\pi}{T^2} x_0$ C. $\frac{4\pi^2}{T^2} x_0$


D. $\frac{4\pi^2}{T} x_0$

10. Los amortiguadores de un coche, en buen estado, aseguran que las oscilaciones verticales del coche sean


A. no amortiguadas.

- B. levemente amortiguadas.
- C. moderadamente amortiguadas.
- D. críticamente amortiguadas.












PERÚ Ministerio de Educació




C.




D.



12. La variación con el tiempo t del desplazamiento d de un punto de un medio, debido a dos ondas, se muestra en las gráficas siguientes.





Si se superponen las ondas. ¿Cuál de los siguientes diagramas muestra la variación con el tiempo t del desplazamiento resultante d de ese punto del medio?

t



0


-a






















13. El diagrama que sigue representa una onda sinusoidal que, en un momento determinado, se desplaza en el sentido del eje de las x.





–2a

–3a −

La amplitud y la longitud de onda de esta onda son, respectivamente:

	Amplitud	Longitud de onda
A.	2cm	5 m
B.	2cm	10 m
C.	4 cm	5 m
D.	4 cm	10 m



Topic 4 – Wave

Formative Assessment

PROBLEM SET NAME: TEAM:


THIS IS A PRACTICE ASSESSMENT. Show formulas, substitutions, answers, and units!

- Describir cualitativa mente las variaciones de energía que tienen lugar durante un ciclo de una oscilación
- Dibujar aproximadamente e interpretar gráficos de ejemplos de movimiento armónico simple

Topic 4.1 – Oscilaciones-Paper 2

1. Movimiento armónico simple (MAS)

Se coloca un objeto sobre una superficie sin rozamiento. El objeto está sujeto por un muelle (resorte) fijo por un extremo y oscila en el extremo del muelle con movimiento armónico simple (MAS).



La tensión F en el muelle viene dada por F = k x donde x es la extensión del muelle y k es una constante.

(a) Demuestre que $w^2 = k/m$.

[2]

(b) Se muestra un ciclo de la variación del desplazamiento con el tiempo para dos sistemas separados masa-muelle, A y B.

0,3 desplazamiento / m 0,2 0.1 0.0 tiempo / s -0.1-0.2-0.3


(i) Calcule la frecuencia de la oscilación de A.

[1]

- (ii)Los muelles utilizados en A y B son idénticos. Demuestre que la masa en A es igual a la masa en B.
- (c) La gráfica muestra la variación de la energía potencial de A con el desplazamiento.

[2]

[2]




Sobre los ejes,

- (i) dibuje una gráfica que muestre la variación de la energía cinética con el desplazamiento para la masa en A. Rotúlela como A.
- (ii) esquematice una gráfica que muestre la variación de la energía cinética con el desplazamiento para la masa en B. Rotúlela como B. [3]

2. Esta pregunta trata sobre el movimiento armónico simple (MAS).

La gráfica muestra la variación con el tiempo t de la aceleración a de un objeto X que experimenta un movimiento armónico simple (MAS).



- (a) Defina movimiento armónico simple (MAS).
- (b) X tiene una masa de 0,28kg. Calcule la fuerza máxima que actúa sobre X. [1]
- (c) Determine el desplazamiento máximo de X. Dé su respuesta con un número apropiado de cifras significativas. [4]
- (d) Un segundo objeto Y oscila con la misma frecuencia que X pero con una diferencia de fase de π /4. Utilizando la gráfica de enfrente, esquematice cómo varía la aceleración del objeto Y con t. [2]

3. Ondas

Dos ondas, A y B, están viajando en sentido opuesto en un tanque de agua. La gráfica muestra la variación del desplazamiento de la superficie del agua con la distancia a lo largo de la onda, en un instante particular.



[1]

[1]


[1]

[3]










- (d) Indique la amplitud de la onda A.
- (e)(i) La onda A tiene una frecuencia de 9,0Hz. Calcule la velocidad de la onda A. [2]
 - (ii) Deduzca la frecuencia de la onda B. [3]
- (f) (i) Indique qué se entiende por principio de superposición de ondas. [2]
 - (ii) Sobre el gráfico de enfrente, esquematice la onda que resulta de la superposición de las ondas A y B, en ese instante. [3]

4. Péndulo simple

(a) Un péndulo consta de una pesa suspendida de un soporte rígido, por medio de una cuerda ligera inextensible. La pesa del péndulo se mueve a un lado y, a continuación, se suelta. El esquema gráfico muestra cómo varía con el tiempo, a lo largo de un periodo, el desplazamiento de la pesa del péndulo que está describiendo un movimiento armónico simple.




Sobre el esquema gráfico de más arriba,

- (i) rotule con la letra A un punto en el que la aceleración de la pesa del péndulo sea máxima.
- (ii) rotule con la letra V un punto en el que la rapidez de la pesa del péndulo sea máxima.
- (b) Explique por qué el módulo de la tensión de la cuerda en el punto medio de la oscilación es mayor que el peso de la pesa del péndulo.
- (c) La pesa del péndulo se mueve a un lado hasta que su centro se sitúa a 25mm por encima de su posición en reposo y entonces se suelta.











- (i) Demuestre que la rapidez de la pesa del péndulo en el punto medio de la oscilación es de 0,70ms⁻¹. [2]
- (ii) La masa de la pesa del péndulo es 0,057kg. El centro de la pesa del péndulo está 0,80m por debajo del soporte. Calcule el módulo de la tensión de la cuerda cuando la pesa del péndulo se encuentra en la vertical por debajo del punto de suspensión [3]
- (d) El punto de suspensión de la pesa del péndulo se mueve de un lado a otro con una pequeña amplitud y con un impulso de frecuencia variable f.



Para cada valor de la frecuencia de impulso se alcanza una amplitud A constante y estable.

Las oscilaciones de la pesa del péndulo son ligeramente amortiguadas.

(i) Sobre los ejes de más abajo, esquematice un gráfico que muestre la variación de A con f. [2]




(ii) Haciendo referencia a la gráfica de (d)(i), explique qué se entiende por resonancia.

(e) Se sumerge la pesa del péndulo en agua y se le aplica de nuevo la fuerza impulsora de frecuencia variable de (d). Sugiera qué efecto tendrá esta inmersión de la pesa del péndulo en la forma de su gráfica de (d)(i). [2]

5. Batidos

Esta pregunta es sobre la formación de batidos en ondas sonoras.

(a) Enunciar el principio de la superposición lineal aplicado a las ondas. [2] Dos diapasones **A** y **B** de frecuencias ligeramente distintas, suenan simultáneamente, produciendo ondas sonoras de la misma amplitud. La figura de abajo muestra la perturbación en un punto determinado en el aire, en función del tiempo para cada uno de los diapasones por separado, y la perturbación resultante **C**.



(b) Tres puntos en la forma de onda resultante están identificados P , Q y R . Para cada	l
uno de estos puntos, comprobar si la forma de onda resultante C dibujada es correcta,	
refiriéndose a las dos ondas componentes. Justificar la respuesta en cada caso.	[3]
Punto P :	
Punto Q :	
Punto R :	
(c) Utilizar el diagrama para determinar	
(i) las frecuencias de A y B ;	[2]
A:	
B:	
(ii) la frecuencia de batido.	[2]
(d) (i) Los batidos a esta frecuencia no podrían realmente percibirse como batidos por	el
oído humano. Explicar por qué no.	[1]
(ii) Con el fin de que los batidos puedan percibirse como tales por el oído, ¿tendría que ser la diferencia en frecuencia entre A y B mayor o menor que en el caso	ì
anterior?	[1]
(e) Explicar el uso que podría hacerse de los batidos para sintonizar una cuerda de	
guitarra con un diapasón.	[2]