Figure S2.v9


A
HCGM−mono
HCGM−spliced
nonHCGM−mono
nonHCGM−spliced
CapTrap-seq
TSO
Heart
Testis
2-4Cell
28hpf
N = 13,463,312
4.0% (499,356)
61.0% (8,174,951)
2.0% (292,636)
33.0% (4,496,369)
N = 7,645,509
17.0% (1,282,093)
41.0% (3,130,017)
7.0% (551,846)
35.0% (2,681,553)
N = 6,485,537
4.0% (264,152)
54.0% (3,517,630)
4.0% (230,768)
38.0% (2,472,987)
N = 11,856,679
17.0% (2,068,633)
38.0% (4,451,995)
4.0% (488,879)
41.0% (4,847,172)
N = 8,975,972
5.0% (416,774)
59.0% (5,304,129)
3.0% (297,964)
33.0% (2,957,105)
N = 5,496,067
20.0% (1,083,557)
38.0% (2,099,330)
9.0% (496,477)
33.0% (1,816,703)
N = 6,807,132
2.0% (116,727)
59.0% (4,045,449)
2.0% (144,170)
37.0% (2,500,786)
N = 16,411,770
21.0% (3,508,127)
38.0% (6,305,479)
8.0% (1,324,115)
32.0% (5,274,049)
B
protein-coding
nonExonic
pseudogene
lncRNA
miRNA
misc_RNA
rRNA
Percent of reads overlaps
Heart
Testis
2-4Cell
28hpf
28 hpf
CapTrap-seq
TSO
rRNA
0.0009%
0.0011%
0.0015%
0.0005%
0.0164%
0.0123%
0.0151%
0.0164%
94.8%
86.4%
95.0%
94.5%
84.0%
78.4%
92.9%
84.8%
C
CDS
UTR
intergenic
intron
exonOfNCT
exonOfPseudo
Percent of genomic nts covered
46.7%
43.4%
48.9%
48.4%
39.3%
42.2%
47.3%
33.6%