Plicní ambulance - pneumoonkologie

Ambulantní vyšetření

Klenovský Bořivoj, nar. 7.11.1957, r.č. 571107/1003, poj. 211
Datum vyšetření: 28.9.2026

Diagnózy: C34.1 Zhoubný novotvar horního laloku, průdušky nebo plíce
J44.9 Chronická obstrukční plicní nemoc, NS

Závěr:
Adenokarcinom pravého horního laloku plic, EGFR wt, ALK negativní, PD-L1 TPS 60 %, dg. 9/2026

- 8/2026 kašel, hemoptýza, RTG hrudníku: zastínění vpravo nahoře
- 11.9.2026 bronchoskopie s biopsií z PHL (popis z NIS)
- Histol. 14.9.2026: adenokarcinom, EGFR wt, ALK negativní, PD-L1 TPS 60 % (popis z NIS)
- CT hrudníku a břicha 16.9.2026: tumor PHL 38 mm, bez zvětšených uzlin, bez známek vzdálených metastáz - viz nález
- Stadium: cT2a cN0 cM0 (CT 16.9.2026)
- Spirometrie 23.9.2026: FEV1 1,41 l (52 % n. h.), DLCO 48 % n. h.

Anamnéza:
OA: CHOPN st. GOLD 2, arteriální hypertenze. DM neguje.
FA: Bisoprolol 1,25 mg 1-0-0, Ramipril 10 mg 1-0-0, Tiotropium 18 µg 1-0-0 inh.
AA: PNC - kopřivka
Abusus: kuřák 40 balíčkoroků, nekouří od 8/2026

Objektivně:
ECOG 1. Hmotnost 71 kg. Dýchání sklípkové, oslabené vpravo nahoře, bez vedlejších fenoménů.

Laboratoř (odběr 21.9.2026):
K 5,8 mmol/l, kreatinin 118 µmol/l - viz výsledkový list.

Doporučení:
Případ zadávám k projednání na MDT plicních nádorů.

Otázka na MDT: Je pacient vzhledem k CHOPN (FEV1 52 %, DLCO 48 %) indikován k lobektomii PHL, nebo ke stereotaktické radioterapii?

Kontrola kalémie u PL, zvážit úpravu dávky ramiprilu.

MUDr. Alena Brabcová, plicní ambulance

Radiodiagnostické oddělení

CT hrudníku a břicha s k. l.

Klenovský Bořivoj, nar. 7.11.1957, r.č. 571107/1003, poj. 211
Datum vyšetření: 16.9.2026, popis: 17.9.2026
Indikace: tumor PHL, staging

Popis:
V pravém horním laloku solidní ložisko 38 x 29 mm se spikulacemi, bez kontaktu s hrudní stěnou.
Hilové a mediastinální uzliny nezvětšené, do 8 mm v krátké ose.
Pleurální výpotek není. Centrilobulární emfyzém v obou horních lalocích.
Játra normální velikosti, homogenní struktury. Metastatické postižení jater neprokázáno.
Nadledviny štíhlé, bez ložisek. Ledviny bez městnání.
Skelet bez osteolytických a osteoplastických ložisek.

Závěr:
Tumor pravého horního laloku 38 mm, bez zvětšených uzlin, bez známek vzdálených metastáz.
Klasifikace: cT2a cN0 cM0.

MUDr. Petr Vavřinec, radiodiagnostické oddělení

Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Výsledky laboratorních vyšetření

Klenovský Bořivoj, nar. 7.11.1957, r.č. 571107/1003, poj. 211
Žádající: plicní ambulance, MUDr. Alena Brabcová
Odběr: 21.9.2026 07:40, příjem vzorku: 21.9.2026 08:05, vydáno: 21.9.2026 10:12
Č. žádanky: S03-260921-01
Primární vzorek: krev, sérum

Krevní obraz:
B_LKC: 8,24 10^9/l [4 ... 10]
B_HB: 141 g/l [135 ... 175]
B_PLT: 312 10^9/l [150 ... 400]
Sérum, plazma - dusík. metab.:
S_UREA: 7,9 mmol/l [2.9 ... 8.2]
S_CREAE: **118** µmol/l [59 ... 104]
Krev - minerály:
S_NA: 139 mmol/l [136 ... 145]
S_K: **5,8** mmol/l [3.5 ... 5.1]
Sérum, plazma - proteiny:
S_HSCRP: **10,4** mg/l [0 ... 5]
Sérum - nádorové markery:
S_CEA: 4,0 µg/l [0 ... 5]

Hodnoty mimo referenční mez jsou vytištěny tučně.
Uvolnila: Mgr. Jitka Rybízková, klinická biochemička