

Imagen actuada



Durante los periodos OFF
de tu Parkinson

¡RETOMA TU
VIDA!

Vuelve a tus periodos ON



INBRIJA es un medicamento recetado que se usa conforme es necesario para el tratamiento de episodios OFF en adultos con enfermedad de Parkinson que reciben tratamiento habitual con medicamentos de carbidopa/levodopa.

NO uses INBRIJA si tomas o has tomado un inhibidor no selectivo de la monoaminoxidasa, como phenelzine o tranylcypromine, durante las últimas dos semanas.

Lee la Información de
seguridad importante
en las páginas 8-9.

Inbrija™
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules

¿TIENES PERIODOS OFF? ¡NO ESTÁS SOLO(A)!

Los periodos ON son los momentos en los que tu medicamento para el Parkinson surte efecto. Los periodos OFF son los momentos en los que vuelven los síntomas del Parkinson, entre las dosis habituales del medicamento para la enfermedad.

En una encuesta en línea entre más de 3000 personas con enfermedad de Parkinson, realizada por la Fundación Michael J. Fox,

~70% de las personas encuestadas declaró tener por lo menos dos periodos OFF al día.

Los periodos OFF pueden ocurrir aun cuando tomes regularmente tu medicamento para la enfermedad de Parkinson.

Imagen actuada



LA ÚNICA LEVODOPA DE INHALACIÓN ORAL

INBRIJA es una modalidad inhalada de la levodopa de tu medicamento habitual para la enfermedad de Parkinson. INBRIJA no reemplaza a tu medicamento habitual de carbidopa/levodopa.

Usa INBRIJA en cuanto sientas que los síntomas del Parkinson vuelvan a aparecer (1 dosis por periodo OFF, no más de 5 dosis al día).

INBRIJA puede empezar a surtir efecto en 10 minutos.



En un estudio amplio se observaron mejorías importantes en síntomas motores 30 minutos después de haber inhalado INBRIJA.

Información de seguridad importante selecta

Informa a tu proveedor de atención médica si tomas:

- Inhibidores de la MAO-B
- Antagonistas de la dopamina (D2) (incluso phenothiazines, butyrophenones, risperidone, metoclopramide)
- Isoniazid
- Sales de hierro o multivitaminas que contengan sales de hierro

NO manejes, operes maquinaria o realices otras actividades hasta que conozcas la manera en la que INBRIJA te afecta. Pudieras quedarte dormido(a) y presentarse somnolencia repentinamente hasta un año después de haber iniciado el tratamiento.

Lee la Información de seguridad importante en las páginas 8-9.

Inbrija 
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules

DALE LA CARA A TUS PERIODOS OFF CON UN MEDICAMENTO INHALADO ÚNICO



INBRIJA puede ayudarte a aliviar los síntomas de los periodos OFF

En un estudio amplio se observaron mejorías importantes en síntomas motores 30 minutos después de haber inhalado INBRIJA. INBRIJA puede empezar a surtir efecto en 10 minutos.



INBRIJA se inhala por vía oral

INBRIJA se inhala, por lo que no pasa por el estómago.

- Antes de usar INBRIJA informa a tu proveedor de atención médica si tuvieras asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), o cualquier otra enfermedad pulmonar crónica.
- Informa a tu proveedor de atención médica si sufres de broncoespasmo. Las personas con asma, EPOC u otras enfermedades pulmonares podrían jadear o tener dificultades para respirar después de inhalar INBRIJA. Si esto llegara a ocurrir, suspende la inhalación de INBRIJA y busca atención médica de inmediato.



INBRIJA se usa conforme se necesita

Tómalo como te fue recetado cuando tus síntomas de Parkinson vuelvan a aparecer (1 dosis por periodo OFF, no más de 5 dosis al día).

- No dejes de tomar tu medicamento habitual para la enfermedad de Parkinson. INBRIJA no reemplaza a tu medicamento habitual de carbidopa/levodopa.



INBRIJA es ligero y portátil

Es fácil llevar INBRIJA contigo. Guarda INBRIJA a temperatura ambiente, 68°F a 77°F (20°C a 25°C), en un lugar seco.

- Mantén las cápsulas en su empaque (blíster) hasta justo antes de que vayas a utilizarlas.

Información de seguridad importante selecta

Antes de usar INBRIJA informa a tu proveedor de atención médica sobre cualquier otro trastorno médico que pudieras tener, entre ellos:

- Somnolencia durante el día, trastornos del sueño, somnolencia/aletargamiento repentinos, o uso de medicamentos que incrementan la somnolencia, incluso antidepresivos o antipsicóticos.
- Mareos, náuseas, sudoración o desmayos al ponerte de pie.
- Movimientos anormales (discinesia).
- Problemas de salud mental, tales como alucinaciones o sicosis.
- Impulsos incontrolables, tales como participar en juegos de azar, deseos sexuales, o comer o comprar compulsivamente.
- Glaucoma.
- Embarazo o planes de embarazarte. Se desconoce si INBRIJA pudiera afectar al feto.
- Amamantar o planes de amamantar. La levodopa puede pasar a la leche materna y se desconoce si pudiera afectar al bebé.

Lee la Información de seguridad importante en las páginas 8-9.

Inbrija 
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules



USO DE INBRIJA

Toma INBRIJA conforme sea necesario, cuando vuelvan a aparecer los síntomas de tus periodos OFF.

Carga, inhala y repite

Escucha el clic, siente los giros

1. Inserta una cápsula en el inhalador; después de presionar y escuchar el clic, tu inhalador estará listo para usarse.
2. Inhala INBRIJA, retén la respiración durante 5 segundos. (El ruido de los giros significa que estás recibiendo el medicamento.)
3. Retira la primera cápsula y repite con una segunda cápsula.

La dosis de INBRIJA es de 2 cápsulas. No inhales por vía oral más de una dosis (2 cápsulas) para cualquier periodo OFF. No tomes más de 5 dosis (10 cápsulas) en un día.

Consulta las Instrucciones de uso en

<https://www.inbrija.com/instructions-for-use-espanol.pdf>

99.8%

de 629 personas en dos estudios clínicos pudieron usar INBRIJA durante un periodo OFF después de haber recibido instrucciones sobre cómo hacerlo.

PREGUNTA A TU MÉDICO ACERCA DE INBRIJA



Antes de empezar INBRIJA debes estar tomando un medicamento de carbidopa/levodopa para la enfermedad de Parkinson. INBRIJA no reemplaza a este medicamento.

Los síntomas pueden variar de una persona a otra y de un periodo OFF a otro. Nadie conoce tus periodos OFF mejor que tú.

Informa a tu médico sobre tus periodos OFF y pregúntale si agregar INBRIJA sería adecuado para ti.

Ve el video demostrativo en línea.

[HowtoUseINBRIJA.com](https://www.inbrija.com/howto-use-inbrija)



Información de seguridad importante selecta

Los efectos secundarios más comunes de INBRIJA son tos, infección del tracto respiratorio superior, náuseas y cambio en el color de la saliva o el esputo.

Lee más Información de seguridad importante en las páginas 8-9.

Inbrija 
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No uses INBRIJA si tomas o has tomado un inhibidor no selectivo de la monoaminooxidasa, como phenelzine o tranylcypromine, durante las últimas dos semanas.

Antes de usar INBRIJA informa a tu proveedor de atención médica sobre cualquier otro trastorno médico que pudieras tener, entre ellos:

- Asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), o cualquier enfermedad pulmonar crónica.
- Somnolencia durante el día, trastornos del sueño, somnolencia/aleatargamiento repentinos, o uso de medicamentos que incrementan la somnolencia, incluso antidepresivos o antipsicóticos.
- Mareos, náuseas, sudoración o desmayos al ponerte de pie.
- Movimientos anormales (discinesia).
- Problemas de salud mental, tales como alucinaciones o sicosis.
- Impulsos incontrolables, tales como participar en juegos de azar, deseos sexuales, o comer o comprar compulsivamente.
- Glaucoma.
- Embarazo o planes de embarazarte. Se desconoce si INBRIJA pudiera afectar al feto.
- Amamantar o planes de amamantar. La levodopa puede pasar a la leche materna y se desconoce si pudiera afectar al bebé.

Informa a tu proveedor de atención médica si tomas:

- Inhibidores de la MAO-B.
- Antagonistas de la dopamina (D2) (incluso phenothiazines, butyrophenones, risperidone, metoclopramide).
- Isoniazid.
- Sales de hierro o multivitaminas que contengan sales de hierro.

NO manejes, operes maquinaria o realices otras actividades hasta que conozcas la manera en la que INBRIJA te afecta. Pudiera presentarse somnolencia y quedarte dormido(a) repentinamente hasta un año después de haber iniciado el tratamiento.

Inbrija 
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules

Informa a tu proveedor de atención médica si tuvieras cualquiera de los siguientes efectos secundarios:

- **Quedarte dormido(a) durante actividades cotidianas normales** con o sin señales previas. Si llegaras a sentir aleatargamiento no manejes o realices actividades en las que necesites estar alerta. Las posibilidades de quedarte dormido durante actividades cotidianas normales aumentan si tomas un medicamento que provoque somnolencia.
- **Hiperpirexia y confusión por suspensión del medicamento** (fiebre, músculos rígidos o cambios en la respiración y el ritmo cardíaco), si repentinamente suspendieras el uso de INBRIJA o de la carbidopa/levodopa, o si redujeras repentinamente tu dosis de carbidopa/levodopa.
- **Baja presión arterial** al estar de pie (que puede estar acompañada de mareos, desmayos, náuseas o sudoración). Levántate lentamente después de haber estado sentado(a)/acostado(a).
- **Alucinaciones y otras sicosis** – INBRIJA puede causar o empeorar el ver/escuchar/crear cosas que no son reales; confusión, desorientación o pensamientos desordenados; problemas para dormir; tener muchos sueños; sospechas excesivas o sentimientos de que la gente quiere hacerte daño; comportamiento agresivo, y sentimientos de agitación/inquietud.
- **Impulsos incontrolables inusuales**, tales como deseos de participar en juegos de azar, comer o comprar compulsivamente, y deseos sexuales se han presentado en algunas personas que utilizan medicamentos como INBRIJA.
- **Movimientos corporales súbitos e incontrolados (discinesia)** – INBRIJA podría causar o empeorar estos movimientos. Si esto llegara a ocurrir, podría ser necesario suspender INBRIJA o modificar el uso de otros medicamentos para el Parkinson.
- **Broncoespasmo** – Las personas con asma, EPOC u otras enfermedades pulmonares podrían jadear o tener dificultades para respirar después de inhalar INBRIJA. Si esto llegara a ocurrir, suspende la inhalación de INBRIJA y busca atención médica de inmediato.
- **Aumento de la presión intraocular** en pacientes con glaucoma. Tu proveedor de atención médica debería monitorear esto.
- **Cambios en algunos resultados de laboratorio**, entre ellos los de pruebas del hígado.

Los efectos secundarios más comunes de INBRIJA son tos, infección del tracto respiratorio superior, náuseas y cambio en el color de la saliva o el esputo.

No inhales por vía oral más de una dosis (2 cápsulas) para cualquier periodo OFF. No tomes más de 5 dosis (10 cápsulas) en un día.

Consulta el Folleto de información para el paciente en <https://www.inbrija.com/patient-information-espanol.pdf>

PARA OBTENER INBRIJA, LOS SERVICIOS DE APOYO PARA RECETAS MÉDICAS PUEDEN AYUDARTE

Los Servicios de Apoyo para Recetas Médicas trabajan en colaboración con tu proveedor de atención médica y tu farmacia de especialidades. Si tuvieras preguntas sobre cómo usar INBRIJA o necesitaras ayuda para entender la cobertura de tu seguro puedes hablar con un especialista de los Servicios de Apoyo para Recetas Médicas a fin de obtener respuestas.

■ NUESTRO EQUIPO ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARTE




**Verificamos tus
beneficios.**



**Te ayudamos a evaluar tu
elegibilidad para recibir
asistencia de copago
u otras opciones para
obtener INBRIJA.**



**Asegúrate de saber cómo
utilizar INBRIJA.**



¿TIENES PREGUNTAS SOBRE INBRIJA? ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE

Si necesitaras apoyo o tuvieras preguntas sobre INBRIJA comunícate con los Servicios de Apoyo para Recetas Médicas:



1-888-887-3447

Número gratuito de lunes a viernes,
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., Horario
del Este.

Inbrija 
(levodopa inhalation powder)
42 mg capsules



¡NO TE QUEDES SENTADO(A)!

Pregunta si INBRIJA pudiera ser adecuado para ti.

Obtén más información en [INBRIJA.com](https://www.inbrija.com)

Información de seguridad importante selecta

Los efectos secundarios más comunes de INBRIJA son tos, infección del tracto respiratorio superior, náuseas, y cambios en el color de la saliva o el esputo.

Lee más Información de seguridad importante en las páginas 8-9.

ACORDA[®]
T H E R A P E U T I C S

ACORDA THERAPEUTICS, el logotipo estilizado de ACORDA THERAPEUTICS, INBRIJA, y el logotipo de INBRIJA son todos marcas comerciales de Acorda Therapeutics, Inc. ©2019 Acorda Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados.