

武汉大学计算机学院20xx-20xx学年第一学期
20XX级 《离散数学》 考试标准答案

一、 试求下述命题公式 G 的主析取和主合取范式: (10分)

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

主析取范式: $(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$;

主合取范式: $(\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R)$.

二、 写出下列结论的证明序列: (20分, 10+10)

(1) 前提: $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, \neg R \wedge S$.

结论: $\neg P$;

证明:

| | | | |
|---------------------|------|---------------------|------------|
| ① $\neg R \wedge S$ | 引入前提 | ④ $\neg Q$ | ② + ③ + MT |
| ② $\neg R$ | 化简规则 | ⑤ $P \rightarrow Q$ | 引入前提 |
| ③ $Q \rightarrow R$ | 引入前提 | ⑥ $\neg P$ | ④ + ⑤ + MT |

(2) 前提: $\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)), \forall x(Q(x) \vee R(x)), \exists x \neg R(x)$.

结论: $\exists x \neg P(x)$.

证明

| | | | |
|-------------------------------|-----------|---|------------|
| ① $\exists x \neg R(x)$ | 引入前提 | ⑥ $\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ | 引入前提 |
| ② $R(a)$ | ① + ES | ⑦ $P(a) \rightarrow \neg Q(a)$ | ⑥ + US |
| ③ $\forall x(Q(x) \vee R(x))$ | 引入前提 | ⑧ $\neg P(a)$ | ⑦ + ⑤ + MT |
| ④ $Q(a) \vee R(a)$ | ③ + US | ⑨ $\exists x \neg P(x)$ | ⑧ + EG |
| ⑤ $Q(a)$ | ④ + 析取三段论 | | |

三、 设有函数 $f: A \rightarrow B$, 定义函数 $g: \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(A)$, $\forall S \in \mathcal{P}(B)$ (注: $\mathcal{P}(A)$ 为集合 A 的幂集合), 有 (20分, 10+5+5)

$$g(S) = \{a \mid a \in A \wedge f(a) \in S\} \text{ (即 } f^{-1}(S)\text{)}$$

(1) 试证明, 如果 f 是单射, 则 $\forall X \subseteq A, f^{-1}(f(X)) = X$;

证明: 由定理有 $X \subseteq f^{-1}(f(X))$, 现需证 $f^{-1}(f(X)) \subseteq X$, 设 $x \in f^{-1}(f(X))$, 则 $f(x) \in f(X)$, 即 $\exists x' \in X, f(x) = f(x')$. $\because f$ 是单射, $\therefore x = x'$, 即 $x \in X$. 故 $f^{-1}(f(X)) \subseteq X$.

(2) 试证明, 当 f 是单射时, g 是满射;

证明: $\forall X \in \mathcal{P}(A)$, 由(1)有 $f^{-1}(f(X)) = X$, 即 $g(f(X)) = X$, $\therefore g(\mathcal{P}(B)) = \mathcal{P}(A)$. 故 g 是满射.

(3) 试以集合 $A = \{a, b\}$ 到 $B = \{c, d\}$ 上的函数为例说明当 f 不是单射时, g 不是满射.

解: 设 $f(a) = f(b) = c$, 则 $g(\mathcal{P}(B)) = \{\emptyset, \{a, b\}\} \subsetneq \mathcal{P}(A)$, 故 g 不是满射.

四、 设 A 为集合, 集合 P 是集合 A 上所有的划分组成的集合, 即 $P = \{S \mid S \text{ 是 } A \text{ 的划分}\}$, 定义关系 $R \in P \times P, \forall S, T \in P, \langle S, T \rangle \in R$ iff 若 $\forall u \in S$, 则存在 $v \in T$, 使得 $u \subseteq v$. 如 $A = \{a, b, c\}$, 设 $S = \{\{a\}, \{b, c\}\}$, $T = \{\{a, b, c\}\}$, 则 $\langle S, T \rangle \in R$: (15分, 5+5+5)

(1) 设 $A = \{a, b, c\}$, 试用枚举法表示集合 A 上所有的划分组成的集合 P ;

解:

$$P = \{\{\{a, b, c\}\}, \{\{a, b\}, \{c\}\}, \{\{b, c\}, \{a\}\}, \{\{a, c\}, \{b\}\}, \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}\}$$

(2) 证明: R 是偏序关系;

证明:

① 自反性: $\forall S \in P, \forall u \in S, u \subseteq u, \therefore \langle S, S \rangle \in R$;

② 反对称性: 设 $\langle S, T \rangle \in R \wedge \langle T, S \rangle \in R$, 需证明集合 S 和 T 相等. 设 $u \in S, \therefore \exists v \in T, u \subseteq v, \therefore \langle T, S \rangle \in R, \therefore \exists u' \in S, v \subseteq u',$ 这样 $u \subseteq u'$, 而 u 和 u' 同属于一个划分 S , 所以它们均非空且 $u \cap u' \neq \emptyset, \therefore u = u',$ 而 $u \subseteq v \subseteq u', \therefore u = v$, 故 $S \subseteq T$. 同理可证 $T \subseteq S. \therefore S = T$.

③ 传递性: 设 $\langle S, T \rangle \in R \wedge \langle T, W \rangle \in R$, 则 $\forall u \in S, \exists u \in T, u \subseteq v, \therefore \langle T, W \rangle \in R, \therefore \exists w \in W, v \subseteq w$, 这样 $u \subseteq w$, 故 $\langle S, W \rangle \in R$.

(3) 试用性质法表示集合 P 的最大元素和最小元素.

解: 最大元素 $\{P\}$; 最小元素 $\{\{a\} \mid a \in A\}$.

五、 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, H, K 是其子群, 在 G 上定义二元关系 $R: \forall a, b \in G, aRb$ iff 存在 $h \in H, k \in K$, 使得 $b = h * a * k$. 证明: (20分, 每小题5分)

(1) R 是 G 上的等价关系;

证明:

① 自反性: $\because H, K \leq G, \therefore e \in H \cap K$. 这样 $\forall a \in G, a = e * a * e$

② 对称性: 设 aRb , 即 $\exists h \in H, k \in K, b = h * a * k$, 即 $a = h^{-1} * b * k^{-1}$, 而 $h^{-1} \in H, k^{-1} \in K$, 故 bRa .

③ 传递性: 设 $aRb \wedge bRc$, 即 $\exists h, h' \in H, k, k' \in K, b = h * a * k \wedge c = h' * b * k'$, 这样 $c = (h' * h) * a * (k * k')$. 而 $h' * h \in H \wedge k * k' \in K$, 故 aRc .

(2) 试证明 $\forall h, h' \in H, k, k' \in K, hRh', kRk'$;

证明: $h' = (h' * h^{-1}) * h * e$, 而 $h, h' \in H$, 根据子群运算的封闭性有 $h' * h^{-1} \in H$, 又 $e \in K$, 故 hRh' . 同理可证 kRk' .

(3) 试证明 $\forall a, b \in H \cup K, aRb$;

证明: 如果 $a, b \in H \vee a, b \in K$, 这由题(2)有 aRb .

设 $a \in H \wedge b \in K, \therefore e \in H \cap K$, 由题(2), $aRe \wedge eRb$, 由于 R 是传递关系, 故 aRb .


(4) 若 $|H| = m, |K| = n, |G| = mn, m$ 与 n 互素, $[a]_R$ 是 R 的某个等价类, 且 $[a]_R$ 是 G 的一个子群, 则 $R = G \times G$.

证明: $\because [a]_R \leq G, \therefore e \in [a]_R$. 这样 eRa , 由(2), $\forall h \in H, eRh, \therefore$


hRa , 即 $h \in [a]_R$, 由此 $H \subseteq [a]_R$, $\therefore H \leq [a]_R$. 根据 *Lagrange* 定理, $|H| \mid |[a]_R|$, 即 m 是 $|[a]_R|$ 的因子. 同理 n 也是 $|[a]_R|$ 的因子. 而 m 和 n 互素, 这样 mn 是 $|[a]_R|$ 的因子. $\therefore mn = |G| \geq |[a]_R| \geq mn$. 故 $[a]_R = G$.

六、 设判别下面的简单无向图是否为平面图:

(8分)



解: 不是平面图, 因为其子图与 $K_{3,3}$ 同构:



七、 设无向图 $G(n, m)$ 是树, 其结点最大度数为 $k (k \geq 2)$, 证明: G 中至少有 k 片树叶. (7分)

证明 (反证法): 设仅有 $k-1$ 个结点为树叶, 这样图 G 有 1 个结点的度数 $\geq k$, $n-k$ 个结点的度数 ≥ 2 , $k-1$ 个结点的度数为 1. \therefore 所有结点的度数之和不小于下式:

$$k + 2(n - k) + k - 1$$

即 $2n - 1$. 但是 n 个结点的无向树的边数 $m = n - 1$, 其度数之和为 $2n - 2 < 2n - 1$. 故矛盾. 同理对叶结点数小于 $k-1$ 的情况也有上述矛盾.