中醫–便祕之自我保健

一、怎樣才算便祕？

包含排便時發生解便困難、疼痛或解便要很用力、糞便很硬、感覺解不乾淨、要用人工方式解決的情形，排便次數較平常減少或每週解便次數少於三次。

二、為什麼會便祕？

便祕因症狀與發生原因不同，主要分為三類：

(一)慢傳輸型便祕：會出現排便次數少、便意少，糞質堅硬且排出困難。常見於身體虛弱、活動量少，吃過多生冷食物及過多燥熱食物、纖維量攝取過少者。

(二)出口梗阻型：會出現排便費力、下墜感、排出量少且有排不乾淨感，或缺乏便意。常見於痔瘡、肛門手術後、子宮脫垂、子宮肌瘤等病人。

(三)腸激躁症候群：會有排便困難、次數少，於排便、排氣後腹痛或腹脹症狀會緩減。常見於壓力大、生活忙碌無時間排便者。

三、便祕之治療方法，因病情不同，需中醫師診斷，再給予合適的中藥或食療。

(一)身體虛弱導致腸道蠕動變慢者：可給予補氣之藥品（若為癌症患者，需處方用藥），以增加腸胃蠕動，如黨參等。

(二)老人腸道黏膜萎縮，導致黏液分泌不足：則可給予潤腸之品，如芝麻、杏仁、黑木耳等食品。

(三)對於過食生冷物導致腸道血流不足、蠕動變慢：則給予溫陽之品，幫助腸道蠕動，如生薑等食品。

(四)吃過多烤、炸、辣的食物或纖維量攝取過少，導致糞團堅硬：應增加纖維飲食，改變飲食習慣等，或給予清熱瀉下之品，如蘆薈等食品。

(五)另使用含鋁制酸劑、鎮定劑及抗副交感神經製劑等藥品，其副作用皆會造成便祕，故應依醫囑服用藥物。

四、便祕之自我保健？

(一)養成良好排便之習慣，建立固定時間排便的習慣，建議在早餐後 15 分鐘內；及不要「忍便」，若有便意時應立即上廁所。

(二)若無限水者，每天至少飲用 1,500~2,000mL 的水，可促進消化液分泌，但須避免含有咖啡因的茶類或含酒精的飲料，才不會造成脫水狀況始使便祕症狀加劇。


三軍總醫院 護理部 中醫部 編印
諮詢電話：(02)87927056
46-CMC-02（2008.01 醫療紀錄管理審議會審核通過、2012.03、2013.12、2015.06、2016.12、2019.06）-1-

(三)多運動，如跑步、跳繩等，或每天至少散步 30 分鐘或快走 10 分鐘，增強體能及腹肌的收縮能力。

(四)攝食豐富的高纖食物，可刺激胃腸蠕動而排便，如蜂蜜具有軟便的作用；香蕉加牛奶以果汁機打成濃汁亦可；其他含有纖維較多的食物，如地瓜葉、紅蘿蔔、菠菜、洋蔥、奇異果、香蕉、大麥、甘藷、白菜，芝麻、山楂、紅麴及無花果等，皆有消食潤腸作用，有利通便的食品。但是腸躁症病人不可一次進食過多高纖食物，以免腸道黏膜刺激。

(五)放鬆心情、減少壓力，並且避免過度操勞及睡眠不足。

(六)穴位按壓：可緩解腹脹、促進腸蠕動。每日早、晚各 1 次，配合穴位按壓用姆指環型按揉、垂直按壓或二者交替，依（圖一）右天樞穴、中脘穴、左天樞穴、氣海穴及關元穴之順時針順序，每穴按壓 2 秒，連續按壓 10 次共 15 分，按壓力道維持 3 - 5 公斤，由輕至重以溫和、均勻柔和力量按壓。



圖一 穴位按壓之穴位圖

註一：穴位按壓是依據中醫的經絡、針灸學原理，以手指按壓穴位治療疾病的一種按壓技術。

註二：中脘穴位於肚臍上約 5 個指幅處、天樞穴位於肚臍左右約 3 個指幅處、氣海穴位於肚臍下約 2 個指幅處、關元穴位於肚臍下約 4 個指幅處。

(七)在調整飲食及生活習慣後，如果便祕情形仍無法改善達一個月以上，建議就醫診治。

參考資料：

林詩淳、蔡坤維、陳妙文、辜美安（2018）. 老年人慢性便祕. *源遠護理，12*（3），54-59。

周連福(2016).便祕的臨床治療效果分析. *中國繼續醫學教育，8*(14)，147-148。

護理指導評值：

⊙是非題

1. （　） 腸躁症病人如果便祕也可一次進食過多的高纖食物來促進排便。
2. （　） 便祕患者如果沒有限水問題，每天可飲水 1,500~2,000mL 的水，來促進消化液分泌。
3. （　） 身體虛弱導致腸道蠕動變慢者，可以使用補氣之藥品，以增加腸胃蠕動。

⊙選擇題

4. （　） 以下哪些食物不適宜便祕患者使用？ A.香蕉。B.蜂蜜。C.濃茶。D.奇異果。
5. （　） 以下哪一個症狀不是便祕？ A.解便時疼痛且困難。B.糞便很硬。C.感覺解不乾淨。D.每天自行解便。
6. （　） 以下哪些藥物不會造成便祕？ A.含鋁製酸劑。B.秋水仙素。C.鎮定劑。D.抗副交感神經制劑。

（答對 5-6 題⇨完全了解；答對 3-4 題⇨部分了解；答對 1-2 題⇨完全不瞭解）

1.（X） 2.（O） 3.（O） 4.（C） 5.（D） 6.（B）