下背痛護理指導

一、何謂下背痛?

下背痛是一種症狀，發生原因很多，常見於軟組織受傷、椎間盤凸出、脊椎滑脫、脊椎退化性關節炎、壓迫性骨折、用力不當、姿勢不良、老化及精神壓力等因素造成。

二、下背痛之治療

（一）藥物治療：

常用 NSAID （非類固醇類抗發炎藥）止痛藥與肌肉鬆弛劑，對鎮痛、消炎和鬆弛肌肉的功效良好。

（二）物理治療

如按摩、針灸、低能量雷射治療、運動治療、腰部牽引、電療與熱療等，主要由復健科執行。

（三）復健運動：

1.仰臥半起運動：身體躺平，雙腳屈膝，雙足無需支撐，由起坐最高點向地面回躺，可增加腹肌肌力。

2.平背運動：仰臥，雙腿彎曲，用力收縮腹部及臀部。抬高臀部約 2.5~5 公分，數 1~5，然後放鬆、再回復原來的姿勢（如圖一）。

3.鼻碰膝運動：仰臥，雙手抱膝，用力彎曲下膝，使鼻接近膝蓋數 1~5，然後回復原來姿勢（如圖二）。

4.手碰趾運動：雙腿伸直的坐姿，雙手儘量伸直向前碰腳趾。

5.蹲下運動：以站姿且上身保持垂直地面，蹲下時腳跟不可離地。

6.直膝抬腿運動：仰臥，一腳膝蓋彎曲，另一膝伸直儘量往上抬高，數 1~5 後放下；兩腳輪流做此運動。

7.鬆弛運動：仰臥、深吸氣、緊縮下腹及臀部肌肉，數 1~5，再用上腹部將空氣壓出，放鬆全身。

三軍總醫院 護理部 神經內科 編印

諮詢電話：(02)87927056



（圖一）



（圖二）

8.坐下前彎運動：坐在椅子上，背部緊貼椅背，兩腿平放地上。將兩腳分開30公分，緊縮下腹及臀部，身體向前彎腰，雙手著地，數1~3，再回復原來姿勢。

三、下背痛日常活動注意事項

（一）避免久坐，如需要久坐可以背墊或高背座椅，支撐下背，減少不適感。

（二）選擇睡木板床下面加墊被子，使腰部的姿勢可以自然伸直減輕不適感，儘量不要睡軟床墊，因為軟床墊會使臀部下沉，會導致椎間盤壓迫神經使其症狀加劇。

（三）平躺時，在膝下置放一枕頭，以減輕脊椎壓力。

（四）避免動作過快及過大，因身體過度後仰，會增加背部之傷害。

（五）需轉身去接或拿東西時，不要只扭轉上半身，應儘量整個身體轉過來。

（六）取物時兩腳必須與肩同寬，一腳在前、一腳在後，膝蓋彎曲時需要保持背部平直，並將物品靠近身體，兩腳需要站直，不要彎腰取物，以減少不適感。

（七）同一個姿勢時間，不宜過長，且適當運動可以改善及預防下背痛。

（八）下背痛其實是預防重於治療，良好的姿勢，儘量減少背負重物，讓脊椎以及附近不要受過多重力壓迫，可預防脊椎軟組織受傷；如必須搬運重物時，應注意保持背部平直及物品靠近身體，以避免背部肌肉拉傷或椎間盤突出症。

參考資料

詹瑞棋、徐伯誠、周正亮（2019）．下背痛之評估與治療．台灣醫學，*23*（3），322-329。

Roger, C.,(2019). Patient education: Low back pain in adults (Beyond the

護理部
三軍總醫院　　編印
神經內科

諮詢電話：(02)87927056

Basics). In L. Kunins (Ed.), *UpToDate.* Retrieved September 27, 2019, from https://www-uptodate-com./contents/low-back-pain-in-adults-beyond-the-basics

護理指導評值：

⊙是非題

1. （　）下背痛常見於軟組織受傷、椎間盤凸出、脊椎滑脫、脊椎退化性關節炎、壓迫性骨折、用力不當、姿勢不良、老化及精神壓力等因素造成
2. （　）下背痛要選擇睡軟床墊，因為軟床墊使腰部的姿勢可以自然彎曲較為舒適
3. （　）下背痛時需轉身去接或拿東西時，要扭轉上半身，盡量不要整個身體轉身過去拿取物品

⊙選擇題

4. （　）下背痛之治療包括：
（1）藥物治療；(2）物理治療；(3）復健運動；(4）以上皆是
5. （　）平日拿取物品應注意什麼？
（1）兩腳必須兩較併攏；(2）膝蓋彎曲時需要保持背部平直；(3）將物品靠近身體，兩腳需要彎曲，要彎腰取物；(4）以上皆是
6. （　）預防下背痛方法：
（1）良好的姿勢，儘量減少背負重物及附近不要受過多重力壓迫；(2）必須搬運重物時，應注意保持背部平直；(3）物品靠近身體；(4）以上皆是。

（答對 5-6 題⇨完全了解；答對 3-4 題⇨部分了解；答對 1-2 題⇨完全不瞭解）

1.(O)　2.(X)　3.(X)　4.(4)　5.(2)　6.(4)

三軍總醫院　護理部　神經內科　編印

諮詢電話：(02)87927056