

$$TdS = dU + PdV - \mu dN$$

Boltzmann

$$\omega_j = \frac{N! g_j^{N_j}}{N_j! (N - N_j)!}$$

$$\omega_B = N! \prod \frac{g_j^{N_j}}{N_j!}$$

$$f_j = \frac{N_j}{g_j} = \frac{N}{Z} e^{-\epsilon_j/kT}$$

Maxwell-Boltzmann

$$\omega_j = \frac{g_j^{N_j}}{N_j!}$$

$$\omega_{MB} = \prod \frac{g_j^{N_j}}{N_j!}$$

$$f_j = \frac{N}{Z} e^{-\epsilon_j/kT} = (e^{(\epsilon_j - \mu)/kT})^{-1}$$

Fermi-Dirac

$$\omega_j = \frac{g_j!}{N_j! (g_j - N_j)!}$$

$$\omega_{FD} = \prod \frac{g_j!}{N_j! (g_j - N_j)!}$$

$$f_j = (e^{(\epsilon_j - \mu)/kT} + 1)^{-1}$$

Bose-Einstein

$$\omega_j = \frac{(N_j + g_j - 1)!}{N_j! (g_j - 1)!}$$

$$\omega_{BE} = \prod \frac{(N_j + g_j - 1)!}{N_j! (g_j - 1)!}$$

$$f_j = (e^{(\epsilon_j - \mu)/kT} - 1)^{-1}$$

Derive Distribution

$$\ln(N!) \approx N \ln(N) - N$$

$$0 = \frac{\partial}{\partial N_j} (\ln(\omega) + \alpha (\sum N_j - N) + \beta (\sum \epsilon_j N_j - U))$$

$$\alpha, \beta : TdS = dU + PdV - \mu dN$$

Derive Density of States

$$n^2 = \left(\frac{8mV^{-2/3}}{h^2} \right) \epsilon \equiv R^2$$

$$n = \frac{1}{8} \frac{4\pi R^3}{3}$$

$$g(\epsilon) d\epsilon = \gamma_s \frac{dn}{d\epsilon} d\epsilon$$

$$g(\epsilon) d\epsilon = \gamma_s \frac{4\sqrt{2}\pi V}{h^3} m^{3/2} \epsilon^{1/2} d\epsilon$$

Mash / Definitions

$$\Delta \ln(\omega) = \ln(\omega_f / \omega_i)$$

$$\Delta \ln(\omega) = -\frac{\mu}{kT} \Delta N$$

$$B: U = \sum N_j \epsilon_j = \frac{N}{Z} \sum g_j \epsilon_j e^{-\epsilon_j/kT}$$

$$\omega_B = N! \omega_{MB}$$

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{d \ln(y)}{dx}$$

$$\epsilon_j = n_j^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}}$$

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T$$

$$F \equiv U - TS$$

$$F = ? - NkT \ln Z$$

$$H \equiv U + PV = G + TS$$

$$G \equiv U - TS + PV = H - TS$$

$$\text{Single Comp Sys: } G = \mu N$$

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$$

$$B: p_j = \frac{N_j}{N} = \frac{g_j}{Z} e^{\beta \epsilon_j}$$

$$\bar{E} = \sum p_j E_j$$

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T}$$

$$U = d_{free} NkT/2$$

$$S = \int_0^T \frac{C_V dT'}{T'}$$

Ideal Gas

$$\omega_{BE} > \omega_{MB} > \omega_{FD}$$

$$FD, BE \rightarrow MB$$

$$[N, T, Z, \ln(Z)]$$

$$MB \Rightarrow S, F, \mu$$

$$S = \frac{U}{T} + Nk(1 - \ln(\frac{N}{Z}))$$

$$F = NkT(\ln(\frac{N}{Z}) - 1)$$

$$\mu = kT \ln(\frac{N}{Z})$$

$$Z: \gamma_s = 1$$

$$Z = V(2\pi mkT/h^2)^{3/2} = Vn_Q$$

$$\ln(Z) = \frac{3}{2} \ln(T) + \ln(V) + \frac{3}{2} \ln\left(\frac{2\pi mk}{h^2}\right)$$

$$PV = NkT$$

$$U = \frac{3}{2} NkT$$

$$\text{lim: } \lambda_{dB}^3 \ll \frac{V}{N}, \lambda_{dB} \equiv \left(\frac{h^2}{2\pi mkT} \right)^{1/2},$$

$$\left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = l \equiv d_{avg}$$

$$\text{MSD: } g(\epsilon) d\epsilon, Z, \epsilon \rightarrow \frac{1}{2} m v^2$$

$$\Rightarrow N(\epsilon) d\epsilon =$$

$$4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT} dv$$

$$\Delta \omega_{mix} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{N!}{N_1! N_2!},$$

$$\Delta S = \dots = -Nk(x_1 \ln(x_1) +$$

$$x_2 \ln(x_2))$$

$$Z_{mono} = Z_{trans}$$

$$Z_{dia} = Z_{trans} Z_{vib} Z_{rot}$$

$$Z_{vib} = \frac{\exp(-\theta^{vib}/2T)}{1 - \exp(-\theta^{vib}/2T)}$$

$$Z_{rot} = \frac{T}{\theta_{rot}}$$

Oscillations

$$\epsilon_j = (j + \frac{1}{2}) h\nu$$

$$\theta_{vib} = \frac{h\nu}{k}$$

$$\theta_{vib, H2} = 6000K$$

$$\Rightarrow Z_{vib}$$

$$U_{vib} = NkT^2 \frac{\partial \ln(Z)}{\partial T} = Nk\theta \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\exp(\theta/T) - 1} \right)$$

$$\approx NkT, \frac{T}{\theta} \gg 1$$

$$T \gg 1 \Rightarrow C_V = Nk$$

$$T \ll 1 \Rightarrow C_V = Nk \left(\frac{\theta}{T} \right)^2 e^{-\theta/T}$$

$$\text{localized, dist} \Rightarrow \text{Boltzmann, } g_j =$$

1

Rotations

$$\epsilon_j = j(j+1) \frac{\hbar^2}{2I}$$

$$\theta_{rot} = \frac{\hbar^2}{2Ik}$$

$$\theta_{rot, H2} = 80K$$

$$g_j = 2j + 1$$

$$T \gg \theta_{rot}$$

$$\Rightarrow Z = \frac{T}{\theta_{rot}}$$

$$\Rightarrow U_{rot} = NkT$$

$$\Rightarrow C_{V,rot} = Nk$$

$$T \ll \theta_{rot}$$

$$\ln(Z) \approx \ln(1 + 3e^{-2\theta_{rot}/T}) \approx 3e^{-2\theta_{rot}/T}$$

$$\Rightarrow U = 6Nk\theta_{rot} e^{-2\theta_{rot}/T}$$

$$\Rightarrow C_{V,rot} = 3Nk \left(\frac{2\theta_{rot}}{T} \right)^2 e^{-2\theta_{rot}/T}$$

Einstein Solids

$$F = -NkT \ln Z$$

$$S = \frac{U}{T} + 3Nk \ln Z$$

$$\theta_E = h\nu/k, \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\kappa}{\mu}}$$

$$U = 3Nk\theta_E \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\theta_E/T} - 1} \right)$$

$$T \gg \theta_E \Rightarrow C_V \approx 3Nk$$

$$T \ll \theta_E \Rightarrow C_V \approx 3Nk(\theta_E/T)^2 e^{-\theta_E/T}$$

Debye

$$g(\nu) d\nu = 4\pi V \left[\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3} \right] \nu^2 d\nu$$

Fermi Energy

$$\mu(0) = \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3N}{8\pi V} \right)^{2/3}$$

$$\epsilon_F = kT_F$$

$$T \ll T_F \Rightarrow \mu \approx$$

$$\mu(0) \left(1 - \frac{\pi^2}{12} \left[\frac{T}{T_F} \right]^2 \right)$$

$$\text{High T} \Rightarrow \text{Ideal Gas}$$

Blackbody

$$f_j = \frac{1}{e^{\epsilon_j/kT} - 1}$$

$$\text{Two polarization states} \Rightarrow$$

$$g(\nu) d\nu = \frac{8\pi V}{c^3} \nu^2 d\nu$$

$$\text{Planck Radiation } u(\nu) d\nu =$$

$$g(\nu) f(h\nu) h\nu d\nu$$

$$\Rightarrow u(\nu) d\nu = \frac{8\pi hV}{c^3} \left(\frac{\nu^3 d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} \right)$$

$$\Rightarrow u(\lambda) d\lambda =$$

$$8\pi h c V \left(\frac{d\lambda}{\lambda^5 (e^{hc/\lambda kT} - 1)} \right)$$

$$\nu = c/\lambda \Rightarrow d\nu = (-c/\lambda^2) d\lambda$$

$$\lambda_{max} \text{ defined by } 0 = \frac{d}{d\lambda} [\lambda^5 (e^{hc/\lambda kT} - 1)]$$

$$\Rightarrow \lambda_{max} T = 2.90 \times 10^{-3}$$

$$hc/\lambda kT \gg 1$$

$$\Rightarrow u(\lambda) d\lambda = V \frac{8\pi kT}{\lambda^4} d\lambda$$

$$hc/\lambda kT \ll 1$$

$$\Rightarrow u(\lambda) d\lambda = V \frac{8\pi hc}{\lambda^5} e^{-hc/\lambda kT} d\lambda$$

Photon Gas

$$N = 2.02 \times 10^7 T^3 V$$

$$U = 7.55 \times 10^{-16} T^4 V$$

$$S = \frac{32\pi^5 kV}{45} \left(\frac{kT}{hc} \right)^3$$

BE Condensation

$$N = \int_0^\infty N(\epsilon) d\epsilon = \int_0^\infty f(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon$$

$$\Rightarrow N_{ex} = 2.612V \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2}, \text{ this also gives } T_B \text{ when } N_{ex} = N$$

$$U = 0.77 NkT \left(\frac{T}{T_B} \right)^{3/2}$$

$$\text{Single Osc, no restriction on N}$$

$$\Rightarrow \ln(z) = -\ln(1 - e^{-h\nu/kT})$$

$$\text{So using } g(\nu) d\nu \text{ get}$$

$$\ln(Z) = \frac{8\pi^5}{45} \left(\frac{kT}{hc} \right)^3 V$$