

FUNDUS-CVD AI RESULT REPORT

안저 동맥경화 AI 검사 결과지

| 고객번호 E260613000

| 수진자명

| 검사일자 2026-06-13



안저 동맥경화 AI 검사 결과지

XI XAIMED

| 고객번호 E260613000

| 수진자명

| 성별/나이 M / 59

| 검사일자 2026-06-13

| 검사기관



님의 2026년 6월 13일 안저 영상입니다.

동맥경화는 혈관 중간층에 퇴행성 변화가 발생하면서 섬유화가 진행되고 혈관의 탄성이 감소하는 현상입니다.

특히 혈관 내막에 콜레스테롤이 침착되고 세포 증식이 일어나면 혈관이 점차 좁아지는 **죽상경화증**으로 진행할 수 있습니다.


동맥경화는 초기에는 자각 증상이 거의 없지만, 시간이 지나면 **협심증, 심근경색, 뇌졸중, 말초혈관질환** 등 심각한 **심뇌혈관 질환**으로 이어질 수 있어 **조기 진단과 관리**가 매우 중요합니다.

한국지질·동맥경화학회 진료지침위원회, 이상지질혈증 진료지침 제5판, 한국지질·동맥경화학회, 2022.

안저 동맥경화 AI 점수와 동맥경화


낮음 단계

40점 이하




중간 단계

40점 초과 70점 미만



높음 단계

70점 이상




안저 동맥경화 AI 평가 결과

안저 동맥경화 위험도 점수는 **73.4점**으로 현재 위험도 **높음 단계**입니다.

73.4 / 100

경동맥 동맥경화 위험


경동맥 초음파에서
동맥경화 소견이 확인될 확률 **71.8%**



검진수검자 10만명 중 귀하의 안저검사서 평가된 점수를
동일하게 받은 수검자의 경동맥 초음파 죽상경화
(내중막, 경화반, 협착) 비율을 나타냅니다.

심장 관상동맥경화 위험

관상동맥 CT에서
관상동맥 석회화 중등도 이상일 확률 **22.0%**




검진수검자 1만명 중 귀하의 안저검사서 평가된 점수를
동일하게 받은 수검자의 심장 CT상 석회화 동맥경화
비율을 나타냅니다.

국내 검진센터 10만명 코호트 기반 검증 데이터 (경동맥: 초음파 검사 결과 기반; 관상동맥: CT 칼슘 점수 기준)

본 결과지는 비청구 대상이며, 환자 과금에 적용되지 않습니다.

나이에 별 평균 위험점수와 나의 위험도를 비교해 보세요.

님의 안저동맥경화 위험도 점수는 73.4점으로 동나이대 평균 점수는 66.2점입니다.



70점 이상은 높은 위험도로 분류됩니다.

안저 동맥경화 AI 검사 점수가 70 이상인 경우는 경동맥경화나 관상동맥경화의 유병률이 높을 수 있습니다.


또한, 향후 심혈관질환으로 인한 사망위험도가 증가할 수 있습니다. 이에, 경동맥초음파나 관상동맥 CT 검사 등 동맥경화 진단을 위한 2차 정밀 검사가 필요할 수 있습니다.

위험 단계에서는 의료진의 판단에 따라 경동맥초음파나 관상동맥 CT 검사 등 2차 정밀 검사를 권장합니다.

Chang J, Ko A, Park SM, Choi S, Kim K, Kim SM, Yun JM, Kang U, Shin IH, Shin JY, Ko T. Association of cardiovascular mortality and deep learning-fundusoscopic atherosclerosis score derived from retinal fundus images. American journal of ophthalmology. 2020 Sep 1;217:121-30.

정기적인 안저 동맥경화 AI 검사로 심혈관 건강을 추적관찰해 보세요.

다음 검사 예정일은 2027.06.13. 입니다.



동맥경화는 조기에 발견하여 적절한 관리를 하는 것이 중요합니다.

주기적인 안저 동맥경화 AI 검사를 통해 나의 동맥경화 위험도가 증가하지 않도록 건강한 식단과 생활습관을 실천하세요.

동맥경화 예방 관리를 위한 건강한 식단 실천 *

균형 잡힌 식단은 동맥경화 진행을 늦추는 가장 기본적인 관리 방법입니다

1. 지방 적은 단백질 유지

- 닭가슴살 등 백색육, 생선 섭취 늘리고 소고기 마블링 많은 등심 보다는 안심 섭취, 돼지고기 비계 등 기름기 많은 적색육 섭취 줄이기

2. 정제된 탄수화물 줄이고, 채소 등 식이섬유 늘리기

- 흰 쌀밥, 빵, 국수, 떡 줄이고 귀리, 보리, 콩류 등 잡곡, 스테비아 함유되지 않은 달지 않은 토마토, 상추, 당근, 나물 늘리기

3. 불포화지방 식이 유지

- 올리브유, 아보카도, 견과류, 등푸른 생선 유지

4. 국물 줄이기

- 찌개, 탕 등에서 건더기 위주 식사하고 염분 많은 국물 줄이기

5. 항산화 성분이 풍부한 식품 섭취하기

베리류(블루베리, 딸기), 파프리카, 녹황색채소, 다크초콜릿, 녹차, 강황 등

* 한국지질·동맥경화학회 진료지침위원회, 이상지질혈증 진료지침 제5판, 한국지질·동맥경화학회, 2022. / 질병관리청, 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 9대 생활수칙, 질병관리청, 2022.

규칙적인 운동



하루 30분 이상 / 일주일 3회 이상 운동
주2회 이상 근력운동 시행하기 *

충분한 숙면



매일 7~9시간의 숙면 취하기
밤 11시 이전 취침 권장 **

흡연과 과음 NO!




동맥경화를 막기 위해 금연을 유지하고
절주를 생활화 하기 *

** American Heart Association (AHA), Life's Essential 8: Updating and Enhancing the American Heart Association's Construct of Cardiovascular Health, Circulation, 2022.

정기적인 안저 동맥경화 AI 검사 시행 및 만성질환 관리

안저 동맥경화 AI 검사 결과 **중간위험군**, **고위험군**으로 평가된 경우,
고혈압·고지혈증·당뇨와 같은 만성질환을 조기에 예방하고 꾸준히 관리하는 것이 중요합니다.



죽상동맥경화를 유발시키는 주요 위험요인이므로 꾸준히 관리해야 합니다.