

उत्पादन गुणवैशिष्ट्ये

कोंकण कन्याळ शेळीचे प्रमुख दुध उत्पादन गुणधर्म खालील तक्त्यात दिले आहेत.

अ.क्र.	उत्पादन गुणवैशिष्ट्ये	
१	प्रतिदिन सरासरी दुध उत्पादन	६०५.०० ग्रॅम
२	एका वेतातील दुध उत्पादन	६९.२९ कि.ग्रॅ.
३	दुध उत्पादनाचा काळ	९६.२९ दिवस

कोंकण कन्याळ शेळीतील मांस उत्पादन संबंधी गुणधर्म खालील तक्त्यात नमुद केले आहेत.

अ.क्र.	गुणधर्म	नर
१	कत्तलीचे सरासरी वय	१४ महिने
२	कत्तलीचे सरासरी वजन	३२.३० कि.ग्रॅ.
३	मांसाचे सरासरी वजन	१८.३४ कि.ग्रॅ.
४	मांसाचे सरासरी प्रमाण	५६.७८%

प्रजनन गुणवैशिष्ट्ये

कोंकण कन्याळ शेळीचे प्रमुख प्रजनन गुणधर्म खालीलप्रमाणे आहेत.

अ.क्र.	प्रजनन गुणवैशिष्ट्ये	
१	प्रथम माजावर येण्याचे वय	३५०.२० दिवस
२	प्रथम गर्भधारणेचे वय	३९०.०० दिवस
३	प्रथम विण्याचे वय	५७६.६० दिवस
४	दोन वेतातील अंतर	२३७.२० दिवस
५	विल्यानंतर पुन्हा गाभण राहण्याचा काळ	२३९.८५ दिवस
६	गाभण काळ	१४८.२ दिवस
७	ऋतु चक्राचा कालावधी	१८-२१ दिवस

करडु (पिल्ले) देण्याचे प्रमाण

कोंकण कन्याळ शेळीत जुळे देण्याचे प्रमाण ३४.६७% असते.

उपयुक्तता

कोंकणातील ग्रामीण भागातील अल्पभुधारक, गरीब, बेरोजगार कुटुंबासाठी, हमखास उत्पन्न देणारे एक साधन व वरदान आहे. दुधापासून कुटुंबाची गरज भागते व मांस विक्रीपासून कुटुंबास आर्थिक मदत होते. काटक आणि कमी खर्चातील व्यवस्थापन यामुळे कोंकण कन्याळ शेळी शेळीपालकांमध्ये दिवसेंदिवस लोकप्रिय होत आहे.



संकलन

डॉ. महादेव सवाणे व डॉ. सलील हांडे

मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

मुंबई



मपमविवि/वि.शि.सं./प्रकाशने/१३/२०२३



INDIA_GOAT_1100_KONKANKANYAL_06022

कोंकण कन्याळ शेळी



प्रकाशक

विस्तार शिक्षण संचालनालय

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ

फुटाळा तलाव मार्ग, नागपूर - ४४०००९


टोल फ्री क्रमांक - १८००-२३३-३२६८

संकेतस्थळ - www.mafsu.in



उगमस्थान व पैदासक्षेत्र

कोंकण कन्याळ ही महाराष्ट्रातील कोंकण विभागामध्ये आढळणारी शेळीची मान्यताप्राप्त जात आहे. कोंकण प्रदेशातील जास्त पाऊस आणि उष्ण व दमट हवामानासाठी अनुकूल असणारी कोंकण कन्याळ ही शेळीची जात आहे. या जातीच्या शेळ्या प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ, दोडामार्गी, मालवण, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या तालुक्यात जास्त प्रमाणात आढळतात. या शेळीची रोगप्रतिकारक शक्ती तसेच दमट वातावरणात टिकून राहण्याची क्षमता चांगली असल्यामुळे उपलब्ध परिस्थितीत कोंकणातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत आहे.



कोंकण कन्याळ शेळीची वैशिष्ट्ये

शरीराची कातडी गुळगुळीत आणि मऊ असते त्यामुळे पावसाळ्यात शरीराच्या पृष्ठभागावरील पाणी त्वरित निघून जाते. मांसाचा रंग लालसर असून इतर जातीपेक्षा मांसल तंतु ही कमी जाडीचे असतात. इतर जातीपेक्षा अतिपर्जन्य काळात सुद्धा फुफ्फुसाचे रोग नगण्य असून वजन वाढीचा दर जास्त असल्याचे आढळते.

शारीरिक गुणधर्म

बाह्यरूप : कोंकण कन्याळ शेळ्यांच्या तोंडावर व कानावर दोन्ही कडांवर पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या असतात. पायांचा रंग बाजूने काळा व गुडग्यापासून खालपर्यंत पांढरा असतो, मानेचा आणि पोटाचा खालचा भाग हा पांढऱ्या रंगाचा असतो.

डोके, शिंगे व कान :

कपाळ हे सपाट आणि रुंद प्रकारचे असते. नर व मादी शेळ्यांची शिंगे राखाडी रंगांची, दंडगोलाकार, टोकदार आणि मागे वळलेली असतात. कान काळ्या रंगाचे सपाट लांब, लोंबलेले व कानाच्या दोन्ही कडा पांढऱ्या रंगाच्या असतात.



कास व शेपटी :

कास कटोऱ्याच्या आकाराची असून सड शंकाकृति असतात. कासेवर पांढऱ्या रंगाचे केस असतात. शेपटी काळ्या रंगाची व वरती वळलेली असून खालचा भाग पांढरा, सरासरी लांबी 16-17 से.मी. असते.



शारीरिक वजन

कोंकण कन्याळ शेळी मध्यम आकाराची असून प्रामुख्याने मांसासाठी पाळली जाते.

अ. क्र.	लिंग	सरासरी वजन (कि.ग्र)				
		जन्मतः	३ महिने	६ महिने	१२ महिने	प्रौढ
१	नर	२.२७	९.२०	१५.१०	२४.०८	४८.५०
२	मादी	१.९५	८.००	१३.९०	२०.५०	३०.६०

प्रौढ नरा मध्ये शारिरीक लांबी, छातीचा घेर व उंची (सें.मी.) अनुक्रमे ७०.७४, ७२.३७ व ७३.४२ असून मादी मध्ये ६६.८६, ६९.५३ व ६८.९५ आहे.

