




महाराष्ट्र शासन

गिरीराज



सेंट्रल हॅचरी

मध्यवर्ती अंडी उबवणूक केंद्र पडेगाव, औरंगाबाद. फोन : ०२४० - २३७०८९६

आपल्या देशामध्ये कोंबडीपालन हा व्यवसाय मोठ्या शहरापर्यंतच मर्यादीत राहीला आहे. त्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागामध्ये लोकांना मांसयुक्त व अंडीयुक्त आहाराची कमतरता आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अंडी व कोंबड्याचे मांस जास्त पैसे देऊन विकत घ्यावे लागते. (आपल्या देशातील पारंपारिक आहारामध्ये पौष्टिक तत्वे कमी असतात आणि प्रोटीन (प्रथिने) यांचे प्रमाण कमी आहे म्हणून ग्रामीण जनता पूरक आहार बीन्स व दाळ युक्त आहारावर अवलंबून असते. ज्यामध्ये लायसिन, मिथियोनीन सारख्या अमायनो ॲसिडची कमतरता असते. अशा रितीने ग्रामीण जनता प्रोटीनयुक्त आहारापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे आदिवासी व ग्रामीण भागात अनेक प्रकारचे रोग, कुपोषणाचा प्रश्न भेडसावत आहे. याचा प्रभाव विशेष करून गर्भवती, स्तनपान करणाऱ्या मातांमध्ये तसेच लहान मुलांमध्ये दिसून येतो. ग्रामीण क्षेत्रामध्ये या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सध्या आवश्यक असलेले हे अनुदान फार कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील व्यावसायिक कोंबडी पालनाच्या क्षेत्रात अयशस्वी आहेत म्हणून शासन सध्या ग्रामीण क्षेत्रातील कोंबडी पालन व्यवसायाच्या विकासावर भर देत आहे आणि ग्रामीण क्षेत्रात वाढतील अशा प्रकारच्या जाती विकसित करत आहे. वास्तवीक पहाता शहरामध्ये अंडी व मांसाची उपलब्धता चांगली असून सुद्धा ग्रामीण क्षेत्रातून उत्पादित केलेल्या अंड्यांना व कोंबड्यांना अधिक चांगल्या दराने मागणी आहे.

यासाठी आपल्या देशात अधिक प्रतिकार शक्ती असलेल्या व ग्रामीण क्षेत्रामध्ये अधिक टिकावूपणे राहतील अशा विविध रंगातील जाती विकसित करून त्यावरती संशोधन चालू आहे.

या संशोधनातून निर्माण झालेली एक जात म्हणजे 'गिरीराज' ही होय. या



जातीमधील नर पक्षी १० ते १२ आठवड्यात जास्तीत जास्त वजन देतात त्याच प्रकारे मादी पक्षीसुद्धा १५० अंडी प्रतीवर्षी मुक्त पद्धतीत देतात. ग्रामीण क्षेत्रात उपलब्ध असणाऱ्या वनस्पती व पूरक खाद्यावरती ही जात उत्तम प्रकारे वाढू शकते. या मुक्त पद्धतीने वाढणाऱ्या कोंबड्या त्यांना आवश्यक असणारे प्रथिने (प्रोटीन) किटकांपासून मिळवतात त्यामुळे त्यामधील उर्जेमध्ये कमतरता असू शकते त्यासाठी विविध धान्यापासून बनविलेले खाद्य या जातीसाठी उपयुक्त आहे.

गिरीराज या जातीने ठळक वैशिष्ट्ये

- विविध रंगातील आकर्षक पंख
- जास्त काळ जिवंत राहण्याची शक्ती
- कमीत कमी खर्चात राहण्याची क्षमता
- मोठ्या आकाराची व जास्त वजनाची अंडी
- उत्तम रोग प्रतिकार शक्ती
- अंड्यांचा रंग तपकिरी

देशी कोंबडीसुद्धा गिरीराज या जातीचे अंडी उबवू शकते.

व्यवस्थापन

ज्या शेतकऱ्यांकडे शेड आहे त्यांच्यासाठी पिल्ले संगोपनाची पूर्वतयारी :

पिण्याच्या पाण्याची व खाद्याची भांडी स्वच्छ धुवून वाळवून घ्यावीत. लाईट फिटिंग व्यवस्थित आहे किंवा नाही हे पाहणी करून, चेक करून घ्यावी कारण बुडींग करण्यासाठी जास्त पावरचे बल्ब लावावे लागतात त्याप्रमाणे सोय करून घ्यावी.

शेडमधून जुने लिटर (भुसा) काढून टाकावे व ते शेडपासून दूर टाकावे किंवा विल्हेवाट लावावी. शेडमधील जाळे, धूळ, भिंतीला लागलेली घाण स्वच्छ धुवून काढावी, उंचावर असलेली कोळ्याची जाळी काढून टाकावीत. शेड स्वच्छ धुतल्यानंतर, भिंतीचे कोपरे व जाळीला अडकलेली कोळ्याची जाळी फ्लेमगनने जाळून घ्यावीत शेड चांगल्या प्रेशरच्या पाण्याने धुवून घ्यावे व जंतूनाशकाचा फवारा करावा व शेड वाळल्यानंतर गनीबॅगचे पडदे लावून घ्यावीत पिल्ले शेडवर येण्यापूर्वी एक आठवडा अगोदर शेड पूर्णपणे तयार करून झाले पाहीजे, प्रत्येक बॅचला नविन भुसा वापरावा. पिले येण्यापूर्वी बुडुर मध्ये साळीचा भूसा किंवा भाताचा तूस २ ते ३ इंच जाडीचा थर पसरून घ्यावा त्यानंतर त्यावर जुने वर्तमानपत्र पसरवून टाकावी. ज्यामुळे पिले भूसा खाणार नाहीत. पिले येण्यापूर्वी काही तास अगोदर लाईट चालू करून शेडचे आवश्यक तापमान आले पाहीजे असे करावे.

गिरीराज या जातीच्या एक दिवसाच्या पिल्लांना चार आठवड्यापर्यंत बुडींग करावे लागते ज्यामुळे त्यांना आवश्यक असलेले तापमान मिळते. पहिल्या दिवशी Marek's रोगाचे व सातव्या दिवशी Lasota लसीकरण करण्यात येते. चार आठवड्यांनंतर हे पक्षी घराच्या परसात किंवा मोकळ्या जागेत सोडून दिले जातात. त्यांना आवश्यक असलेला नैसर्गिक आहार कोंबड्या घेतात. या सुरुवातीच्या काळातच या पक्षांना संध्याकाळी आसऱ्यासाठी पिंजऱ्यापर्यंत येण्याची सवय लावली पाहिजे या पिंजऱ्यामध्ये आवश्यक तितका प्रकाश, निरोगी हवा उपलब्धता असलेली पाहिजे व त्याचप्रमाणे इतर भक्षक प्राण्यापासून बचाव झाला पाहिजे. स्वच्छ पाण्याची उपलब्ध असली पाहिजे. हे पक्षी मुक्तपणे नैसर्गिक आहार घेत असल्यामुळे परोपजीवी जंतांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते त्यामुळे या पक्ष्यांना दर २ ते ३ महिन्यांच्या अंतराने जंतनाशक दिली पाहिजेत या मुक्त पद्धतीत वाढणारे वनराज या जातीच्या पक्ष्यांना ६ महिन्यांच्या अंतराने Ranikhet या रोगाची लस देणे आवश्यक आहे. त्यामधील एक मात्रा शक्यतो उन्हाळा सुरु होण्याच्या आधी दिली तर अधिक उत्तम. या जातीबरोबर वाढणाऱ्या गावरान पक्ष्यांना त्यांच्यासोबत लस टोचणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे गावरान कोंबड्यापासून गिरीराज जातीच्या पक्ष्यांना रोग येणार नाही. गिरीराज या जातीपासून जास्तीत जास्त अंडी उत्पादन घेण्यासाठी या जातीच्या मादीचे वजन २.५ ते ३ किलोपेक्षा जास्त नसले पाहिजे. जास्त वजन वाढले तर अंडी उत्पादनावरती त्याचा विपरित परिणाम होतो. गिरीराज या जातीचे वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी नियंत्रित आहाराद्वारे पक्ष्यांचे वाढणारे वजन आपण नियंत्रीत ठेवू शकतो.

बुडींग

बुडींगसाठी एका पिल्लास २ वॅट इतकी उबेची आवश्यकता असते. बुडींग ३ ते ४ आठवडे करावी लागते. १०० पक्षांसाठी २०० वॅटचा एक बल्ब लावावा. त्याप्रमाणात लाईटचे बल्ब लावावेत. लाईटची कमतरता किंवा लोड शेडींग असेल तर गॅस ब्रुडरचा उपयोग करावा किंवा कोळशाची शेगडी वापरावी. ब्रुडरमध्ये पिल्ले एक ठिकाणी जमून बसणार नाहीत याची काळजी घ्यावी जेव्हा वातावरणात खुप थंडी असेल त्यावेळी पिल्ले बल्ब खाली येवून बसतात. त्यामुळे एकावर एक बसून मर होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी आवश्यक तेवढी उष्णता शेडमध्ये असावी याची काळजी घ्यावी.

पिल्लाच्या हालचाली मर्यादित ठेवण्यासाठी १५" ते १८" रुंदीच्या पुठ्याचे किंवा पत्राचे पट्ट्या (गार्ड) करून गोल भाग तयार करून घ्यावा व त्यातच पिल्ले सोडावीत

लसीकरण

क्र.	वय (दिवसाचे)	लसीचे नाव	मात्रा	देण्याची पद्धती
१	१	मेरेक्स रोग	०.२ मि.ली.	कातडीखाली
२	७	राणीखेत रोग (लासोटा)	१ थेंब	डोळ्यात
३	१८-२१	गंबोरो रोग	१ थेंब	डोळ्यात
४	६-८ आठवडे	कोंबड्याची देवी		लॅनसेट पद्धतीने कातडीत देणे
५	८-१० आठवडे	(R2B) राणीखेत रोग	०.५ मि.ली.	कातडीत देणे
६	१६-१८ आठवडे	(R2B) राणीखेत रोग	०.५ मि.ली.	कातडीत देणे

राणीखेत (R2B) लस दर सहा महिन्यांनी द्यावी.

आहार (Feeding)

चार आठवड्यांपर्यंत गिरीराज जातीच्या पिलांना प्रतीकिलो आहारात खालील आवश्यक घटक २४०० कॅलरी एम.इ., १६० ग्रॅम सी.पी., ७.७ ग्रॅम लायसिन, ३.६ ग्रॅम मिथियोनीन, ३.५ ग्रॅम फॉस्फरस, ७ ग्रॅम कॅल्शियम खाद्य बनवितांना स्थानिक धान्याचा वापर करावा उदा. बाजरी, ज्वारी, मका, तांदूळ, सूर्यफूल व शेंगदाणा पेंड यांचा प्रथिनयुक्त आहार तयार करण्यासाठी करावा. सुरवातीच्या चार आठवड्यांच्या काळात बाजारात उपलब्ध असलेले लेअर खाद्य व ग्रोवर खाद्य दिले जाऊ शकते. गिरीराज जातीचे पक्ष्यांना एकदा सवय लागल्यानंतर खुल्या क्षेत्रातील आहार सहजतेने घेतात. अधिक पूरक खाद्यासाठी त्या क्षेत्रात उपलब्ध असणारे निरुपयोगी धान्य, गवत, किटक वाळवी, गवत बी यांचा उपयोग पूरक खाद्य म्हणून करतात. चार आठवड्यांपर्यंत लागणारे अतिरिक्त पूरक खाद्य हे पक्षी कोणत्या कारणांकरिता पाळले जाणार आहेत यावरती अवलंबून आहे. जर गिरीराज या जातीचे पक्षी मांस उत्पादनासाठी वाढवले जाणार असतील तर त्यांना ब्रॉयलर स्टार्टर खाद्य देणे आवश्यक आहे. जर हे पक्षी अंडी उत्पादनासाठी वाढविले जाणार असतील तर लेअर ग्रोवर खाद्य ४ आठवड्यांपर्यंत देणे

आवश्यक आहे. त्यानंतर या कोंबड्यांना संपूर्ण खाद्य किंवा धान्य उदा. बाजरी, ज्वारी, मका, तांदूळ, तांदळाचा भुसा इत्यादी आवश्यकतेनुसार प्रमाणात द्यावा. नियंत्रित खाद्य देवून पक्षी अंडी चांगल्या रितीने देतील याकडे लक्ष द्यावे. अंडी फुटण्याचे प्रमाण व नाजूक कवच असलेले अंड्याचे प्रमाण, कॅल्शियम देवून कमी केले जावू शकते. उदा. चुन्याची पावडर, शिंपला पुड इत्यादी. ३-४ ग्रॅम/प्रती पक्षी प्रति दिन. मादी पक्ष्यांचे वजन २.२ ते २.५ किलो ग्रॅम, ६ ते ६.५ महिन्याचे असतांना असले पाहिजे (लैंगिक परिपक्वता).

आर्थिक दृष्ट्या महत्वाची ठळक वैशिष्ट्ये :

१	१ दिवशीय पिल्लांचे वजन	४५-४६ ग्रॅम
२	शरीर रंग	विविध रंगाचे
३	८ आठवडे पक्षांचे वजन	१.६ कि.ग्रॅ.
४	जगण्याची क्षमता	९४ %
५	मांसाची गुणवत्ता	उत्तम
६	चव	गावरान कोंबडीप्रमाणे
७	वार्षिक उत्पादन	<u>१५० अंडी</u>
८	लागणारे खाद्य	सरासरी ६५ किलो



(Feed Schedule खाद्य देण्याचा तक्ता)

वय आठवडे	खाद्य प्रति पक्षी
१	१० ग्रॅम
२	२० ग्रॅम
३	३० ग्रॅम
४	४० ग्रॅम
५	५० ग्रॅम
६	५५ ग्रॅम
७	६५ ग्रॅम
८	७० ग्रॅम
९	८० ग्रॅम
१०	८० ग्रॅम
११	९० ग्रॅम
१२	९० ग्रॅम
१३ ते १६	१०० ग्रॅम
१६ ते १८	११० ग्रॅम
१९ ते २०	१२० ग्रॅम
२१ ते पुढे	१३० ग्रॅम

१०० किलो खाद्याची सूत्रे (फीड फॉर्मूला)

घटक	चिक मॅश	ग्रोअर मॅश	लेअर मॅश
मका	४२.५	३०	३०
तेल रहीत राईस पॉलीश	१०	-	१९
राईस पॉलीश	१०	३५	२०
तेल रहित पेंड (पांढरी पेंड)	१८	-	१०
तेलकट पेंड (काळी पेंड)	१०	१३	१०
मासळी	७.५	७	५
गव्हाचा कोंडा	-	१३	-
मिनरल मिक्श्चर	२	२	२.५
शिंपला	-	-	३.५
व्हिटॅमिन ए, बी, डी-३, के	१०	१०	१०

गिरीराज या जातीच्या पक्षीसाठी चिकमॅश ४ आठवडे व नंतर ब्रायलर फिनीशर द्यावे म्हणजे १० आठवड्यापर्यंत चांगले वजन १ ते सव्वा किलो येईल.

मध्यवर्ती अंडी उबवणूक केंद्र, पडेगांव, औरंगाबाद

मार्फत राबविले जाणारे उपक्रम

- १) वनराज, गिरीराज, कलींगा ब्राऊन, आर.आय.आर., जातीच्या एक दिवसांच्या पिल्लांचा मागणी नुसार पुरवठा.
- २) वरील जातीच्या उबवणुकीच्या अंड्यांचा मागणीनुसार पुरवठा.
- ३) सधन कुक्कुट विकास प्रकल्पांना पायाभूत कळप वाढविण्यासाठी एक दिवसाच्या पिल्लांचा पुरवठा.
- ४) उबवणुकीस अपात्र ठरलेली अंडी खाण्यासाठी, उपलब्धतेनुसार विकल्याजातात.
- ५) प्रजननासाठी जातीवंत नर कोंबड्यांचा, मागणी व उपलब्धतेनुसार पुरवठा.
- ६) विशेष घटक योजना, आदिवासी विकास योजना या व अन्य शासकिय योजनांमधील अनुदानवर वाटप करावयाच्या तलंगा गटासाठी पक्ष्यांचा पुरवठा.
- ७) केंद्रातर्फे सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी व ३५ वर्ष खालील वयाच्या सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी व कुक्कुट पालकांसाठी सात दिवसांचे कुक्कुट पालन विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यासाठी सेवा योजन कार्यालयात नोंदणी पत्र व शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.

● संपर्कासाठी पत्ता ●

सहाय्यक आयुक्त, (प.सं.)

मध्यवर्ती अंडी उबवणूक केंद्र

पडेगाव, औरंगाबाद. फोन : ०२४० - २३७०८९६