



TELEPHONE :- ०२०२५६९२९३५

FAX :- ०२०२५६९९४७४

E-MAIL : dis.pune9@gmail.com

WEBSITE : www.ahd.maharashtra.gov.in

जा.क्र. रोअवि / विषाणूशास्त्र / 73 / 445 / २०२३, पुणे-६७, दिनांक : 20.०२.२०२३.

प्रति

प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त (सर्व),
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (सर्व),
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व),
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, विभागिय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा (सर्व).

विषय :- श्वानदंश (रेबीज) या रोगाच्या प्रादुर्भावाच्या वेळी क्षेत्रीयस्तरावर करावयाच्या
उपाययोजना बाबत..

उपरोक्त संदर्भित व विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, अहमदनगर जिल्ह्यातील तालुका लघु पशु सर्व चिकीत्सालय संगमनेर या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील ८ पशुधनांचा श्वानदंश (रेबीज) सदृश्य रोगाने मृत्यु झाला असल्याचे चिकीत्सालय स्तरावरील बाधीत पशुधनात दिसून आलेल्या लक्षणांवरून प्राथमिक निदान आहे. या पशुधनांची मर्तुक झालेल्या क्षेत्रात रेबीज झालेला श्वान फिरत असल्याचे पशुपालकांच्या निदर्शनास आले असल्याचा इतिहास आहे. अशा घटना क्षेत्रीयस्तरावर वेळोवेळी अनुभवास येत असतात. या अनुषंगाने क्षेत्रीयस्तरावरील अधिकारी यांनी करावयाच्या उपाययोजना व श्वानदंश (रेबीज) रोगा विषयी संक्षिप्त माहिती खालील प्रमाणे.

प्रस्तावना

रेबीज हा रोग उष्णरक्त वर्गीय प्राण्यांमध्ये दिसून येणारा अत्यंत घातक विषाणू जन्य रोग आहे. या रोगाचे विषाणू पशुधनाच्या मज्जासंस्थेस बाधीत करतात. बाधीत पशुधनाच्या ज्या भागात मज्जासंस्थेचे दाट जाळे असते अशा भागातील स्त्रावातुन हे विषाणू शरीरातुन बाहेर पडतात जसे पशुधनाच्या तोंडातुन येणारी लाळ. बाधीत पशुधनाच्या चावण्याने (दंश) या विषाणूचा प्रामुख्याने प्रसार होतो. हा रोग झुनॉटीक म्हणजे प्राण्यांपासून मानवास होत असतो.

श्वानदंश रोग निदान व घ्यावयाची काळजी

१. संशयास्पद आजारी पशुधनाबाबत श्वान दंश झाल्याचा किंवा पिसाळलेला भटका कुत्रा परिसरात दिसून आल्याचा पुर्वइतिहास असणे.
२. पशुधनात उपरोक्तप्रमाणे लक्षणे दिसून येणे.
३. बाधीत पशुधनास रेबीज झाल्याचा संशय बळावत असेल तर अशा पशुधनास हाताळू नये.
४. अशा बाधीत पशुधनास उपचार करणे निरूपयोगी ठरते.
५. संशयास्पद / बाधीत पशुधनाचे विलगीकरण करावे.
६. अशा पशुधनांचा उरलेला चारा, पिण्याचे पाणी, भांडी, शेंड व परिसराचे निर्जंतुकीकरण करावे (कार्बोलिक ॲसिड, सोप सोल्युशन अथवा डिटर्जेंट च्या द्रावणाने).
७. अशा पशुधनास हाताळताना ग्लोव्ज वापरावे. सर्व वापरलेली प्रावणे जाळून नष्ट करावीत.
८. बाधीत पशुधन मृत झाल्यास शवविच्छेदन करीत असतांना व्यक्तिगत जैवसुरक्षा साधणे जसे पीपीई कीट, ग्लोव्ज, मास्क, फेसशिल्ड वापरावे. शवविच्छेदनानंतर सर्व प्रावणे जाळून टाकावीत.
९. शवविच्छेदनानंतर मृत शरीराची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी. जेणे करून वन्य प्राणी व मांसभक्षी प्राणी सदर बाधीत पशुधनाच्या संपर्कात येऊन संक्रमित होणार नाहीत व या रोगाचा प्रसार होणार नाही.

प्रयोगशाळेमध्ये निदाना करीता पाठविण्याचे नमुने

१. लक्षणे दिसणाऱ्या प्राण्यामधील लाळ नमुना बर्फावर पाठवावा. तसेच मेंदुचा नमुना बर्फावर व फॉर्मॅलीन मध्ये पाठवावेत. बर्फावर पाठवायच्या नमुन्यांची शितसाखळी नमुने प्रयोगशाळेत पोहंचे पर्यंत अबाधित राहिल याची दक्षता घ्यावी. लाळ नमुन्या मध्ये विषाणू काही तासांसाठीच जिवंत रहातो. त्यासाठी लाळ नमुना लवकरात लवकर प्रयोगशाळेत सादर करावयाची दक्षता घ्यावी. तसेच लाळ नमुना तपासणीचे निष्कर्ष नकारार्थी आढळल्यास संशयीत पशुधनास रेबीज रोग झालेला नाही असे अनुमान काढणे संयुक्तिक राहणार नाही. असे पशुधन विलगीकरणात (आयसोलेशन) १० ते ४५ दिवस निगराणी खाली ठेवावे. तसेच अशा पशुधनांचे उत्पादन घेऊ नये व उपरोक्त मुद्द्यात वर्णन केल्यानुसार काळजी / दक्षता घ्यावी.

श्वानदंश झाल्याचे निदर्शनास आल्या नंतर करावयाच्या उपाय योजना

१. मज्जा संस्थेसंबंधी लक्षणे दिसून आल्यास अशा पशुधनातील उपचार काळजीपूर्वक व संरक्षक प्रावणे (पीपीई कीट, ग्लोव्ज, मास्क, फेसशिल्ड) करावेत.
२. बाधीत पशुधन चावल्यास / लाळेशी संपर्क आल्यास साबणाच्या द्रावणाने किंवा डिटर्जेंटच्या द्रावणाने जखम धुवून काढावी. जखमेवर २ टक्के ॲक्वियस क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाऊंड लावावे. त्यानंतर टीव्हर आयोडीन, पोव्हीडोन आयोडीन लावावे. जखमेस पट्टी बांधू नये.

प्रतिबंधक लसिकरण

श्वानदंश / रेबीज प्रतिबंधासाठी दोन प्रकारे लसिकरण करण्यात येते. १. श्वानदंशापूर्वी २. श्वानदंशानंतर

अ. श्वानदंशापूर्वी करावयाच्या लसिकरण पद्धती

१. प्राथमिक लसिकरण - सर्व साधारणतः प्रति बंधात्मक लसीची ३ इंजेक्शने. शुन्य दिवस, ७ वा दिवस आणि २१/२८ वा दिवस.

२. बुस्टर लसीकरण - प्राथमिक लसीकरणानंतर १ वर्षाने.
३. तथापि लस उत्पादकांच्या सूचनांनुसार लसीकरण वेळा पत्रक व लस मात्रांची संख्या यांचे तंतोतंत पालन करावे.

आ. श्वानदंशानंतर करावयाच्या लसिकरण पध्दती

१. श्वानदंश प्रतिबंधात्मक लसीकरण न केलेले पशुधन, तसेच प्रतिबंधात्मक लसीकरणानंतर प्रतिबंधात्मक संरक्षण कालावधी उलटून गेला असेल अशा पशुधनास लसीची ५ इंजेक्शने द्यावीत वेळापत्रक - शुन्य दिवस, ३ रा दिवस, ७ वा दिवस, १४ वा दिवस आणि २८ वा दिवस.
२. श्वानदंश प्रतिबंधात्मक लसीकरण केलेले व प्रतिबंधात्मक संरक्षण कालावधीत श्वानदंश झालेला असल्यास अशा पशुधनास लसीची २ इंजेक्शने द्यावीत. वेळापत्रक - शुन्य दिवस, ३ रा दिवस.
३. तथापि लस उत्पादकांच्या सूचनांनुसार लसीकरण वेळा पत्रक व लसमात्रांची संख्या यांचे तंतोतंत पालन करावे.

संदर्भित घटनेच्या सारखी परिस्थिती उद्भवल्यास ज्या पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनास श्वानदंश झाल्याचा संशय आहे. तसेच पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्यांचा त्यांच्या परिसरात शेड / गोठा / पशुधनाचा निवारा / पशुधनाच्या आसपास फिरल्याचे निदर्शनास आलेले आहे अशा पशुधनांसाठी श्वानदंशानंतर करावयाच्या लसिकरण पध्दतीने उपाययोजना करण्यात यावी. तसेच अशा परिसरातील इतर पशुधनांना श्वानदंशापूर्वी करावयाच्या लसिकरण पध्दतीने उपाययोजना करण्यात यावी.

उपरोक्त मार्गदर्शक तत्वांचा उपयोग करून श्वानदंश रोगाच्या बाबतीत उपाययोजना कराव्यात. तसेच ही माहिती पॅम्फलेट, लीफलेट व तत्सम साधनांद्वारे पशुपालकांच्या मध्ये प्रसारीत करावे. तसेच उपरोक्त प्रकारची परिस्थिती उद्भवल्यास त्वरीत नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेस संपर्क साधावा अशी जागृती पशुपालकांत करावी.


सहाय्युक्त पशुसंवर्धन,
रोग अन्वेषण विभाग, औध, पुणे-६७.

प्रत

१. मा. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ यांना माहिती स्तव सविनय सादर .
२. मा. अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे-६७ यांना माहिती स्तव सविनय सादर .
३. उपआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग नियंत्रण, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे-६७ माहितीस्तव सादर.