

संगमनेरी शेळीचे मांस उत्पादन संबंधी गुणधर्म खालीलप्रमाणे आहेत.

अ.क्र.	गुणधर्म	नर	मादी
१	कत्तलीचे सरासरी वय (महिने)	२०	२२
२	कत्तलीचे सरासरी वजन (कि.गॅ.)	३२	२८
३	मांसाचे सरासरी वजन (कि.ग्रॅ.)	१६	१३
४	मांसाचे सरासरी प्रमाण (%)	४६	

प्रजनन गुणवैशिष्ट्ये

संगमनेरी शेळीचे प्रमुख प्रजनन गुणधर्म खालीलप्रमाणे आहेत.

अ.क्र.	प्रजनन गुणवैशिष्ट्ये	
१.	प्रथम माजावर येण्याचे वय	९-१० महिने
२.	प्रथम गर्भधारणेचे वय	१०-१२ महिने
३.	प्रथम विण्याचे वय	१५-१६ महिने
४.	दोन वेतांमधील अंतर	२१८-२१९ दिवस
५.	विल्यानंतर परत एकदा माज करण्याचा कालावधी	७३-७४ दिवस
६.	गाभणकाळ	१४८-१५० दिवस
७.	ऋतु चक्राचा कालावधी	२९.१४ दिवस

करडू (पिल्ले) देण्याचे प्रमाण

संगमनेरी शेळीमध्ये एका वेतात करडू देण्याचा विचार केला असता एक करडू/पिल्लु देण्याचे प्रमाण ७५ टक्के, जुळे देण्याचे प्रमाण १५ ते २० टक्के व तिळे देण्याचे प्रमाण ४ टक्के असते.

इतर व्यवस्थापन

शेतकऱ्यांनी संगमनेरी शेळ्या पाळतांना २० ते २५ या संख्येपासून सुरुवात करून २० शेळ्यांसाठी साधारणता १ ते २ नर पैदाशीसाठी वापरावे. अर्धबंदिस्त शेळीपालनामध्ये शेळ्यांना योग्य प्रमाणात ओला व वाळला चारा ज्यामध्ये सोयाबीन भुस्कट, स्थानिक गवत, चवळी आणि मटकीचे भुस्कट, शेवगा, शेवरी, सुबाभळीचा पाला तसेच डीएचएन-६ गवत शेळ्यांना आहारामध्ये देणे आवश्यक आहे. याबरोबरच शेळीच्या शारीरिक स्थितीनुसार खुराक व क्षार मिश्रण योग्य प्रमाणात देणे आवश्यक आहे.



संकलन


डॉ. तेजस शेंडे व डॉ. विश्वास साळुंके
क्रां. ना. पा. पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिरवळ
जि. सातारा



मपमविवि/वि.शि.सं./प्रकाशने/१२/२०२३



संगमनेरी शेळी



प्रकाशक

विस्तार शिक्षण संचालनालय

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ

फुटाळा तलाव मार्ग, नागपूर - ४४०००९

टोल फ्री क्रमांक - १८००-२३३-३२६८


संकेतस्थळ - www.mafsu.in



संगमनेरी जातीच्या शेळ्या छोट्या कळपामध्ये कुटुंबाला लागणाऱ्या दुधासाठी व मटणासाठी विक्री करून आर्थिक उत्पन्नासाठी पाळल्या जातात.

उगमस्थान व पैदासक्षेत्र

संगमनेरी ही शेळीची जात विशेषतः अहमदनगर, नाशिक, पुणे या जिल्ह्यामध्ये आढळते. शेळीचे नाव अहमदनगर जिल्ह्यामधील 'संगमनेर' गावाच्या नावावरून पडले असले तरीही ही जात नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यात, पुण्याच्या जुन्नर तालुक्यात आणि अहमदनगरमधील राहुरी, श्रीरामपूर, अहमदनगर आणि पारनेर तालुक्यात प्रामुख्याने आढळते.



शारीरिक गुणधर्म

संगमनेरी शेळी मध्यम शरीर बांध्याची, रंग प्रामुख्याने पांढरा तसेच काही शेळ्यांमध्ये तपकिरी रंगाच्या मिश्रणामध्ये सुद्धा आढळतो.

शेळीचे डोके शरीराच्या बांध्यानुसार अनुरूप प्रमाणात आढळते. चेहरा त्रिकोणी व फुगीर असतो. कान लांब व लोंबते असतात आणि काही शेळ्यांत जनावरांमध्ये कपाळावर दाट केसांचा झुपका आढळतो. डोळ्यांच्या पापण्या व नाकपुड्या पांढऱ्या रंगाच्या शेळ्यांमध्ये गुलाबी रंगाच्या आढळतात व इतर रंगाच्या शेळ्यांमध्ये डोळ्यांच्या पापण्या व नाकपुड्या काळ्या रंगाच्या असतात. साधारणतः १० टक्के नर आणि मादी यांमध्ये दाढी आढळते व २ टक्के शेळ्यांमध्ये लोलक आढळतात. शेळ्यांची शिंगे चपटी, छोटी आणि मागे वळलेली असतात. शेळ्यांच्या पायाच्या खुरांचा रंग राखाडी असतो.

शारीरिक वजन व मोजमापे

संगमनेरी शेळी मध्यम आकाराची असून १५ किंवा त्यापेक्षा जास्त महिने वयाच्या शेळ्यांमध्ये शरीराची मोजमापे (साधारणपणे) खालील प्रमाणे आढळतात.

अ. क्र.	लिंग	सरासरी वजन (कि.ग्रॅ)				
		जन्मतः	३ महिने	६ महिने	९ महिने	वयस्क
१	नर	१.९३	९.११	१३.४७	१७.०८	२०.२४
२	मादी	१.९०	८.४३	१३.२४	१७.०६	१८.०८

वयस्क संगमनेरी नरामध्ये शारीरिक लांबी, छातीचा घेर व उंची (सें.मी.) अनुक्रमे ७५.५०, ७४.९४ व ७५.१९ असून मादी मध्ये ६९.३९, ७१.३२ व ६९.०७ आहे.



उत्पादन गुणवैशिष्ट्ये

संगमनेरी शेळीचे प्रमुख दुध उत्पादन गुणधर्म खालील तक्त्यात दिलेली आहेत.

अ.क्र.	उत्पादन गुणवैशिष्ट्ये	
१	प्रतिदिन सरासरी दुध उत्पादन	८६० ग्रॅ.
२	एका वेतातील दुध उत्पादन	७८ कि.ग्रॅ.
३	दुध उत्पादनाचा काळ	१६० दिवस
४	भाकड काळ	९०-१०० दिवस
५	दुधातील स्निग्धांशाचे प्रमाण	४.१५%
६	दुधातील स्निग्धांश विरहित घन प्रमाण	९.२०%