

**अंडी अथवा अंडी आणि मांस उत्पादन देणा-या देशी/विदेशी / सुधारीत जातीच्या कुक्कुट पक्ष्यांमधिल
सर्वसाधारण लसीकरणाचा तक्ता**

अ.क्र.	रोगाचे नांव	वय	लसीचा प्रकार	पॅकींग	साठवणूक	मात्रा	मार्ग	प्रतिकारशक्ती	शेरा
१	मरेक्स	१ दिवस	मरेक्स एच.व्ही.टी एफ.सी १२६ फ्रीज ड्राईड	२५०-५०० प्रति व्हायल	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	०.२ मी.ली.	मानेच्या कातडीखाली (S/C)	आयुष्यभर	उबवणूक केंद्रात
२	राणिखेत (मानमोडी)								
	लासोटा (१ ली मात्रा)	५ ते ७ दिवस	लासोटा लॅटाजेनिक स्ट्रेन फ्रीज ड्राईड	१००/२०० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	एक थेंब	प्रत्येक नाकपुडीत / डोळयात	लसीकरणानंतर १४-२१ व्या दिवशी निर्मिती पूर्ण होते आणि ८ आठवडे टिकून राहते.	आवश्यकतेनुसार, रोग प्रादुर्भावाची संभावना असल्यास किंवा अंडी उत्पादन कमी झाल्यास लासोटा लसमात्रा दर १० आठवड्यांनी
	लासोटा (२ री मात्रा)	पहिल्या मात्रेनंतर २८ ते ३० दिवसांनी	लासोटा लॅटाजेनिक स्ट्रेन फ्रीज ड्राईड	१००/२०० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	-	थंड पिण्याच्या पाण्यातून ज्या मध्ये ६ ग्रॅम स्कीम मिल्क पावडर प्रति लिटर मिसळून	लसीकरणानंतर १४-२१ व्या दिवशी निर्मिती पूर्ण होते आणि ८ आठवडे टिकून राहते.	पाण्यातून पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने द्यावी.
	राणिखेत (मानमोडी) (१ ली मात्रा)	८-१० आठवडे	मुक्तेश्वर R2B स्ट्रेन फ्रीज ड्राईड	१००/२०० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	०.५ मि.ली.	कातडीखाली / मांसात (I/M, S/C)	आयुष्यभर	प्रतिबंधात्मक अथवा रोग प्रादुर्भावाची संभावना असल्यास दुसरी मात्रा द्यावी.
	राणिखेत (मानमोडी) (२ ली मात्रा)	१६-१८ आठवडे किंवा अंडी उत्पादन सुरू होणेपूर्वी	मुक्तेश्वर R2B स्ट्रेन फ्रीज ड्राईड	१००/२०० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	०.५ मि.ली.	कातडीखाली / मांसात (I/M, S/C)	आयुष्यभर	रोग प्रादुर्भावाची संभावना असल्यास दुसरी मात्रा द्यावी.
	राणिखेत (मानमोडी) (दुबार मात्रा)	५० आठवडे	मुक्तेश्वर R2B स्ट्रेन फ्रीज ड्राईड	१००/२०० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	०.५ मि.ली.	कातडीखाली / मांसात (I/M, S/C)	आयुष्यभर	
३	कॉबड्यांची देवी (फाउल पॉक्स)	६-८ आठवडे	फाउल पॉक्स लाईव्ह स्ट्रेन फ्रीज ड्राईड	१००/२०० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	दोन टोचण्या (प्रीक्स)	पंखाच्या विंगवेबमध्ये लॅनसेटद्वारे	लसीकरणानंतर २१ व्या दिवशी निर्मिती पूर्ण होते आणि आयुष्यभर टिकून राहते	५० टक्के ग्लिसरीन सलाईन मध्ये तयार करण्यांत आलेल्या लसमात्रा २ तासात वापराव्यात. देवीचं व्रण

	कॉबडयांची देवी (फाउल पॉक्स) दुसरी मात्रा	१६ आठवडे किंवा अंडी उत्पादन सुरू होणेपूर्वी	फाउल पॉक्स लाईव्ह स्ट्रेन फ्रीज ड्राईड	१००/२०० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	दोन टोचण्या (प्रीक्स)	पंखाच्या विंगवेबमध्ये लॅनसेटद्वारे	लसीकरणानंतर २१ व्या दिवशी निर्मिती पूर्ण होते आणि आयुष्यभर टिकून राहते	१ आठवड्यात येणे अपेक्षित आहे. न आल्यास पुन्हा लसीकरण करणे आवश्यक आहे.
४	गंबोरा (आयबीडी)	२१ व्या दिवशी	इंटरमेडीएट स्टॅन्डर्ड स्ट्रेन	१००/२००/५००/१०० ० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	०.०३ मि.ली	(१ ते २ थेंब) डोळ्यात	लसीकरणानंतर २१ व्या दिवशी निर्मिती पूर्ण होते आणि ८ आठवडे टिकून राहते	रोग प्रादर्भावाची शक्यता असलेल्या भागात आवश्यक
	गंबोरा (आयबीडी) बुस्टर	१८-१९ आठवडे	इंटरमेडीएट प्लस स्ट्रेन	१००/२००/५००/१०० ० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	पाण्यांत	थंड पिण्याच्या पाण्यातून ज्या मध्ये ६ ग्रॅम स्कीम मिल्क पावडर प्रति लिटर मिसळून		रोग प्रादर्भावाची शक्यता असलेल्या भागात आवश्यक
५	इन्फेक्शियस ब्रॉनकायटीस (आयबी)	१ ली लसमात्रा ३-७ व्या दिवशी किंवा लासोटा सोबत	आयबी लाईव्ह लसमात्रा	१००/२००/५००/१०० ० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	एक थेंब	प्रत्येक नाकपुडीत / डोळ्यात		रोग प्रादर्भावाची शक्यता असलेल्या भागात आवश्यक
	इन्फेक्शियस ब्रॉनकायटीस (आयबी) बुस्टर	१४-१६ व्या आठवड्यांत	आयबी लाईव्ह लसमात्रा	१००/२००/५००/१०० ० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	एक थेंब	प्रत्येक नाकपुडीत / डोळ्यात		रोग प्रादर्भावाची शक्यता असलेल्या भागात आवश्यक

- लसमात्रांमध्ये लस उत्पादकाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार बदल होवू शकतो.
- लसीकरण पशुवैद्यकाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यांत यावे.
- लसीकरण शक्यतो सकाळी किंवा संध्याकाळी थंड वेळेत करण्यांत यावे.
- लसीकरण हे फक्त निरोगी पक्ष्यांना करण्यांत यावे.
- पक्ष्यांमध्ये प्रतिकारक शक्ती प्रभावीपणे तयार होणेसाठी लसीकरणापूर्वी जंतनाशक औषधी सर्वसाधारण ५ व्या आठवड्यात व १६ व्या आठवड्यांत देण्यांत यावे.

**ब्रॉयलर किंवा मांस उत्पादन देणा-या सुधारीत जातीच्या कुक्कुट पक्ष्यांमधिल
सर्वसाधारण लसीकरणाचा तक्ता**

अ.क्र	रोगाचे नांव	वय	लसीचा प्रकार	पॅकींग	साठवणूक	मात्रा	मार्ग	शेरा
१	मरेक्स	१ दिवस	मरेक्स एच.व्ही.टी एफ.सी १२६ फ्रीज ड्राईड	२५०-५०० प्रति व्हायल	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	०.२ मी.ली.	मानेच्या कातडीखाली (S/C)	उबवणूक केंद्रात
२	राणिखेत (मानमोडी)							
	लासोटा (१ ली मात्रा)	५ ते ७ दिवस	लासोटा लॅटाजेनिक स्ट्रेन फ्रीज ड्राईड	१००/२०० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	एक थेंब	प्रत्येक नाकपुडीत / डोळयात	
	लासोटा (२ री मात्रा)	१६ व्या दिवशी	लासोटा लॅटाजेनिक स्ट्रेन फ्रीज ड्राईड	१००/२०० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	-	थंड पिण्याच्या पाण्यातून ज्या मध्ये ६ ग्रॅम स्कीम मिल्क पावडर प्रति लिटर मिसळून	आवश्यकतेनुसार, रोग प्रादुर्भावाची संभावना असल्यास
	लासोटा (२ री मात्रा)	३६ व्या दिवशी	लासोटा लॅटाजेनिक स्ट्रेन फ्रीज ड्राईड	१००/२०० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	-	थंड पिण्याच्या पाण्यातून ज्या मध्ये ६ ग्रॅम स्कीम मिल्क पावडर प्रति लिटर मिसळून	आवश्यकतेनुसार, रोग प्रादुर्भावाची संभावना असल्यास
३	गंबोरा (आयबीडी)	१२-१४ व्या दिवशी	इंटरमेडीएट स्टॅन्डर्ड / प्लस स्ट्रेन	१००/२००/ ५००/१००० मात्रा	०-४ डीग्री सेंटीग्रेड	०.०३ मि.ली	(१ ते २ थेंब) डोळयात	

- लसमात्रांमध्ये लस उत्पादकाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार बदल होवू शकतो.
- लसीकरण पशुवैद्यकाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यांत यावे.
- लसीकरण शक्यतो सकाळी किंवा संध्याकाळी थंड वेळेत करण्यांत यावे.
- लसीकरण हे फक्त निरोगी पक्ष्यांना करण्यांत यावे.