

गोष्टी चार युक्तीच्या : लेअर हाऊस मॅनेजमेन्ट

खुडूक कोंबडी कशी ओळखावी ?

गादी पध्दतीमध्ये वयाच्या १८ ते २० आठवडे वय असताना कोंबडी अंडी उत्पादनास सुरु करतात. अंडी उत्पादन काही काळ कमाल मर्यादेपर्यंत अर्थात ५०-७० टक्के पर्यंत वाढत जाते. कालांतराने अंडी उत्पादन मात्र हळूहळू कमी व्हायला लागते. अन्यथा पक्ष्यांच्या खाद्यावरचा खर्च वाढतो व व्यवसाय तोटयात जातो. यावर कळपातील अंडी उत्पादन न करणारे पक्षी लक्षणावरून ओळखून त्यांचेवर वेळीच उपाय योजना करणे हे कुक्कूट पालकाचे कौशल्य आहे.



खुडूक मादी पक्षी कसे ओळखावे ? त्यांची लक्षणे:-

१. खुडूक पक्ष्याचे वजन कमी असते. कळपातील ताणामुळे अंडी उत्पादन घटते.
२. पक्ष्यांचे वय ४० आठवडे असताना, कांही पक्ष्यांची चोच पोपटाच्या चोची सारखी होते. तुरा व गलोल फिकट रंगाचा होतो.
३. खुडूक पक्षी मेटिंग टाळण्यासाठी भींतीवर/तारावर/ खिडकीमध्ये /घरटयात वेगळे बसतात.
४. ग्रम्बलींग साऊड/कोंबडया सारखा आवाज करतात. कळपातील पक्ष्यांमध्ये मिसळत नाहीत.
५. इतर कोंबडयांनी दिलेल्या अंडयावर भरपूर वेळ बसतात.
६. घरटयामध्ये पंख पसरतात. इतर पक्ष्यांवर अचानक हल्ला/चढाई करतात.

७. पक्ष्याच्या पोटावरील पिसे गळाल्याने ब्रुडीपॅच दिसून येतो.
८. अनउत्पादक पक्ष्याच्या ओटीपोटाचे हाड/पेलव्हीक मध्ये २ बोटाचा गॅप दिसून येतो.
९. अन उत्पादक पक्ष्याची पिसे स्वच्छ, मुलायम, पांढरी दिसून येतात.



खुडूक पक्षी व त्यावरील उपाय योजना.:-

१. पक्ष्याचे अंडी वांरवार संकलीत करावीत. घरटी नियमीत तपासावीत.
२. खुडूक पक्षी जमीनीवर/घरटयात बसू देऊ नये.
३. पक्ष्यांची खाद्य-पाण्याची भांड्यांतील स्पेस वाढवून गर्दी टाळावी.
४. खुडूक पक्षी कळपातून वेगळे करावे. स्वतंत्र मोकळ्या जागेत वाढवावेत. खाद्य-पाणी भरपूर उपलब्ध करून द्यावे. इंजेक्शन मल्टीविटामीन मासात द्यावे.
५. खुडूक पक्षी थंड पाण्यात २०-३० सेकंद बुडवावेत, ब्रुडींग पेन मध्ये पक्षी सोडण्यापुर्वी अँस्पेरिन १२५ मि.ग्रा.ची गोळी द्यावी.
६. अनउत्पादक/ खुडूक पक्ष्याचे “पेलव्हीक बोन” मधील अंतर (स्पेस) दोन बोटा एवढा असतो. पक्ष्यांचे निरिक्षण नियमीत नोंदवावे. पेलव्हीक बोन मधील स्पेस वाढल्यास त्या पक्ष्यांना परत लेअर कळपात पाठवावे.
७. पक्ष्यांचे खाद्य/लाईट व्यवस्था तपासून घ्यावी. तज्ञांचा वेळीच सल्ला घ्यावा.
